


38080/8



Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b28772647_0006



553

APPARATUS MEDICAMINUM

TAM SIMPLICIUM
QUAM
PRAEPARATORUM et COMPOSITORUM
IN PRAXEOS ADIUMENTUM
CONSIDERATUS.

VOLUMEN SEXTUM.

AUCTORE
JO. ANDREA MURRAY D.

EQUITES ORD. REG. DE WASA

M. BRIT. REG. A CONSIL. AUL. PROFESSORE MED. ET
BOT. ORD. IN ACAD. R. GOTTING. PRAEFECTO HORT.
R. BOT. SOCIET. SCIENT. STOCK. UPSAL. GOTHENB.
LUND. FLORENT. LUGD. DIVION. AUREL. HARLEM. ET
ULISSING. MEDIC. PARIS. NANC. OT HAUN. COLL. MED.
EDINB. ATQUE SOCIET. OECON. BERN. CELL.
GEORGOPHIL. ET PARIS. MEMBRO

POST MORTEM AUCTORIS

EDIDIT
LUDOV. CHRISTOPH. ALTHOF

MED. DOCT.

TICINI MDCCXCII.

In Typographia Balthassaris Comini
EX PRIVILEGIO.

B. Luigi Zangrandi

AMERICAN
MEDICAL

PHARMACEUTICAL

AND DISPENSARY

OF THE

UNITED STATES

PHARMACEUTICAL

ASSOCIATION

OF

AMERICAN

PHARMACEUTICAL

AND DISPENSARY

OF THE

UNITED STATES

PHARMACEUTICAL

ASSOCIATION

OF

AMERICAN

PHARMACEUTICAL

AND DISPENSARY

OF THE

UNITED STATES






LUDOVICUS CHRISTOPH. ALTHOF

M. D.

LECTORI BENEVOLO

S. D.



*P*rior huius voluminis pars, ea nimirum, quae de stirpibus, genere et specie cognitis, agit, typis iam excusa erat, cum praematura sane, nec satis lugenda, quamvis praevisa, morte nobis eriperetur Auctor, eruditione haud vulgari praeclarus, tantisque in primis de materia medica meritis longe lateque conspicuus. Altera pars, quae medicamina vegetabilia ignoti generis vel speciei comprehendit, exarata quidem erat, sed iterum perlustranda,

A 2

locaque passim ex scriptoribus citata iterum conferenda erant, antequam typothetae committi poterat. Hanc mihi paucis ante obitum horis tradidit beatus Auctor, ut recognitam prelo subici curarem. Ea praeterea, pro singulari erga me benevolentia, mecum communicavit, quae ad volumina priora augenda collegerat. Nihil itaque est in hoc volumine, si indicem excipias, quod non Auctori debeatur.

Indicem enim, quem in calce voluminis quinti adiecerat beatus Auctor, emendavi, locupletiolem reddidi, nominibus stirpium systematicis auxi, eaque suo loco inserui, quae in hoc volumine continentur.

Quae autem de plantarum quarundam in prioribus voluminibus iam pertractarum, viribus, nuperius vel primum, vel curatius perspectis, commemoranda supersunt; ea novae huius

operis editioni, quae propediem in lucem prodibit, reservantur.

Haec praemonenda putavi, ne quid immerito tribueretur editori.

*Scripsi in Georgia Augusta,
mense Martio MDCCXCII.*





A.

STIRPES

In praecedentibus voluminibus omisse, sed genere vel specie cognitae, ut lege ordinum naturalium inferi possint.

18. b.

(Vol. I. p. 52. pone Quercum Robur.)

Pharm. GALLAE TURCICAE.

Quercus Cerris; foliis oblongis lyrato-pinnatifidis, laciniis transversis acutis, subtus tomentosis LINN. *Spec. plant.* p. 1415. Cerrus Robur III. CLUS. *rar. plant. Hist.* p. 18. c. *fig.* quae recusa a DODON. *Pempt.* p. 825. Quercus cortice hispido glande minore C. B. Arbor exigua, interdum humanam altitudinem

nem non superans, in Mauritania, Hispania (Castella veteri CLUS.), Austria (CLUS. JACQU.), Galliae Burgundia (MILL.), locis montosis crescens.

Galla et productum et domicilium insecti cuiusdam est, Cynipis Quercus folii (LINN. *Syst. regni anim.* p. 918. n. 5.) et Cynipis Quercus inferae L. (l. c. n. 6.). Inest hisce ac tot aliis insectis ea natura, quod stirpibus congeneribus delectentur. Ita e. c. Curculio Scrophulariae non unam Scrophulariae speciem consumit, Chrysomela Gottingensis pluribus Menthae speciebus inhaeret. Cynips Rosae in variis Rosis effingit Bedeguar. Non mirum igitur, quod praeter vulgarem Quercum s. Robur L., in qua gallae hinc inde vere gignuntur (CLUS. l. c. p. 19.), nominatim in Suecia (LINN. *Skanska Resa* p. 268. *Amoen. acad.* vol. 3. p. 324. *Syst. animal* p. 918.), item in Helvetia (HALL. *Hist. stirp. helv.* n. 1626.), alias species occupet, ut vel illi, qui Clusianas icones intuetur, comparet. Quod vero Quercum Cerrin praefigam, non ideo fit, quod CLUSIUS praegrandes huius gallas describit, et tam frequentes, ut ramulus vix palmam superans novem vel pluribus gallis instruatur, sed quod Gallis Turcicis hanc originem tribuunt varii (e. c. BERG. *Mat. med.* p. 739. *Ph. Edinb. nov.* p. 27. CULLEN'S *Treatise of the Mat. med.* vol. 1. p. 201.). Cuius quidem asserti rationem equidem aequè parum hactenus novi, ac eius, quod Quercus
Aegi.

Aegilops L. etsi non sine adiuncta dubitatione alibi (*Dispensf. Brunf. p. 76.*) assignetur. In pluribus *Quercus* partibus *Cynipes* tubercula generant, in foliis, petiolis, pedunculis, ramulis, cortice, gemma, bacca. Gallae, quae in inferiori foliorum superficie *Quercus Roboris* in Svecia generantur, magnitudinem *Avellanae* habent, globosae, opacae, rubrae (*LINN. Syst. l. c.*) Mirum in Britania non reperiri (*ALSTON'S Mat. med. vol. 2. p. 286.*). Quas *CLUSIUS* (*l. c.*) describit et depingit, *Quercui Cerri* L. inhaerentes, tantum non omnes ramulis insident, praegrandes sunt, exigui mali magnitudinis, sphaericae, aliquot tuberculis resperstae, rubentes, dum recentes sunt.

Nimirum *Cynips* foemina aculeo caudae perforat epidermidem et ovula deponit, quae stagnationem et accumulationem succorum gignunt, simulque, dum hi sensim indurescunt, domicilium aptum larvarum et pupparum effingunt, donec hae involucro deposito forma muscae claustra foramine solventes avolent. Europaeae gallae plerumque non indurescunt et deteriores sunt, at tamen atramento in commodo connubio idoneae (*HALL. l. c.*). Praestantiores ex Asia minori, nominatim Alepo, advehi solent, quae plerumque coloris coeruleo-lescentis vel nigrescentis sunt, vel grisei, superficiei inaequalis et verrucosae, et exiguu pedunculo ex insertione instructae. Iuniores colorem profunde coeruleum prae se ferunt, ponderosiores, texturae firmitatis et summae effi.

efficaciae. Aetate provectiores et per insectum iam egressum perforatae, intrinsecus erosae, leves, flavidae et vilioris pretii existunt. Hinc et mercatores has ipsas tingunt colore coeruleo, ut iuniores referant; sed dignoscuntur foramine et colore iusto profundiori et crassius illito (FABRICII *Briefe aus London*. p. 229.). Necessè igitur est, colligere gallas, antequam insectum illas perforaverit (DU HAMEL *Traité des arbres* vol. 2. p. 210.). Externa seu corticalis pars durior est fortior, quoad virtutem, quam interna friabilis.

Sapor valde acerbus et stipticus, odore nullo. Et aqua et spiritus vini extrahit particulas adstringentes, quae inspissando coadunantur, ita tamen, ut spiritus parciorem quantitatem extracti largiatur, scilicet $\frac{2}{4}$, idque magis adstringentis, aqua maiorem, scil. $\frac{2}{8}$ (NEUM. *Chemie* vol. 2. P. 2. p. 346.). Aqua infusa eruitur sal griseum, acidum, cuius uncia dimidia pro solutione requirit unciam unam et dimidiam aquae fervidae, vel uncias duodecim frigidae; spiritu vini facile solvitur; igne aperto flammam facile capit; destillatione sublimatum offert, referens Sal Benzoës, ut alias dotes silentio transeam (SCHEELE *Vet. Acad. Handl.* 1786. p. 30. sq. Cf. RICHTER in CRELL'S *Annal.* 1787. vol. 1. p. 139.). Vix ullum stipticum vegetabile hocce potentius existat, quae ipsa eius natura ex matrice, sive Quercu ipsa, derivanda, nihil animalis admiscetur. Hinc in connubio vitrioli maris nigredinem profundam in.

Inducit, et vulgatissimum additamentum pro parando atramento scriptorio praebet. Apud veteres materies pingendarum litterarum varii quidem coloris erat, sed niger color apud hosce quoque usitatissimus, qui quidem vetustiori tempore ex aliis rebus, quam quibus nos utimur, obtinebatur (De quo argumento CANEPARIUS *de atramentis cuiuscunque generis*, cuius editio Roderot. 1718. iam praesto est, et recens auctor WEHRS *vom Papier*, p. 58. sqq. consulendi). Interim experimentis factis in codicibus a saeculo nono ad decimum quintum usque manu scriptis constitit, atramentum simile nostro in usu fuisse (BLAGDEN in *Phil. Transact.* 1787. p. 451.). Compendiarius usus maxime commendat vulgare nostrum atramentum ex vitriolo martis, gallis, gummi arabico et liquido commodo, quod vulgo aqua est. Vitriolum martis aqua solutum decomponitur sensim, et ochram in fundum dimittit ea proportionem, qua phlogiston ferri dispergitur. Adhuc autem vegetabili quadam substantia stiptica, ut gallis, quae aliquid phlogistici continent, particulae ferreae attrahuntur ab ea, et combinantur cum ea, unde nigredo. Ne vero utraque pars fundum una petat, mucilaginosum vel glutinosum requiritur, quod aquam tam spissam reddit, ut dinittere dicta non possit. Simul eo praecavetur, ne liquidum per chartam penetret. Praestat in hunc scopum mucilaginosum vegetabile, ut gummi quoddam, quum gluten animale putredinem et foetorem excitet. Ut vero color tam profundus quam

dura-

durabilis fiat, scita proportione partium opus est, scilicet gallarum uncia una et dimidia, vitrioli uncia dimidia, aquae unciis viginti (Conf. RINMAN'S *Förfök til Järnets Historia*, p. 670. sq.). Id caedum parit, quod saepe nigredo litterarum sensum pallescat, vel plane deleatur, praecipue si ab accessu aëris illae arceri nequeant. In conservanda ista videntur veteres recentioribus antecelluisse. Resuscitatur scriptura optime per lixivium sanguinis primo illitum, succedente postea cauta illirione acidi debilis; ne vero nigredo rediviva exundet, charta bibula applicata absorbere oportet superfluum liquidum (BLAGDEN in *Phil. Transf. l. c. p. 455.*). Alius solutionem vinosam gallarum litteris illinendam in hunc scopum commodam declarat (CRELLS *chem. Annalen* 1786, vol. 2. p. 545.). Non minus emolumentum redundat ex miscela vitrioli martis et gallarum ad tingenda fila et texta lanea, sericea gossypina, lintea (Vid. LEWIS *phil. Commerce of arts*, p. 403. sq. POERNER *chem. Vers. zum Nutzen der Färbekunst*, vol. 1. p. 351. RINMAN *l. c. p. 637.*), item coria, cornua aliasque materies, ut adeo in arte tinctoria praecipuam basin pro colore nigro producendo constituat, et pro varia proportionemox niger, mox violaceus, mox brunus emergat.


Tinctura gallarum, ex pulvere earum et spiritu vini parata, ferrum in aquis solutum detegitur. Uncia dimidia gallarum ruditer confusa digeri potest cum spiritus vini unciis duabus

duabus subsequeute colatione. Color non debet esse nimis saturatus, sed quo debilior est, eo sensilior (WESTRUMB *kleine physik. chem. Abhandl. vol. 1. P. 2. p. 85.*). Si ferri exiguum inest, enascitur purpureus color, si multum, niger; quin si vel tria modo grana vitrioli martis in cantharo aquae solvuntur, haec per unicam iam tincturae guttam manifeste intra quinque minuta prima purpurascit, quum tamen in tribus vitrioli granis ferrum nonnisi $\frac{1}{24}$ grani efficiat (BERGM. *Opusc. vol. 1. p. 97*). Hinc ad copiam ferri in acidulis martialibus si arte parari debent, determinandam eiusmodi tinctura conducit. Usus fuit cl. MONRO (*Medic. Essays and Observations of Endinb. vol. 3. p. 51.*) in hunc scopum tinctura gallarum aquosa saturata, cuius primo tantum aquae cuidam martiali nativae ex mensura definitae guttatim instilletur, donec color non amplius mutetur. Hisce factis aequalis numerus guttarum tincturae gallarum instillatur aquae simplici, iam in mineralem factitiam vertendae, intra vitrum similis dimensionis, crassitie et pelluciditatis, et dein tot guttae solutionis vitrioli martis instillantur aquae, quot requiruntur, ut color idem sit ac aquae mineralis. Explorata hac ratione semel ferri quantitate necessaria in exigua aquae copia, postea iustum ferri pondus pro impraegnanda magna aquae quantitate facile definitur. Sed quum aquae ferrum vehentes aliis etiam partibus imbutae sint medicamentosis, aëre fixo, salinis, hasce addere in factitiis omnino opus est. Quomodo
id

id fiat, nemo concinnius exposuit etiam post fata summae laudabili BERGMANO, qui initium encheireseos ab impraegnatione aquae per aërem fixum facit, et ferrum immutatum adhibet (*Opusc. vol. 1. p. 212. sq.*).

Ineunte saeculo praesenti in Gallia a cll. RENEAUME et HOMBERG gallae commendabantur contra febres intermittentes ex multis ut fertur, documentis felicitis eventus, et in eo cortici Peruviano praeserendae iudicabantur, quod amaritiae careant, calorem non accendant, minori dosi valeant, recidivis aegrius locum concedant, et parvo pretio veneant. Argumentis convellere dicta tanto minus opus est, quum alii medici Gallici BOULDUC, LEMEKY, pater et filius, et GEOFFROY, experientiam sibi pluribus casibus adversam opponant (*Hist. de l'acad. R. d. sc. 1711. p. 37.*). Metuo stiptica fortiora in febrium intermittentium curatione, quum suffocent potius febres, quam sanent, et obstructions viscerum ciere soleant. In miscela tamen Gentianae vel aliorum amarorum nihil mali gallae attulerunt (CULLEN'S *Treatise of the Mat. med. vol. 2. p. 46.*). Flatibus in intestinis ex relaxatione collectis, et dolores lateris vel ventriculi, vomitum, meteorismum, tussim etc. cientibus, profuerunt in mixtura ex gallarum granis decem sensim ascendendo ad drachmam unam, aquae destillatae unciiis sex cum syrupi cuiusdam unciiis tribus, cochleatim longioribus intervallis vel breviori horae exhibita in Gallia

lia (GODART in *Journ. de Med.* 1778. p. 242. 367.). Alvum non constipavit, quin in multis solvit, et praecaveri hoc potest purgante per vices dato (*l. c.* p. 369.). Decoctum earum in clysmate profuit in dolorosis affectionibus lumborum et coxae ex relaxatione intestini recti, qua saepe congestiones haemorrhoidales excitantur (*l. c.* p. 371.). Conspirat egregie cum hisce ultimo loco dictis usus gallarum in Scotia in haemorrhoidibus coecis, dum vel unguentum ex pulveris subtilis gallarum et axungiae porcinae vel buryri aequalibus partibus illinitur (Ita BELL in *System. of Surgery*, vol. 2. p. 257. CULLEN *l. c.* p. 46. vero octuplum axungiae desiderat), vel si sedes valde alta in intestino recto est, infusum saturatum gallarum immittitur. Externa decocti, instar epithematis vel in iniectione, applicatio ad relaxatas partes confirmandas, ut in prolapsu ani vel uteri, haud rara est.



CYNARA

C Y N A R A .

LINN. *Syst. veg. p. 607. Gen. pl. p. 410.*

31. b.

(Vol. I. p. 71. pone Onopordum Acanth.)

Pharm. CYNARAE *Capita virentia ;
Folia .*

Cynara Scolymus; foliis subspinosis pinnatis indivisisque , calycinis squamis ovatis LINN. *Spec. pl. p. 1159.* *Cynara hortensis* foliis non aculeatis C. B. Icon: BLACKWELL'S *Herbal. tab. 458.* Perennis , in agris Italiae , Siciliae , inferioris Galliae spontanea .

Sed colitur in hortis , per hyemem apud nos fimo obtegenda , et praecipue quidem ob capita , quae magnitudine antistant omnibus reliquarum stirpium affinium . Sed vel huius respectu varietates exstant capitibus grandioribus , item minoribus . Resecantur capita ante flosculorum coeruleorum eruptionem ; tumque basi squamarum calycinarum adhaeret interius caro succosior et receptaculum florum discum constituit crassiorum succosiorum . Coctione utraque pars emollitur , et sapore ex amaricante dulci placet , praecipue receptaculum , in connubio sapidi embammatis ex ovis , butyro , fale

fale vel similibus. Reliquum, dentium imperio obnitens, relicitur. Quidam frixis capitibus utuntur. Alii cocta post refrigerium cum oleo, aceto et pipere ingerunt. Taedium sub esu Cynarae potius quam insalubrem eius naturam accusandam arbitror; attamen succum biliosum inde gigni et melancholicum GALENUS arguit. Facile contra digeritur, nec ob mucilaginis tantilium, quod cum dulcedine copulatur, nutriendi vi omnino caret. Arabes lotium inde pelli notarunt, et sic corpus a sordibus liberari; putidam adeo urinam inde reddi et venerem stimulari SEBIZIUS (*de aliment. facult. p. 346*). — Flosculi recentes aqua frigida macerati per duo nychthemera admixto tantillo salis vesci lac coagulant (YOUNG *Diff. de lacte in SANDIFORT Thess. diff. vol. 2. p. 534.*). Hinc et Arabes et Mauri eisdem pro parando caseo adhibent (SHAW'S *Travels p. 241.*).

Folia. Horum et quidem maiorum inferiorum costae elixae, ut alia olera, comedi solent.

Memoranda vero hic praecipue sunt ob succum, qui in hydropse a quibusdam extollitur. Huius et vini maderatici ope partes aequales ad tria cochlearia mane et vespri intra hoc malum feliciter haustae (*Journal entranger. Excidit locus*). Magnum praesidium etiam similis miscela fuit in Dania, c. c. succi unciae quatuor cum vino generoso (AASKOW in *Vol. VI.*)

Act. soc. med. Havniens. vol. 1. p. 201.), praefertim in hydrope scorbutico.

43. b.

(Vol. 1. p. 90 pone *Lactucam fativam.*)

Pharm. LACTUCA SYLVESTRIS
Herba.

Lactuca virosa; foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis LINN. *Spec. pl. p. 1119.* *Lactuca sylvestris* odore viroso C. B. *Οριδαξ αγρια* DIOSC. ut videtur. Icon in COLLIN *Observ. circa morb. P. 6.* Pl. biennis, in aggeribus et sepibus Europae australioris crescens.

Scatet, ut congener *Scariola*, lacte amaro acri, viroso, quae species igitur natura sua deflectunt a reliquis semiflosculosis et tuentur nequitiam aliarum lactescentium stirpium. *Virosa* dicta censetur efficacior quam altera. De ista scimus ipsos vapores inebriare itidem comestam id facere (HALL. *Hist. stirp. Helv. n. 15.*). Lac eius prout cum papaverino convenit odore et sapore, ita probabile hanc *Lactucam* fuisse, quae antiquitus (DIOSC. *M. m. lib. 4. c. 65.*) opio lucri fraudulenti causa admista fuit, quin etiamnum subinde admisceri.


Sed alia eaque potior ratio, cur peculiari commentatione eam prosequar, continetur vi, quam in hydrope aliisque quibusdam morbis recentius illam exseruisse narratum est. COL-LINUS (*libro cit.* qui unice de huius viribus agit, edito a. 1780.) primus ad eam tentandam animum advertit, usus quidem, ut refert in libro ipso, Lact. Scariola, depingens autem in tabula Lactucam virosam, in quam bene descriptio amplior HALLERI (*Hist. stirp. Helv. n. 15.*) quadrat. Hic etiam declarat verius pro varietatibus unius eiusdemque speciei, quam peculiaribus speciebus haberi. — Male a rhizotomis vel pharmacopolis huic subinde Sonchus oleraceus L. substituitur.

Ut autem initio statim noscatur, qua speciatim de re sermo sit, monendum herbae succum in extracti densitatem inspissatum adhiberi. Scilicet succus ex recenti planta et anthesi vicina expressus, et per nychthemera loco frigido ne fermentescat servatus, decantatur, et, postquam ebulliverit per aliquot momenta, colatur et ope albuminis ovorum et traiectione per pannum laneum depuratur, et dein leni igne ad dimidium evapuratur; ab igne remotus et refrigeratus secunda vice per albumen ovorum brevi coctione praegressa per pannum traiecitur, clarior redditur, demum leni igne in extracti spissitudinem densatur. Eiusmodi extractum non raro spiculis salinis micat. Ideo autem depuratio tam sollicitè peragitur, ut particulae terreae, quibus obvelantur salinae, a

quibus summa vis, plurimam partem auferantur (COLLIN. *l. c. p. 14. sq.*). Neglecta depuratione iusta, dupla vel tripla dosi opus est. Conserva herbae recentis inanis reperta (JOSEPH. DE PLENCIZ *Act. et observ. med. p. 107.*). Ex multo maiori numero 24. casibus praestantiam huius extracti confirmare annisus est COLLINUS, initio experimentorum inde ab anno 1771. facto. Hoc ipsum materiam lentam glutinosam viscera obstruentem attenuat, solvit, et idoneam reddit, ut per lotii vias, cutem, vel, si pulmones obsederit, per scretus reiciatur. Icterus a tali vitio in hydropicis natus feliciter curat simulque bilis vices supplet. Praecipue autem in hydropse valuit, siue ille ab eiusmodi viscido obstruente siue nimia laxitate solidorum et humorum dissolutione originem traheret. Sufficit interdum in hisce quotidie grana octodecim, viginti, triginta capere, qua minori dosi in vitio dissolutionis et laxitatis acquiescere licet. Inveteratae autem viscerum obstructions maiores doses sibi vindicant, a drachma una ad tres. Nec maior dosi nocet, licet omnino nauseam excitet. Sub decursum curationis urinam pellit, saepe etiam sudorem copiose. Alvum plerumque simul mollem reddit, non vero diarrhoeam ciet. Raro opus est, hydropse sublato, roborantia subiungere, subinde tamen id necesse videtur. Sub usu ipso autem creber potus non negligendus est.

Fatendum omnino pauciores imitatores experimentorum excitasse hanc stirpem, quam multas alias Vindobonae primum celebratas; saltim eventus peregrinorum a paucissimis publici iuris factus est. Unicum casum modo sistit cl. JOSEPH. A PLENCIZ (*l. c.*), in quo extractum cito efficaciam suam prodidit. Adversum illi est iudicium L. B. A QUARIN (*Animadv. pract. p. 188.*), qui saepe in hydrope queritur frustra propinatum, addens qui huic remedio faverent, ut eius famam tueri possent, extracti Scillae magnam dosin admiscuisse. COLLINUS eiusmodi connubium non memorat.

Media via semper soleo inter magnas laudes et magna vituperia virium medicaminum ire. Et in hocce consilio ratione stirpis, de qua agitur, confirmor cl. DURANDE (*Hist. de la Soc. R. de med. tom. 2. p. 297.*) experientia, qui successu in hydrope se quidem destitutum hacce Lactuca dolet, sed ob anodyniam et aperientem efficaciam sub variis conditionibus salutarem haud parum invenit; nominatim in febribus intermittentibus, in quibus stimulus biliosus nervos irritat, in colica hepatica et affectionibus aliis dolorosis.



G L O B U L A R I A.

LINN. *Syst. veg.* p. 119. *Gen. pl.* p. 47.

84. b.

(Vol. I. p. 148 pone Scabiosam Succisam.)

Pharm. ALYPI Folia.


Globularia Alypum; caule fruticoso, foliis lanceolatis tridentatis integrisque LINN. *Spec. pl.* p. 139. Thymelaea foliis acutis, capitulo Succisae C. B. Hippoglossum valentinum CLUS. *rar. pl. hist.* p. 90. c. fig. Alypum monspeliensium, s. Frutex terribilis JO. BAUH. *Hist. pl.* vol. 1. p. 598. NISSOLE *Mem. de l'Ac. d. sc. de Paris* 1712. p. 341. tab. 18. Globularia fruticosa, myrti folio tridentato GARID. *Hist. des plantes d'Aix*, p. 210. Suffrutex in Gallo-Provinciae, Valentiae et Murciae, item Italiae, sylvis ad rupes et saxosa crescens.

Habent pleraeque regiones medicamina quaedam sibi familiaria, quae alibi saepe vix nomine nota sunt, in ampliori recensu autem omitti nequeunt, dum certiora quaedam, quam vulgo per itineratores licet, de iis in medium proferri possunt. Haec est ratio, cur et Alypum reliquis stirpibus interferam, quod qui-

dem in Gallo. Provincia praecipue medico usu inclaruit.

Amarities insignis stirpis iam dudum notata, nec vis efficaciter alvum movens latuit praecedentia tempora (V. CLUS. JO. BAUH. *loc. cit.*). Quin cum Tithymalo comparata (J. B.). Placuit quoque olim empiricis in Gallo. Provincia, Sennae eam substituere, sed ambiguo eventu, ob drasticam eiusdem vim (NISSOLE *l. c. p.* 342.). A circumforaneis eius Hispaniae regionis, quae olim Baetia dicta, decoctum lue venerea affectis quondam non sine magno successu oblatum fuit (CLUS.). Sed neque ex horum experimentis multum bonae frugis capi potest, neque ex aliis ferioribus rusticorum Gallo. Provinciae, quibus cognoscitur pulverem Alypi ad pondus drachmae unius (GARIDEL *l. c.*), vel infusum ex eius drachmis duabus et aquae drachmis octodecim circiter factum (TOURNEFORT apud GARIDEL *l. c.*), absque hypercatharsi vim exercuisse. Oportuit accedere medici attenti examen, quod ipsum iamiam nobis suppetit, a cl. RAMEL M. D. praestitum (in *Journ. de Medec.* 1784. *tom.* 62. *p.* 379. *sq.*). Hic ipse herbam non solum rusticis ibidem hodie usitatam alvi purgandae causa novit, sed ipse tam in nosocomio quam apud cives oppidi Gallo-Provinciae inferioris Aubagne saepissime adhibuit, item in ora Africana. Sic igitur Alypum sordes primarum viarum, ex tono labefactato collectas, egregie everrit; diarrhoeas ex eadem

causa subnatas compescit; hydropes relaxatione et diathesi aquosa humorum oriundos tollit (*l. c. p.* 382.). Sed praecipue efficaciam suam declarat in febribus intermittentibus (*l. c. sq.*), duplici sua natura, qua et sordes eliminat et roborat. Praecedit in curatione eius talis administratio, ut alvum moveat, quo sine foliorum eius drachmae duae cum saie cathartico et manna iunctim dantur; fordibus rite subactis Alypum solum instar febrifugi in decocto propinatur, scilicet et foliorum uncia dimidia, per quadrantem horae in tribus unciiis aquae cocta, parato, hocque colato et in duas partes diviso, quarum una capitur mane, altera paullo ante paroxysmum vel quarta hora post meridiem. Nimum si purgat, diminuenda dosis est. Nolo addere plura, quae ex coniectura probabili unice petita videntur. Scopo purgandi uncia una decocti conceditur. Sicciores ad ditamento drachmae dimidiaae cremoris tartari opus habent; palato velificamur additis aliquot segmentis mali citrei. Nec delicatiores abhorrent in provincia Galliae significata ab usu huius remedii; nec nocet hominibus systematis nervosi sensilioris (*l. c. p.* 386).



P A R I S.

LINN. *Syst. veg.* p. 315. *Gen. pl.* p. 198.

142. b.

(Vol. I. p. 281. pone *Ruscum Hypoglossum*)

Pharm. PARIDIS *Herba* ; *Radix*.

Paris quadrifolia ; LINN. *Spec. pl.* p. 526.
Solanum quadrifolium bacciferum C. B. *Icon:*
Fl. Dan. tab. 139. Planta perennis locis nemorosis crescens et ineunte aestate florens.

Suspecta planta, colore lurido, odore viroso et narcotico. Gallinas fructus necant (C. GESNER, *Epist.* p. 99. a, ex peregrina narratione). Nec omnino nullum nocivae naturae argumentum desumi potest ex nominibus vernaculis, quorum *Wolffsbeere*, *Raisin de Renard*, *Trollbär* (Svec. h. e. *baccae fascinatoriae*) exempla praebent. Sed maneamus in iis, quae in corpore humano comperta sunt, etsi paucioribus documentis, quam rei pondus requirit. Opio aemula Folia et fructum declarat C. GESNERUS (l. c. et p. 53. a.), et recepta stirps in antidotum Saxoniam. Haec ipsa compositum remedium erat (l. c. p. 99. a.) hinc experimentum, quod in se ipse cum eadem cepit, non ad foiam Paridem applicari potest.

potest. Inclyta illa antidotus olim contra pestem erat, in qua notum opii olim magnam fiduciam fuisse. Plura discimus ex propriis cl. BERGII (*Mat. med. p. 313.*) periculis, qui pulveris foliorum siccatorum scrupulum unum quavis vespera pueris 10. vel 12. annorum tussi convulsiva correptis dedi, unde alvus leniter fluxit, somnus pacatior evasit, symptomata aliquantum mitigata. Convulsiones saepe hocce pulvere compefcuit.

Radix filiformis, geniculata, crassitie culmi frumentacei, extus albido bruna, interne alba. Vomitus dupla Ipecacuanhae dosi excitare, iam dudum notaverat summus LINNEUS (*Fl. Lapp. p. 117.*). Nuperius id confirmatum, dum grana 35. ad 50. modicum modo effectum praestiterunt (COSTE et WILLEMET *Essays sur quelques plantes indigenes, p. 12.*



CYTINUS.

C Y T I N U S.

LINN. *Syst. veg.* p. 688. *Gen. pl.* p. 506.

151. b.

(Vol. I. p. 297. pone *Afarum Europaeum.*)

Pharm. HYPOCISTIDIS *Succus.*

Cytinus Hypocistis; LINN. *Syst. veg. l. c.* *Afarum Hypocistis Spec. pl.* p. 633. *Hypocistis C. B. Hypocistis flore luteo* TOURN. *Coroll.* p. 46. *tab.* 477. DU HAMEL *Traité des Arbres vol. 1. p.* 170. *tab.* 68. ubi initia eius cernuntur. Planta perennis parasitica, carnosa trium vel quatuor pollicum, radicibus specierum variarum Cisti in calidioribus regionibus innascens. Reperitur in regionibus aridis et arenosis, in quibus frutices isti crescere solent, et praesertim Cisto ladaniferae adhaeret (GERARD *Fl. Galloprov.* p. 157.), ut Gallia inferiori, Hispania, Lusitania, Italia; maiori adhuc copia in Graecia et Asia minori obtinet.

Stirpis, vel passim modo succi inde expressi, meminerunt iam THEOPHRASTUS, DIOSCORIDES (*M. m. lib. 1. c. 127. p. 64.*), PAULLUS AEGINETA aliique Graecorum, quibus planta *Υποκιστις* dicitur.

Incla-

Inclaruit succo, quem ex fructibus recentibus contusis exprimunt et solis calore in extractum solidum densant (GEOFFROY *M. m. Traité*, tom. 4. p. 372.). Narrat quoque DIOSCORIDES quosdam stirpem arefactam contusamque macerare et decoquere, demum post colationem praegressam succum inspissare. Transfertur Massiliam ex Creta et Languedocia pro venditione ad externos. Massam repraesentat nigram, in fragmento splendentem, fragilem, saporis subacidi adstringentis, inodoram. Masticatione adhaeret primum dentibus, sed saliva sensim solvitur. Tam aqua, quam spiritus vini, illum solvit. Nigredinem contrahit solutio eius addito martis vitriolo.

Vires eius solent exigi ad modulum succi Acaciae verae (*Appar. med. vol. 2.*), a quo praesens differt eo, quod fere omnino spiritu vini recipitur, quum succus Acaciae sui parum modo vel nihil illi impertiat (LEWIS *M. m. p. 317.*). Veteres eodem haemorrhagias et profluvia alvina coërcebant, et ob tonicam vim magni faciebant. Nostra aetas vilipendit ob rariorem stiptica adhibendi opportunitatem, et quod alia efficacia prostant. Composita varia maiorum nostrorum ampli ambitus etiamnum intrat, ut Trochiscos de Carabe, Theriacam, Mithridatium.

154. b.

(Vol. I. p. 307 pone Galium Mollug.)

Pharm. APARINES *Herba.*

Galium Aparine; foliis octonis lanceolatis carinis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructibus hispidis LINN. *Syst. veg.* p. 127. Απαρινή DIOSC. *Aparine vulgaris* C. B. Icon: *Fl. Dan. tab.* 495. Planta annua, ad sepes creberrima, etiam in cultis.

Facile confunditur cum *Valantia Aparine*, quae, ne dicam de classico caractere, distinguitur caule breviori, firmiori et rectiori, parum ramoso, flosculo hermaphrodito sessili, lateralibus masculis pedicellatis, ternis vel quaternis; quum in Galio dicto caulis sit ad aliquot pedes longior, fragilis, pedunculis unifloris.

Tota stirps recens scatet succo aquoso. Gustata prodit saporem amaricantem, quem excipit subacris. Odoris vero expers est. Frustra quaeritur in plerisque materiae medicae indicibus. Nolo conlicere vires ex gustatu, qui quidem herbam ab opprobrio inertiae liberat, sed manebo in iis, quas experientia suggerit, qua ut ulterius confirmentur virtutes tanto magis excitandi sunt practici, quum ad vulgatissimas stirpes haec ipsa pertineat. Herbam contritam et axungia exceptam externa
ap-

applicatione strumas discutere, DIOSCORIDES (*M. m. lib. 3. cap. 104.*) iam notavit. Serius in Italia vis in scrophulosis tumoribus confirmata, profuitque ibidem tam in clausis quam apertis, buryro fervente macerata (GASPARI *Osservazioni storiche, mediche etc.* 1731. p. 17. sq.). Simili modo adhibita in ditione Veronensi in epidemica constitutione, qua praeunte febre glandulae ad collum intumuerant induratae, profuit; testiculorum vel mammarum intumescencia, quae aliis contigit, fomentatione decocti huius herbae discussa (*l. c. p. 20.*). Sub nuperioribus tamen quibusdam periculis (CULLENI, qui adstringentibus accenset in *Treatise of the Mat med.* vol. 2. p. 37.) expectationi non respondit. Incipiente hydrope succus, ad tres uncias cum vino bis de die captus (DE MAYERNE *Prax. med.* P. 1. p. 390.), tam aperiendo, quam lotium ducendo, opem praestare videtur. Nostreis temporibus antiscorbutici egregii laude Aparine celebrata est; quo fine confert, cyathum succi expressi quovis mane per novem vel decem dies haurire, vel sub recentis herbae inopia infusum theaeforme siccae substituere (*Medical and philosophical Commentaries*, vol. 5. p. 326. sq. Item EDWARDS'S *Treatise on the Goose grass, or Clivers and its efficacy in the cure of the most inveterate Scurvy.* Lond. 8. Videtur haec scriptiuncula 2. 1784. prodiiisse). Casus recensiti inter alia symptomata dolores et eruptiones scorbuticas memorant. Infantibus quoque tuto praebetur.

IGNA.

I G N A T I A.

LINN. *Syst. veg. ed.* 14. p. 227. *Suppl. plant. p.* 120

183. b.

(Vol. 1. 401 pone Strychnon colubr.)

Pharm. FABIA St. IGNATII vulgo
FABIA INDICA *Ph.* Paris.

Ignatia amara; LINN. *Suppl. pl. p.* 149.
Ignatiana philippinica LAUREIRO *Flor. cochinchin. tom.* 1. Igasur. seu nux vomica legitima
Serapionis CAMELL. in *Phil. Transf. vol.* 21.
n. 250. *p.* 88. *tab.* 1. *fig.* 4. 5. 6. Cucurbitifera
Malabathri foliis scandens, Coto-longay et
Cantara Philippinis orientalibus dicta PLUCKEN.
Mant. p. 60. Arbor insularum Philippinarum.

Serius Strychnos species visa est arbor
(Vid. BERG. *Mat. med. p.* 146.); novissime
peculiare genus constituere illam debere didi-
cimus. Faba sic dicta per Jesuitas ex insulis
istis translata fuit, unde ratio nominis ab au-
ctore huius ordinis desumpta.

Fructus pomum pyriforme est, unilocula-
re, intra corticem crassum ligneum continens
copiam seminum, saepe viginti, pro sede
diversa formae multiplicis. Haecce, prout sicca
ea

ea fervamus tenuissime substriata, ab una parte gibba, ab altera multangularia sunt, subcompressa, diametri fere pollicaris, extrinsecus pallide fusca et farina quasi conspersa, sed tenaciter inhaerente, interne fusco viridia, compagis corneae, ut tamen cultro scindi possit. In cotyledones non dehiscunt. Ex hac descriptione Fabae nomen vitiosum esse cognoscitur.

Innotuerunt inde ab a. 1699. per GEORG. JOSEPHUM CAMELLI, qui Rayum et Petiverium de iis certiores reddiderat, unde enata commentatio in phil. Transactionibus cit.

Insigni amaritie instruitur ipsum semen gustatum, ut vel exiguum segmentum, per momentum linguae applicatum, sensum hunc per linguam satis durabilem diffundat. Non vero instar simplicis amari considerandum est, sed narcoticas vires iunctas habet.

Dimidium fere extracti aquosi primi largitur, reliquum fere nonnisi terrestres partes constituit, ut tamen et aqua resinosas partes, quae partes, quae parcius insunt, evolvat; nam per spiritum vini prima extractione eliciuntur resinae scrupuli duo cum dimidio (NEUMANN *Chym. med. vol. 2. P. 2. p. 294.*). Infusum utriusque generis valde amarum est. Aegrius in pulverem contunditur, hinc infusionibus rasurae cum aqua vel spiritu vini factis praecipue utuntur.

De narcotica indole testantur casus funestissimi tam in brutis, quam et aliquando in hominibus, observati. In brutis iidem effectus apparuerunt, quales a nuce vomica. Nempe pulveris drachma dimidia, cum mica panis in bolum subacta, et cani maiori ingesta, hic post semihorium male affici coepit et saliva ex ore large effluxit, post horam convulsionibus quater correptus perijt (SIDREN et ALM *Diff. de nuce vomica*, Ups. 1780. p. 13). Alius mediocris magnitudinis canis ex scrupulo dimidio subristis et inquietus valde et pavidus inter salivae crebrum profluvium post viginti convulsivos insulzus hora octava a sumpta f. ba. extinctus est (l. c. p. 24). Pulvis vel in intestino ieiuno vel ileo vel coeco in hisce reperi- tus post mortem est. Ut ne vero cum meritis- simo CULLEN (*Treatise of the Mat. med. vol. 2. p. 64*) existimes in amaritie ipsa latere virus, contraria sunt experimenta cum amaris insignis gradus studio capta e. c. cum extracto Gentianae, Centaurii minoris, Trifolii fibrini, fellis bovis, quae omnia nihil mali insigniori dosi attulerunt (ALM. *Diff. cit. p. 15*). — Apud homines facile vomitum ciet alvumque movet (l. c. p. 91); imo exempla sunt spasmodorum et convulsionum, riius involuntarii, angustiae pectoris, vertiginis, sudorum frigidorum inde et apud homines natorum (CAMEL- LI), vel ex teneriori eorum natura vel iusto maiori dosi. Ita Hispani in insulis dictis hisce malis afficiuntur, quum Indi impune semen ingerunt. Mirum igitur, quod cl. VALENTI-
Vol. VI. C *NUS*

NUS (*Hist. simpl. reform. p. 198. §. 4.*) ausus fuerit , infantibus adeo fugentibus illud praecipere , unde non aliud malum , praeter borborygmos , consequutum refert . Mitius quoque de illo sentit cl. LAUREIRO (*l. c.*) a granis sex ad duodecim concedens aqua vel vino captum , et vertiginem spasmosque , si a maiori dosi generantur , aqua frigida et fluido Limoniorum dispelli affirmans , nuceque vomica blandius pronuncians .

Id saltem nemo dicta perpendens inficiabitur , non sine provida cautione aegris administrari posse . Ridenda omnino credulitas incolarum insularum Philippinarum , quae in magna varietate morborum natura contrariorum fere cuivis accommodatum putat , et instar amuleti applicatum vel collo suspensum ad arcenda contagia et veneficia adhibet (CAMELLI , VALENTYN.) . Praecipue inclaruit vi febrifuga , etiam serioribus experientis confirmata . Placuit hoc sine pauca grana rasurae cum aqua Cardui benedicti per nychthemera macerare illudque liquidum ante paroxysmum suppeditare , quo ipso saepe febris cessavit (NEUM. *l. c. p. 291*) . Grana octo adultis , grana sex infantibus exhibita in febribus intermittentibus , contra corticem Peruvianum rebellibus FOUR DE BOURIER in *Hist. de la Soc. en Med. vol. 1. p. 340.*) . Quin grana duo eiusdem potentiae ac integra dosis corticis Peruv. habita fuerunt (LEWIS *M. m. p. 412*) . Alius propinandi semen modus haud minus commodus est
in

in infusione cum aqua fervida. Ita ex seminis granis duobus et aquae unciis duabus liquidum emerfit nauseosum, amarum, quod bis per diem datum, quatuor homines a febre quartana sanavit, in octo aliis autem iners fuit (LIND *Dis. in hot. climates* p. 306).

In epilepsia aliisque convulsivis vel spasticis motibus plures illud extollunt (*Aët. Bero- lin. Dec. 2. vol. 10. p. 12* HERM. *Cynof. Mat. med. tom. 2. p. 231*). Sanatus est infans tenellus, epilepsia fere septies afflictus, aliquot huius granis (VALENTIN. *l. c. p. 198*). Sed nihil temere moliendum cum medicina effectus tam ambigui, nec satis adhuc explorati.

196. b.

(Vol. I. p. 429 pone Violam odoratam.)

Pharm. VIOLAE CANINAE Radix.

-*Viola Canina*; caule adultiore adscendente, foliis oblongo cordatis LINN. *Spec. pl. p. 1324*. *Viola maritima inodora sylvestris* C. B. Icon: CURTIS *Fl. Lond.* Planta perennis, frequens in sylvis caeduis et dumetis.

Insuetum est, illam inter medicamina admittere. Nam quod fraudulentis homines saepe

C 2

floribus

floribus additis, qui odore omni carent, syrupum violarum corrumpant (RICHT. *corrupt. medic. p. 39*), reprehensione dignum est. Nec emolliendi et refrigerandi efficacia adeo *Herba* eminet, ut pro fumentatione, clysmate et lotionem, commendari (prout fecit THEODORUS TABERNAEMONTANUS in *Kräuterbuch*, p. 687) possit.

Radiciis haud ita pridem primum mentio facta fuit, in qua et plurimum efficaciae latet. Haec tenuis, varie flexa, hinc inde nodosa, fibris bene multis, cortice ex fusco albedo, parenchymate albo. Sicca odorem mucidum spirat, ceterum insipida. Ex cognatione radicem eius, ut istam *Violae odoratae* et *V. Ipecacuanhae*, vomitum ciere et alvum movere iam conicitur. Pondus vero accedit grave experimentis factis in hominibus. Unicum eiusmodi sistitur a. 1778. a cll. COSTE et WILLEMET (in *Essais sur quelques plantes indigènes*, p. 7), nec satis exacte descriptum, in quo decoctum ex radicis ad minimum drachma una vomitionem unam et alvi deiectiones septem excitavit. Plura Gottingae a cl. NIEMEYER (*Diss. de Violae caninae in medicina usu* 1785.) instituta radice sicca et leni calore siccata, et quidem in hominibus diversae aetatis, victui crudo et crasso assuetis et magnas medicaminum doses requirentibus. Confectaria ex undecim casibus deducenda paucis complectar. Itaque pulveris scrupulus unus, ad drachmam dimidiam exiguis intervallis repetitus, unicam vom-

vomitionem creavit et quinquies vel sexies alvum sollicitavit (*l. c. Cas. 1. 2.*). Fuerunt, quibus, ex eiusmodi dosibus eodem ordine repetitis, modo alvus soluta (*Cas. 3. 7.*). Decoctum non valde dilutum, ex radicis drachmis duabus ad unciam dimidiam, partitim captum, neque sursum neque deorsum effectum exseruit (*Cas. 4.*). Nec miscelae pulveris cum aqua (*Cas. 4. 5.*), nec infusi (*Cas. 6.*) haecce vis fuit. Tartaro emetico autem stimulatus pulvis utrumque eventum post se traxit, ut facile cogitatu est (*Cas. 8. 11.*). Auguria ex hisce periculis, quoad varietatem experimentorum paucis, nolo addere. Fidem stabiliet futura aetas. Inter mitiora evacuantia collocari meretur.

196. c.

(Vol. I. post Violam caninam.)

Pharm. VIOLAE TRICOLORIS
Herba.

Viola tricolor; caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis, stipulis pinnatifidis LINN.
Spec. pl. p. 1326 β. *Viola tricolor hortensis repens* C. B. *Jacea s. Flos trinitatis* CAMER
epit. MATTHIOL. p. 912. Icon. Fl. Dan. tab. 623. CURTIS Fl. Lond. Annua, in pratis,
C 3 arvis

arvis montanis temperationis Europae habitat, sponte in hortis sese disseminans.

Herba recens masticata subamaricans cum sapore florum Naphae aemulo, salivam viridem reddens et mucilaginosam, et in lingua diu post sensum acredinis relinquens. Odorem fortius contrita spargit, ad illum nucleorum Persicae nonnihil accedentem. Conquassata ob mucilaginem tenacitarem cataplasmatibus acquirit. Infusum aquosum sive recentis sive siccae herbae similia criteria prodit. Infusione protracta autem gratia odoris aufugit.

Destillatione siccae vel recentis herbae cum aqua una cum hac pauxillum olei supernatantis erumpit odoris dicti, saporis subacris (*HAASE Diff. de Viola tricolore, p. 7*). Extractum aquosum pr. constituit dimidium ponderis siccae herbae, $\frac{1}{8}$ autem circiter recentis (*Ibid. p. 8*). Aliae analyses aliorum petendae (*Vid. HAASE Diff. cit.*). Effectus licet medicaminum in corpus humanum ne ex subtilissima analysi tuto eruantur: aliqua tamen lux accenditur in eorum diiudicatione, qui mox recensentur, si ad partes oleosas aethereas, mucilaginosas et acre, quod lingua revelat, attenditur.

Infusum aqua factum alvum laxat, etiam quibusdam stomachum subvertit teste medico celebri Svecico (*BERGIO in Mat. med. p. 709*), qui et siccam herbam purgare, sed
 majori

maiori dosi, narrat. Alius vero concedit quidem, purgantem vim emergere in pueris tenerioris aetatis ex decocto siccae, parato ex herbae uncia dimidia et aquae libra una, et paulatim hausto, negat autem emeticam, licet in quibusdam nausea accederet (HAASE *l. c. p. 14*). Pulvis radiceis ad drachmam unam caput conatus vomendi quidem excitavit, non autem veram vomitionem, lorium simul largiter movit (*Ibid.*).

Atque haec herba praeterito et illum praecedente seculo in haud exigua existimatione fuit, ut, inter virtutes magis ambiguas, epilepsiae, asthmatis, praecipue autem morbis cutaneis, scabiei, pruritus, ulceribus mederi affirmarent, prout legere est apud MATTHIOLUM (*Comment. in DIOSC. p. 822*), FUCHSIUM (*Hist. stirp. p. 804*), JO. BAUHINUM (*Hist. pl. tom. 3. p. 547*) aliosque, qui breviter enunciatis eadem fere edisserunt. Amplior reliquis est in viribus proponendis THEDORUS (*Kräuterbuch, tom. 2. p. 691*), miscelam variam et aquam, syrupum, sal quoque huius Violae commendans.

Longum vero postea silentium de ista apud medicos obtinuit, donec cel. STRACK (*De crusta lactea infantum eiusdemque remedio dissertatio, quam acad. scient. Lugd. Gall. praemio coronavit; 1776. Franc. ad Moen. 1779. 8.*) stirpem iterum celebraret. Indeque ab hoc tempore confirmata veritas a vetustioribus me-

dicis prolata, in affectionibus variis cutis chronicis haud exigui momenti Violam hanc esse; sed coevi nostri id primum praestiterunt, ut res in verum aegrorum commodum deduci posset. Si hoc praecipuum artis est: parum refert, utrum recentiores propria sagacitate ducti eandem in usum vocaverint, an contra nonnisi praecedentis aetatis vestigiis admoniti. Etenim sunt, qui vocem antiquam Germanicam Freysam s. Freisam idem significare dicunt ac crustam lacteam, alii (FRISCH *Teutsch Latein. Wörterbuch*, p. 290) idem ac epilepsiam; certe nomen Freysamkraut iam antiquitus nostrae stirpi in Germania tributum fuit. STRACKIUS in exploranda et confirmanda eius contra crustam lacteam praestantia unice versatus est. Hoc malo lactantes infantes magis quam ablactati corripuntur, attamen et serius aliquando infestat, et ultra ablactationem perdurat, faciemque praecipue deturpat. Ille vero sanavit illud vitium herbae recentis pugillo uno, cocto in lactis vaccini sufficiente quantitate (quam ille non indicat); vel et pulveris herbae drachma dimidia per bihorium in lacte cocta et mane vespersque hausta; variandae exhibitionis causa pulvem quoque ex decocto hocce lacteo adiecto, pane vel farina, parari curavit. Sic post octo dies eruptio uber succedit, et lotium, nisi iam antea prae natura mo bi decrescentis foetore urinam felinam retulerit, hanc spirat (STRACK *l. c.* p. 4; SCHÄFFER in vers. Germ. libri ARMSTRONG *v. d. Kinderkrankheiten*, 1786. p. 72). Continuatio pro-

protrahitur, donec crusta delapsa fuerit et cutis pura appareat. Ad recidivas avertendas, e re est, diutius herbam administrare, donec facies mollis nec amplius tumida conspiciatur, cutis quoque omnino sana, et lotium foetoris expers (*loc. cit.* p. 44. sq.). Fidem fecit cel. viro, ut dicit, experientia viginti annorum (p. 30). Contra eundem morbum alii haud pauci hanc stirpem adhibuerunt non minori successu, vel eadem ratione vel alia mutata. Ita cel. METZGER (*Verm. med. Schriften*, vol. 2. p. 239) pusionem nutricibus debilitatum herba variis cibis lacteis cocta intra sex hebdomades a crusta lactea liberavit, remanente modo pruritu, quem aqua saturnina GOULARDI sustulit. In Svecia pluries successit (*Veckoskrift för Läkare*, vol. 2. p. 153 378 vol. 4. p. 95 vol. 9. p. 27); et casu singulari ibidem proficuum visum, infusum saturatum iunctim infanti lactanti et nutrici exhibere (*Veckoskrift för Läkare*, vol. 2. p. 153). Viola bicolor arvensis C. B. etiam in Svecia tentata longe debiliorem effectum exseruit (*Veckoskrift*, vol. 9. l. c.). Cl. HAASE dissertatio (*de Viola tricolore*. Erlang. 1782.), ut in universum lecta de viribus huius stirpis dignissima, ita de virtute eius in crusta lactea memorabiles historias sistit (*Cas.* 5. 14. 16.). Harum seorsim dicenda illa de puero tussi gravissima cum metu suffocationis simul affecto, quae autem pectoris mala una cum crusta lactea decocto Violae omnino cessarunt (*Cas.* 5.), ut et inde lux affulgeat asperso maiorum de vi eius in liberando pectore.

Quod

Quod alibi (*Progr. de medendi tineae capitis ratione Paralipomena in Opusc. vol. 2. p. 228*) innui, inter exanthemata pleraque capitis, varils etsi nominibus insignita, non tantum discrimen intercedere, ac vulgo putatur id quum multis documentis, et inter haec quoque remedium eorundem in diversis hisce exanthematibus aequali vi manifestatur, et auxilio Violae huius in tinea capitis, achoribus, serpigine. Scorsim noto, matronam sexaginta annorum, per dimidium annum tinea laborantem, fere integre eandem decocto Violae lacteo superasse; perfectae sanationi obstitit modo herbae penuria (*Veckoskrift för Läkare, vol. 2. p. 377*). In muliere rustica intra septem hebdomades idem felix eventus contigit (*l. c. vol. 4. p. 95*). Ita continuatione pertinaci puella tredecim annorum sanata (*l. c. vol. 8. p. 4.*). In puero trienni induratio et intumescencia glandularum colli simul suberat, attamen per quatuor hebdomades sanabatur; hic idem reddidit lotium felini instar olens (*HAASE Diff. cit. cas. 4.*). Virgo nobilis septendecim annorum, achoribus frontis cum serpigine infestata, inde convaluit (*l. c. cas. 12.*); item puella achoribus per totam faciem foedata (*l. c. cas. 13.*). Superfluum erit plura tineae curatae exempla afferre (*Conf. Veckoskrift för Läkare, vol. 4. p. 74*). — Patet hisce exemplis, et adultioribus et aetate proVectis opem in hisce angustiiis stirpem ferre. Odor lotii peculiaris descriptus etiam in pueris tinea correptis sentitur Violae decocto valde saturato hausto

(IIAA.

(HAASE *l. c.* p. 14). Imo foemina rheumatica post eius usum una cum alvo liquida urinam foetidissimam minxit (*l. c. cas.* 8.). Id quoque omnibus commune est, quod eruptio capto remedio uberior subsequatur.

Sed seorsim significandum, herpetis eximium esse remedium (*Veckoskrift*, vol. 4. *l. c.* vol. 8. p. 115). Hoc vitio aegrotavit foemina per decem annos, liberata ab eodem demum decocto stirpis lacteo et solutione mercurii sublimati extus applicata (*Bemerkungen üb. versch. wicht. Gegenstände d. Wundarzneykunst*, p. 77). Adde dictis morbis cutaneis impetiginem (HAASE *diff. cit.* p. 15 *cas.* 1. *cas.* 21.), scabiem (*l. c. cas.* 3. 20.), furunculos totum fere corpus obsidentes in conuulso achorum (*l. c. cas.* 2.), faciem intumescencia variarum partium, livore et crustosa aspredine deformem (*l. c. cas.* 5.), guttam rosaceam (*l. c. cas.* 12.), pustulosum exanthema in pedibus praecipue erumpens (*l. c. cas.* 17.), maculas et squamas in cute (*cas.* 19.), in quibus omnibus auxilium Viola exoptatum exhibuit.

Antequam ad alios morbos transeam, adiciendum dictis puto, quosdam adversum de ea iudicium tulisse. Improbat illam cl. MURSINA (*Med. chirurg. Beobacht.* 2. *Samml.* p. 107), qui nec foetorem urinae felinae apud aegros animadvertit. Cl. ACKERMANN (in *Commentar. de reb. in sc. nat. et medic. gestis*, vol. 27. p. 170

p. 170) rursus fatetur, se quidem aliquoties in crusta lactea laudato illam adhibuisse, aliquando tamen frustra, restringit quoque efficaciam in ulceribus aliisque morbis cutaneis. Mirum, quod STRACKIUM (*l. c. p. 40*) stirps in crusta lactea nunquam sefellerit. Rediit aliquando malum, sed iterum cessavit. Negat cl. HENNING (*Beob. über einige Arzneymittel, p. 65*) sibi unquam in affectionibus cutaneis, etiam si diu continuaretur, successisse.

Extendere quoque vis stirpis ad alia mala sese patitur. Loquor primum de arthritide et rheumatismo (HAASE *l. c. cas. 7. 8. 9.*). Fuit foemina, quae una cum scabie ab arthriticis doloribus Viola immunis evasit (*loc. cit. cas. 7.*). Iuvenis, qui ex venere impura varos frontis et gonorrhoeam contraxerat, succo expresso ad uncias duas dato et decocto herbae utrumque malum devicit (*loc. cit. cas. 10.*). Alius ex intempestiva gonorrhoeae suppressione tumore testiculi mulctatus, cataplasmatibus ex herba, lacte et aqua cocta, applicatione externa, iuncta cum potu decocti et laxante convaluit (*Diff. cit. p. 32*). Adiuverunt quoque pilulae ex extracto aquoso et pulvere Violaecurationem ulceris pedis pertinacis (*l. c.*). — Incidit et recentius casus epilepsiae, in infante septem mensium eius ope discussae (*l. c. cas. 15.*).

Qua

Qua forma herba aegris administranda sit, passim haftenus significavi, sed iunctim quae illam spectant complecti opus est, et alii modi subiiciendi. Plerisque placuit decocto lacteo praeunte STRACKIO uti. Quoniam iste autem proportionem inter herbam et lac reticuit: monendum, cl. WENDT pro puero tenello, manipulum herbae ex libris duabus lactis coqui curasse (HAASE *Diff. cas.* 16.), et duplam quantitatem herbae pro eadem aquae usurpatam a matrona, ita ut bis dimidium consumeretur (*Veckoskrift för Läkare*, vol. 2. p. 377). Est, qui linteo inditam in lacte coxit (SCHÄFFER in ARMSTRONG *l. c.*). De pulte et additamento in cibis lacteis iam dixi. Nec destituitur infusum aquosum (*l. c. p.* 153) sua vi, cuius de die mensuram unam foemina in vitio cutaneo ingessit (HAASE, *cas.* 19.). Decoctum cum aqua vel saturatius exhibetur e. c. ex herbae manipulo uno in libris aquae duabus cocto et per diem consumpto (*l. c. cas.* 7.); item ex herbae drachmis sex et aquae libra dimidia; vel magis dilutum pro potu ordinario e. c. ex herbae manipulis duobus in aquae tribus mensurae partibus (*l. c. cas.* 17.), vel ex herbae manipulo uno et aquae mensura una (*cas.* 1.). Potus eiusmodi apte iungitur cum alia efficaciori medicina ex hac Viola parata. Sagor decocti gratior reddi potest seminibus aromaticis ut Foeniculi, Coriandri, additis (*cas.* 2.). Simplicissima forma in pulvere cum saccharo est (SCHÄFFER *l. c.*), tenellis tamen liquidum facilius ingeri potest.

Suc-

Succus addita aqua, qua opus ob mucilaginosam herbae naturam, commodè exprimitur; huius adultis unciae duae datae pro dosi (HAA-SE, *cas.* 10. 11.). Ferri et potest extractum eius gummosum, quod cum pulvere in pilulas redigitur, ad drachmam unam vel duas quotidie per dimidias mane et vesperi datas. Aqua solutum et rite mixtum cochleatim propinatur (*Diff. cit. p.* 31.). Infanti lacte solutum commodè ingeritur (*Veckoskrift, tom.* 4. *p.* 95.). Hisce si tempestive utimur, vix herbae aqua destillata, quae oleo praegnat, vel syrupo florum, vel julepio ex eodem, indigemus (HAA-SE *Diff. cit. §.* 9.).

Praesente primarum viarum colluvie praemittitur usui purgans; deficiente vero ista, sibi a purgante metuit STRACKIUS (*l. c. p.* 47.) in crusta lactea, ne eo criticus per cutem aut lotium exitus interpelletur. Quidam tamen aegri mollem inde alvum experiuntur. Prodest egregie in scabie cum interno usu lotionem decocti iungere (HAASE *Diff. cit. cas.* 3. *et p.* 32); in lichenibus autem vehementiorem excitat pruritum, sanationi adversum. Pulvis ulceri inspersus mitiores dolores creat, si cum aqua in cataplasma reducitur, qua ratione ulcus purius evadit et foetor ex parte evanescit. Curatio aliquando paucis hebdomadibus absolvitur, subinde aliquot menses sibi vindicat. Malum si post aliquod tempus redit, ad priorem medicinam recurrendum est.

Scopo

Scopo tinctorio etiam herba accommodata est, et sub vario additamento color pallide flavescent, brunus, cinereus, coeruleus, palide viridis, inde redundat (V. experimenta cl. HAASE recensita in *Diff. cit.* §. 11.).

201. b.

(Vol. I. p. 506 pone Cinchonam officinalem.)

Pharm. CORTEX PERUVIANUS RUBER.

Praeter speciem Chinchinae, in quam supra (*Appar. med. vol. 1.*) ample commentatus sum, et cui innumeri homines valetudinem suam vitamque debent, plures aliae serius inclaruerunt, quarum notitia fere omnis botanicos adeo ante paucos annos latuerat, sed quae passim pariter beneficae generi humano repertae sunt, et quidem in pluribus eorum morbis, quibus usitatus haecenus cortex Peruvianus medelam attulit. Unde iterum elucet, stirpium cognationem ad notitiam virium non parum adiumenti impertire.

Excellit reliquis existimatione cortex sic dictus Peruvianus ruber, quod nomen ei primi tribuerunt Angli, *Red Peruvian bark*, nec non subinde *Flat bark* illum vocantes.

A

A qua specie Cinchonae ille proveniat, etiamnum latet : ex hoc genere tamen esse, inde coniciunt cll. COMBE et GROSCHE, quod in collectione herbaria LINNEI Equ., quae post mortem filii emptione cl. SMITH M. D. ad Anglos pervenit, figura reperiatur, quae non quadrat in alias cognitae Cinchonae species (Vid. cel. BLUMENBACH *med. Biblioth.* vol. 2. p. 486). Quicquid lacunae in hocce argumentationis genere supersit, non firmiori sane fundamento nititur coniectura, a multis e. c. FABRICIO (*Briefe aus London* p. 230), HEYER (CRELLS *chem. Annal.* 1784 vol. 2. p. 24). imo a cl. SAUNDERS (*Observations on the superior Efficacy of the red Peruvian bark in the Cure of fevers*, ed. 4. p. 5) declarata, corticem rubrum ex truncis et ramis crassioribus eiusdem arboris, quae corticem vulgarem erogat, detrahi, hunc vero ex iunioris arboris vel tenellis ramis, et consequenter non iustam maturitatem assequutum esse et debiliorem virtutem exercere ; additum adeo, corticem rubrum forsitan ex arboribus emortuis deglubi (FABRICIUS). Nam ipse numerosa corticis huius exempla inter sese comparans. rubedinem et firmam texturam et crassitiem maiorem in tenuioribus corticis exemplis aeque ac crassioribus, quae amplioribus ramis vel truncis debentur, reperi. Vix crediderim, tantam diversitatem a statione vel altiori vel profundiori vel solo deduci posse.

Sermo est de cortice, qui longioribus et crassioribus longe frustis transfertur, quam vulgaris, et ponderosior longe est. Concava intrinsecus sunt frusta, dimidium fere plerumque rami exaequant, qui sesquipollice subinde maior, vulgo tamen minor est. Crassities saepe lineas duas superat. Extrinsecus asper et fissuris multis transversalibus distinctus, saepe canescens et lichene flavesciente tectus comparet. Latet sub hacce epidermide et accessorio docto regmine stratum coloris fusco rubri compactum, fragile, et aliud interius rubicundum, magis fibrosum lignosum. In quibusdam corticis veri rubri speciminibus pallidiorem hanc rubedinem inveni quam in aliis; an pallidior evasit hisce casibus soli radianti expositus, salva tamen vi (SKEETE'S *Experim. on the Peruv. bark*, p. 93)? Pulvis huius corticis longe intensiorem rubedinem habet vulgari, amaritiae illi antistat, nec minorem in lingua adstrictionis sensum excitat. Nihil vero odoris prodit. Aliquando tamen rubedinem servat, licet saporis expers, et consequenter efficaciae; unde exploratio per gustum ante usum praecedat. Plura exstant indicia, iam ante decennium, et quod excurrit, proximum, quo in Anglorum manus casu ille pervenit, variis naturae scrutatoribus et practicis innotuisse. Inter tres istos cortices Chinchinae, quorum meminit apud POMETUM (*Hist. generale des Drogues*, 1694. p. 132) peregrinans musicus BERNARD, unius descriptio in corticem rubrum quodammodo quadrat. Cum cuius effatis de eo conspirant

Vol. VI. D ea,

ea, quae Chirurghus ARROT (*Phil. Transact.* vol. 40. p. 83) et DE LA CONDAMINE memoriae prodiderunt (*Conf. Appar. medic.* vol. 1.), et quae in codicibus manu scriptis IOSEPHI DE IUSSIEU notata existunt (*Hist. de la Société de Med. de Paris*, 1779. p. 253), adeo ut cl. BAKER (*Medic. Transact.* vol. 3. p. 161) probabile iudicet, rubrum eundem esse ac eum, quem teste ARROT Hispani *Cascarilla colorada* vocarunt. Cortex, quem LISTERUS (*de Hydrophob.* in *Append. oper.* MORTON, p. 70) tanti fecit, licet coloris non meminerit, in reliquis cum hocce convenit, an vero recte trunco eiusdem arboris adscripserit, nondum quidem constat? Quem cl. GEOFFROY (*Matiere medic.* *Traité*, tom. 2. p. 309) tanquam optimum depraeedicat ad rubrum ptóxime accedit. Sunt et veterani practici nostri temporis, qui meminerunt in iuventute sua rubrum in pharmacopoliis tanquam usitatum obvium fuisse. Horum e numero COTHENIUS (in *Nouveaux Memoires de l'Ac. d. sc. de Berlin* 1783. p. 82) est, qui ante sexaginta annos in Pomeriana venalem fuisse et optimo successu praeceptum narrat. Ita senex quidam Anglus asseveravit, inter prima sua praxeos auspicia rubrum corticem frequenti in usu fuisse (BAKER *l. c.* p. 161. *Conf.* narratio senis medici SMIT, forsitan eiusdem FOTHERGILL apud SAUNDERS p. 157). Quantum equidem sentio, vix firmari idoneis argumentis potest, SYDENHAMI et MORTONI tempore hunc corticem loco exilioris, qui postea usu venit,
inva-

Invaluisse, eique praecipue praestantiorē effici-
 cādam deberi, cuius isti mentionem faciunt,
 quorsum inclinat cl. SAUNDERS *l. c. p. 1*).
 Saltem *tenuem* ex ramulis cinnamomei coloris
 MORTONUS (*Oper. med. Amstel. in 8. tom.*
2. p. 97) tanquam praestantissimum proponit.
 Nec satis convincor Hispanos rubro cortice
 unice uti, alterum peregrinis nationibus vendi
 (COTHENIO sentiente *l. c. p. 83*). Ad ser-
 rentiam JOSEPHI DE JUSSIEU, qui a. 1739.
 Loxae commoratus fuit, ruber primo tempore,
 quo fama Chinchinae inclauit, in usum tractus
 fuit, sed dicto anno, eo teste, tanta iam ar-
 boris ibidem penuria exstitit, ut paucissimi mo-
 do trunci superessent. Ipse vero huic praero-
 gativam tribuit summam et extractum inde pa-
 ravit, quod ultra quadraginta annos adhuc in-
 tēgritatem et potentiam suam servavit (*Mem.*
de l'Ac. d. sc. de Paris vol. 3. p. 255). Qua-
 niam autem data occasione recentius in artis
 exercitium vocatus fuerit, certius novimus.
 Nempe in bello inter Hispanos et Anglos gesto
 navis quaedam Hispanica, Lima in portum
 Gaditanum tendens ab Anglica a. 1779. capta
 fuit et Lisbonam deducta (prout a. 1702. in
 alia nave Hispanica ab Anglis capta accidit;
 apud SAUNDERS *l. c. p. 136*). In hac prae-
 cipuam mercem constituit cortex hūc ruber,
 qui partim in Anglia remansit, partim modico
 pretio exteris venditus. Post aliquam, ut in re
 insolita fieri solet, cunctationem experimenta
 tam in nosocomiis Londinensibus, quam alibi
 in Anglia, dein hinc inde in America septen-

trionali et insulis Indiae occidentalis, item in multis regionibus Europaeis aliis praeter Britanniam suscepta fuerunt, in febribus intermittentibus praecipue, in quibus praestare vulgari creditus. Hinc inde sensim penuria eius subnata, unde et valor nimium crevit, et astutia eundem corrumpendi fraudulentos invasi; donec serius a. 1786. iterum 30. adeo cistae eodem repletæ ex Hispania in Angliam transferrentur (SKEETE *on the Peruvian Bark*, p. 355). Ad augendam eius existimationem multum contulerunt, praeter significatam descriptionem cl. SAUNDERS, in qua propria experimenta cum multis aliorum combinantur, aliae tres, Edinburgi incitamento præmii Harvejani concinnatae: intelligo IRVING'S *Experiments on the red and quill Peruvian Bark*, Edinb. 1785.; SKEETE'S *Experiments and Observations on quilled and red Peruvian Bark*, Lond. 1786.; et KENTISH'S *Exp. and Observ. on a new species of Bark*, Lond. 1784.

Retardavit administrationem huius corticis hinc inde fraus, qua alii cortices nonnihil similes substituti fuerunt. Ita maiora fragmenta vulgaris corticis, reliquis corticis rubri intermixta, exstiterunt (ORLOVII *Progr. de cort. Peruv. rubro*, Regiom. p. 4). Alibi (Berolini) tres vel quatuor corticis species venditæ eodem nomine (PYL in vers *commentar.* cl. COTHENII *Praef.*). Ita cortex rubro simillimus, diu in quibusdam pharmacopoliis instar reiectitii servatus, hac opportunitate venditus fuit

fuit (*l. c.*). Quin exemplum exstat, pigmento quodam rubro vulgarem, quoad internam superficiem oblitum fuisse. Unde colligitur, infidam imprimis esse venditionem corticis huius in pulvere, qui facilius corruptelam admittit.

Quum non tam novas in cortice rubro vires eruere, quam praestantiam eiusdem in morbis haud paucis iisdem, quibus vulgaris alias opponitur, sibi datum practici putarent: comparatio frequens utriusque in experimentis facta est. Sic et in chemicis, ad quae vires intenderunt haud pauci. Gravitate specifica ruber superat alterum (COTHENIUS *l. c. p.* 74). Experimentum vero ad hanc determinandam aliquando variat (SCHOT *Diff. Examen cort. Peruv. rubri, Harderv. 1785. p.* 13 qui chemica potissimum persequitur). Facilius in pulverem subigitur altero. Stratum vero fusco rubrum facilius pulverulentam formam sub pistillo acquirit, altero fibroso; et istius infusum aquosum profundius tingitur affusa solutione vitrioli martis, quam huius (IRVING *l. c. p.* 28). Unde e re est pulverem, tempore constitutionis priorem, posteriori praeferre. Maiorem longe quantitatem solubilium partium ruber cortex altero vulgari tam spiritui vini quam aquae impertit (SAUNDERS *l. c. p.* 93). Et utrumque menstruum saturatiorem colorem ex rubro contrahit, quam ex altero; aquosum manifeste amarius est. Plus quoque longe resinae ruber continet quam alter; nimirum ex exploratione cl. HAGEN (in ORLOVII *Progr.*

l. c. p. 7) resinosi extracti $\frac{1}{4}$, gummosi $\frac{1}{8}$, vel teste cl. ALKIN (apud SAUNDERS *l. c. p. 174*) extractum resinosum rubri corticis sese habet ad extractum idem alterius, ut 3 ad 2 (Conf. etiam de extractis variis utriusque experimenta cl. COTHENII item cl. SCHOT in *Diff. cit.* quae inter se variant). Nec decoctum corticis rubri eandem decompositionem patitur, et expositum aëri libero hunc diutius fect longe absque acore, quam decoctum corticis vulgaris, in quo ipso enascitur intra paucos dies (FOTHERGILL apud SAUNDERS *p. 114*). Ex iudicio sensuum adeo infusum frigidum corticis rubri superat vi decoctum optimi corticis alius (SAUNDERS). CrySTALLI, ex extracto ad modum Garayei parato redundantes, albidiores sunt iis alterius corticis, et saporem valde amarum habent, Quassiae aemulum (HERMSTADT in CRELLS *chem Anal. 1785. vol. 1. p. 117*). Aqua eiusdem destillata albido colore tingitur, et manifestius globuli aetherei olei in eiusdem superficie conspiciuntur, quam in aqua destillata corticis vulgaris (IRVING *l. c. p. 33 not.*). Pluribus experimentis chemicis inhaerere hoc loco, minus opus esse videtur; relegandi potissimum, qui ea desiderant ad scripta citata, quorum titulus indicat, dedita opera auctores in corticem rubrum inquisivisse. Praetereo studio experimenta, validioris ignis impetu instituta (de quibus vid. COTHENIUS, SCHOT *ll. cc.*).

Ad.

Admixtus partibus animalibus, hasce longe diutius contra putredinem tueri, quam alter deprehenditur (SKEETE in SAUNDERS'S *Observ.* p. 26 et in EUSD. proprio libro cit. p. 106 sq. item IRVING l. c. p. 117 sq.).

Maximi vero ponderis est nosse, quid in ipso corpore humano efficiat. Pleraque huius generis experimenta ad febrem intermittentem spectant. Et sane si vel in hac unice vulgari cortici praeferendus sit, praeconio valde honorifico ornandus est. Ita esse haud pauca observata suadent. Etenim a pluribus animadversum, in minori dosi sufficere. Vereor, ne nimis subtiliter ex ingenio suo CAMPERUS drachmas rubri sex potentia aequiparaverit unciae uni alterius praxin suam in Frisia citans, ubi febris haec endemia est (SIMMONS apud SAUNDERS l. c.). Aliis dimidia dosis satisfecit (SAUNDERS l. c. p. 56 180 BRABANT, qui auct. vers. Latinae libri EJUS l. c. p. 179). Celerius quoque febrem sufflaminat, ita ut aliquando alterum subsequens paroxysmum iam avertat (SAUNDERS l. c. p. 57 RIGBY apud EUND. p. 122). Nec parvi censendum, quod corpus contra recidivas egregie muniat, ita ut redeunte vigore pristino non opus sit repetitionibus crebris, ut aliter moris est, aegrum sollicitare (SHERWIN apud EUND. p. 112 MADDOCKS *ibid* p. 141). Sufficit etiam in pertinacioribus febribus, ut quartanis diuturnis, et quibus complicationes variae molestae accesserunt, e. c. tussis, dyspnoea, rauca;

do (SAUNDERS *p.* 58 COLINGWOOD in *medic. comment. vol. 10. p.* 274), vel icterus (SIMMONS apud SAUNDERS *l. c. p.* 167). Et efficaciam praestat, quando spe auxilii ex altero excidimus (SAUNDERS *l. c. p.* 58 MADDOCKS *ibid. p.* 141 SHIRREFF *ibid. p.* 151). Novissimum eius documentum in virgine habui, quae quotidiana vehementi per duas cum dimidia hebdomades afflicta et rite a me tractata, frustra usa fuerat per plures apyrexias cortice vulgari, sed paucis pulveribus scrupuli unius corticis rubri hunc statim effectum sensit, quod paroxysmus, qui olim status fuit, quatuor horas serius rediret et longe mitius, demum continuato usu sileret omnino nec rediret, etiamsi celer virium reditus pertaesam eam repetitionis redderet. Alii quoque in praxi mea velocis et constantis effectus casus mihi obviam venere. Fuit qui uncias sex corticis tenuis frustra ingesserat, sed uncia una et dimidia rubri erat sanatus (COLINGWOOD *l. c. p.* 273). Equidem pulvere maxime delector, alii quoque, ad scrupulum unum, drachmam dimidiam (SHIRREFF apud SAUNDERS *p.* 152 *sq.*), scrupulos duos (FARRE *l. c.* apud SKEETE *p.* 118). Nec nocuerunt maiores doses drachmae unius vel scrupulorum quatuor, quavis secunda vel tertia hora (FARRE *l. c. p.* 116). Omnes tamen tam insignem dosin non ferre, inde cognoscitur, quod vir alias robustus ex drachma una animo linqueretur, nec aegritudine sua nisi emetico dato liberaretur. Aliis placet infusum frigidum
(SAUN-

(SAUNDERS *p.* 59), vel pulvis una cum saturato decocto et tinctura eius addita (JACOB apud EUND. *p.* 87), quibus ambagibus arbitror non opus est; alius acquievit electuario addito oleo Menihæ Piperitæ et seminum Carui (BISHOP *ibid.* *p.* 931); aliis e re visum extracto resinoso uti (JACOB *l. c.* *p.* 89 BRABANT *l. c.* *p.* 179). Tincturæ quidam plurimum tribuerunt (FARRE apud SKEETE *p.* 118).

Licet et ipse magni hunc corticem faciam, nolim tamen tantopere deprimi vulgarem istum tenuem, ut multi praeconum rubri faciunt. Innumeros aegros a febre intermittente aliisque multis morbis eius ope sanatos, quis negare audebit; multos non sanari, in vitio medici iusto timidioris vel aegri iusto negligentioris causam saepe habet. Nec assentiri possum inde praestantiam habere rubrum, quod ex trunco vel ramis petitus sit, prout cerdones praeferunt scopo coriario corticem crassum tenuiori, quod argumentum LISTERI nimis crebro repetitum a recentioribus practicis. Nam dubium supra proposui, an uterque cortex ex eadem arbore sit; et quodsi esset, quo iure aliquis in adstrictionis vi, quae omnino in crassiori cortice eminet, totam dignitatem corticis Peruviani quaerit? Ab hacce si unice virtus febrifuga Chinchinae dependeret locum cedere deberet cortici Quercus, Gallis, radicibus Tormentillae, Bistortae etc., quae suffocant quidem febrem, non curant.

Com.

Commemoranda quoque adversa quaedam huic cortici in febribus intermittentibus effata. Edinburgenses plures medici sunt, quibus vel nullam praerogativam mereri prae vulgari visus, vel qui illum virtute cassum reppererunt; displicet quoque variis Belgicis medicis (KENTISH *l. c. p. 46*). Ita medicus Gothoburgensis DUBB. praerogativam negat (*Veckoskrift för Läkare, vol. 5. - p. 162*). Dolet et cl. VOGLER (*Pharm. sel. 1788. p. 27*) expectatio- ni suae non respondisse rubrum. Sed quid mi- rum si non omnibus auxilio fuerit; quale spe- cificum tam infallibile est, quin aliam subinde medendi normam admitteret. Aliquando, etiamsi modica dosi, stomachum gravavit, nauseamque et vomitum excitavit; unde ab administratione eius recessit cl. BAKER (*Med. Trans. vol. 3. p. 162*).

Ast et in aliis morbis, etsi paucioribus exemplis, vires eius tentatae sunt. Ex hoc numero rheumatismus acutus fuit, praecipue tertianam duplicem mentiens, in quo tutissimum illo uti in connubio antiphlogisticae medelae post septimum diem a febris rheumaticae initio (SAUNDERS *l. c. p. 75 sq.*). Ita in perio- dicis doloribus praesertim capitis conducit, quando tonicis locus est (MADDOCKS *l. c. p. 143 sq.*); prout etiam rheumatismo periodico medelam praebet (COLINGWOOD *l. c. p. 274*). Febres lentas nervosas celerius tollit, quam alter cortex, etiamsi nulla crisis perci- piatur (ID. *l. c.*). In febre putrida, summa
vi-

virium prostratione et delirio stipata, eximium suum præstat (FOTHERGILL *l. c. p. 118*). Sphacelo, qui febrem malignam excepit, in connubio anodynorum et vini limitem posuit (BISHOP *l. c. p. 93* Conf. liber cl. SKEETE *p. 118*).

201. c.

Pharm. CHINCHINAE CARIBAEAE
s. JAMAICENSIS *Cortex.*

Cinchona Caribaea; pedunculis unifloris LINN. *Sp. pl. p. 245. Syst. veget. ed. 14. p. 214.* JACQU. *Observ. bot. P. 2. p. 27 tab. 47. Amer. pict. p. 35 tab. 63.* Conf. cl. WRIGHT descriptio in *Philos. Trans. vol. 67. a. 1777. p. 504. sq. et icon tab. 10.* Arbor in insulis Caribaeis spontanea, nominatim in Jamaica, latere septentrionali solo lapidoso prope litus marinum.

Altitudinem pedum viginti (WRIGHT *l. c.*) ad quadraginta (ID. in *Med. comment. vol. 5. p. 398*) attingit, trunco quoad proportionem modice crasso, sed duro, tenaci et coloris intrinsecus flavido albi. Corticis numerosis speciminibus, quae mihi misit cl. WRIGHT, edoceor, eundem variare insigniter pro parte, ex qua deglubitur. Ex trunco separatus frag-
menta


menta convexo plana, spithamam circiter longa, sesquilineam subinde crassa, repraesentat, in quibus duo strata facile distinguas, aliud externum crassius, ad lineam fere usque ex epidermide enatum, multis profundisque fissuris scabrum, flavidum, spongiosum, facile inter digitos conterendum, insipidum; aliud firmum, fibrosum, profundius, vel ex viridescenti brunum, ex dulci nauseose et intense amarum. Specimina ex ramis separata convexa vel convoluta existunt, epidermide tenui grisea rugosa obducta, cui adhaerent subinde manifestius lichenes leprosi, nec demta hacce aliud quam brunum stratum cernitur. In ramulorum cortice omnia teneriora et pallidiora sunt. Cortex, qui praesto est radicis, fragmenta plana refert, exuta epidermide. Saporem raphanaceum et aromaticum, quem cl. WRIGHT significat, sub primo gustatu immixtum nullibi sentio, nec manifestam adstrictionem. In meis exemplis omnibus et singulis, quin et festucis interna superficies crystallulos scintillantes emisit. Arbitror stratum externum tanquam iners reiciendum esse. In pulverem redactus refert hicce corticem Peruvianum vulgarem. Aquam tam frigidam quam calidam imbuit suis virtutibus. Uncia eius dimidia, cum aquae fontanae libris duabus ad unam cocta, saturatum decoctum praebet, et coloris profundioris, quam ex triplo corticis vulgaris, coloris brunni, sed non turbidi (WRIGHT). Debilior longe adstringendi vis illi inesse videtur, vel ex iudicio experimenti cum martiali admixto

(SKEE,

(SKEETE'S *Exper. and Obs. of the Peruvian bark*, p. 339).

In febribus remittentibus, qualibus accuratius non determinat cl. WRIGHT, iste saepe in Jamaica corticem hunc tentavit optimo eventu, praemisso sursum vel deorsum evacuante. Ventriculum roborare, nauseam et vomitum compescere, morbosam primarum viarum colluviam corrigere sicque morbum vincere observavit. In universum merito pro efficaci tonico et antiseptico declaratur.

Haecenus desunt per partes enucleatae de eius vi historiae; nec tantum famae excitavit, ut per commercia officinas nostras intraret.



201. d.

Pharm. CHINCHINAE SANCTAE
LUCIAE Cortex.

Cinchona floribunda; floribus paniculatis glabris, capsulis turbinatis laevibus, foliis ellipticis acuminatis glabris SWARTZ *Prodr. veget. Ind. occid.* p. 41 (Citat *Act. nat. curios.* 1787. qui ipse annus nondum prodiit). *Cinchona floribus paniculatis glabris, laciniis linearibus tubo longioribus, staminibus exsertis, foliis ellipticis glabris* BANKS in DAVIDSON'S *Account* in *Phil. Transf.* vol. 74. p. 453 cum fig. tab. 19. (floribus clausis) item DAVIDSON in *Transf. of the Amer. phil. Society*, vol. 2. p. 292. *Cinchona montana*; foliis ovatis utrinque glabris, stipulis basi connato. vaginantibus, corymbo terminali, corollis glabris DE BADIER in ROZIER *Observat. sur la Physique*, tom. 34. p. 129 tab. 1. (floribus apertis et praestantior quam supra citata icon). Quinquina-Piton ou des Montagnes, Quinquina indigene de la Guadeloupe et de la Martinique Gallis (DE BADIER). Nomen Piton significat loco natali summitatem montium (MALLET). Arbor in insula St. Lucia, Martinicia, Hispaniola, Guadelupa, crescens.

Male

Male a quibusdam, ut cl. DAVIDSON (*Amer. Transf. l. c. p. 292*), item cl. KENTISH (*Exper. and Obs. on the Peruvian Bark, p. 51*), Cinchona haec et Caribaea pro iisdem declarantur, quum corticum vires aequae ac arbores ipsae differant. Nec ad Caribaeum corticem, sed ad illum St. Luciae pertinent experimenta a cl. KENTISH (inde a p. 51 . narrata .

Arbor aemulatur in insula Lucia staturam Cerasi, delectatur umbra, hinc sub altioribus arboribus sese abdit, et plerumque in medio monte prope rivos situ ex septentrione occidentali insulae reperitur. Occupat vulgo argillam tenacem rubrum. Lignum leve et spongiosum est caretque amaritie corticis, sed haecce inest foliis, et flores, semina etc. apparent hisce magis amara et adstringentia (DAVIDSON ll. cc.). Arbores vetustiores tamen crassiorem truncum gerunt, quam qui a viro brachiis comprehendi possit (DE BADIER). In Guadelupa et Martinica haud procul a summitate montium crescit.

Circa annum 1780. detecta arbor ab ANDERSONIO in insula S. Lucia, ubi paullo post cum cortice in nosocomio generali experimenta capta (DAVIDSON). Ast in Galliam cortex iam anno 1777. ex Martinica a cl. DE BADIER parva quantitate translatus fuit. Novas dein suppetias ibidem procuravit praefectus Martinicae DE TACHER. Sensim quoque in
An.

Angliam et parcius in Scotiam pervenit. Paucioribus tamen modo historiis in Europa de effectu constitit, in insulis Americanis crebrior eius usus fieri videtur.

Sub epidermide grisea, hinc inde maculis albis, forsitan ex lichenis initio, difformibus latis vestita, parenchyma latet pallide brunum fibrosum, nonnihil tenax. Specimina, quae coram sunt ex vario fonte, convolutam formam habent, dodrantalis imo pedalis longitudinis, diametri digiti maioris, crassitie dimidiae lineae vel tenuioris.

Sapor eius primum adstringens, sed superatur hicce mox insigni amaritie, Gentianae saporem aemulante et nauseosa; odore caret, nec spirat exhalando liquida eo impraegnata ullum. Omne fere solubile aqua extrahi potest, et sola frigida infusio iam illi colorem valde rubrum et amaritiam cum adstringendi sensu ipsius corticis impertit. Idem color et sapor ex infusione aquae calcis. Quartam extracti aquosi nigri amarissimi partem largitur (MALLET in *Mem. sur le Quinquina de la Marlinique connu sous le nom de Quinquina-Pizon*, 4. p. 8): quin alius $\frac{2}{3}$ coctione eruit (WILSON in *Phil. Trans.* vol. 74. p. 453). Spiritus vini, cortice digestionem impraegnatus, post biduum turbatur ex gummosa materie, sed aqua commisceri potest absque pelluciditatis iactura (ID. p. 9). Tinctura spirituosam pariter grate rubra est, et extractum praebet,
ama.

amaritiae Aloï non cedens, quarta parte corticis gravius. Quaecunque menstruum ex dictis sit, color enascitur addito martiali aliquo praeparato intense niger (DAVIDSON). Amplior experimentorum horum aliorumque similium recensensus aliunde petendus (Ex MALLETT *l. c.* KENTISH *l. c. p.* 58 DOLLFUSS in CRELLS *chem. Annal.* 1787. *vol.* 2. *p.* 147), ubi et in comparatione chemica corticis vulgaris cum isto St. Luciae res versatur.

De viribus autem eius in corpus humanum nonnisi immediata eius administratione certe iudicari potest. Sane vel hae innotuerunt, quae ne coniectura quidem comprehendi poterant. Etenim, siue oscitantius siccetur siue maiori sollertia, facile vomitoria et alvi deiectiones excitat (DAVIDSON in *Amer. Transf. l. c. p.* 291). Si in pulvere exhibetur, ventriculus non ultra grana viginti fert; hinc nunquam ultra viginti grana data (ID. in *Phil. Transf. cit. p.* 454). Quin grana octo aliquando eundem effectum excitarunt (MALLETT *l. c. p.* 13). Sed eadem et decocti et boli cum syrupo Althaeae parati evacuandi potestas (MALLETT *p.* 12). Unde repugnat facile in usu pergere.

Praecipua eius laus in febre intermittente fuit; in qua ipsa evacuandi eius potestas permittit, ut iam secundo paroxysmo eoque nondum expirante praebaeretur (DAVIDSON in *Amer. Transf. l. c.*). Plurimum casuum successum

Vol. VI. E sum


sum breviter exponit cl. MALLIET, unde consequitur etiam in protractiori febre valuisse et sub tam vim exseruisse, modo iustam continuationem non recusarent. Tutissimum est, parvis dosibus granorum quinque octo, decem, acquiescere sub iustis intervallis, et Canellam albam vel aliud aroma ad ventriculum placandum addere (KENTISH, p. 79). Quin in quartanis contra vulgarem corticem, item rubrum obstinatis, valuit ter de die ad octo grana cum Canellae albae quinque granis datus (*l. c. sq.*). Sic et immorigerae tertianae eius ope sublatae (*l. c.*). In nosocomio Guyano Londini quum tentaretur ad drachmam dimidiam, nausea quibusdam aegris molesta fuit, nec velocitate effectus sese commendavit; hinc omissus eius ulterior usus (SKEETE *on the Peruvian Bark*, p. 352).

Praeter pulverem aliis commodius visum, infusum frigida aqua, vel aqua calcis, paratum exhibere, ea proportionem, ut corticis uncia una pro aquae pintis tribus sumerentur (DAVIDSON in *Phil. Trans. cit. p. 454. Amer. Trans. l. c. p. 291*). Sufficit infundere corticis drachmae uni, vel in quibusdam casibus dimidia, per duodecim horas pintam unam aquae (KENTISH *l. c. p. 79*). Elegans tinctura spiritu vini cum Canella alba enascitur, sed longe intensiorem sporem habet illa, quae ex feminibus fit (DAVIDSON *l. c.*). Extractum aquosum vel spirituosum a ventriculo melius fertur, et videtur extractum utroque
men.

menstruo paratum continere omnem corticis efficaciam (ID. in *Amer. Transf. cit. p. 291*). Decoctum (MALLET, p. 12) sine dubio reliquis omnibus praeparatis ingratius capitur.

In dysenteria putrida et dysenteria febre intermittente copulata egregiam virtutem praestat, cuius non minima pars haec est, quod evacuet (DAVIDSON in *Amer. Transf. l. c. p. 293*).

Efficaciae quoque exemplum in dispepsia (KENTISH, p. 80), aliud in dyspnoea (l. c. p. 88) exitat. Sed pauciora iusto haecenus experimenta suppetunt, quam ut hic cortex diu usitato palmam praeiperet.



201. c.

Pharm. CHINCHINA DE SANTA FE'.

Sub hoc nomine exstant corticis duae species, quae a cl. ORTEGA Madrito ad Baronetum JOSEPHUM BANKS missae fuere, item in collectione rerum naturalium LINNEI, filii, post mortem deprehensae.

Ab hoc una (A) vocata *Cinchona Peruviana*, adscriptumque fuit specimini, illud a. 1780. a LOVIS NÉE Loyae in Peruviano regno repertum. Huius cortex magis flavus apparet, quam alter. Refert sapore vulgarem corticem Peruvianum, non vero aequè efficax visus; subinde mixtus cum eodem in iisdem cistis, quibus transmittitur, obtinet (GROSCHKE in BLUMENBACH *Bibl.* vol. 2. p. 490). In meis speciminibus, quae subplana sunt, fragmentis palmam longis lineam dimidiam crassis, sub cuticula alba verrucosa compagem fibrosam ex flavo brunam modice tenacem conspicio, saporem sentio longe minus amarum, quam in reliquis omnibus *Cinchonae* corticibus. Ex dictis constat Peruvianum regnum patriam agnoscere.

Alter

Altera species (B) a LINNEO, filio, *Cinchona Bogerensis* (non Bogerensis) dicta. Plantae eius siccae adscriptum fuit nomen cl. MUTIS et LOVIS NEE 1780, et patria St. FÉ in Carthagera. Colorem eius obscuriorem esse notat cl. GROSCHKE, quod et in meo specimine ita sese habet, tam quoad epidermidem, quam subiectum corticem, cuius superficies superior rubicunda, sapor non valde amarus, sed tanto acerbior. In mappis geographicis intra Terram firmam notatur quaedam Santa Fè de Bogeta, quae sine dubio ad indicia dicta pro eius loco natali habenda, est.

Sunt hae sine dubio eadem species corticum, quae iussu Regis Hispaniae tam ad societatem medicam R. Parisiensem (*Hist. de la Soc. R. de Med.* 1779. p. 257 sq), quam ad societatem R. Londinensem (BAKER in *Med. Transf.* vol. 3. p. 115) explorationis causa per cl. ORTEGA, Prof. Bot. Madritensem, una cum stirpis siccis missae fuerunt. Ex Cinchonae genere esse agnoverunt Parisienses botanici. Cl. BUCQUET (*Hist. de la Soc. de Med. l. c.* p. 259) extractum ex utroque paraverat, cuius proportionem et naturam data opera hic omitto. Uterque cortex circa a. 1779. magna copia admixtus vulgari cortici Londini repertus est, et insuper simul haud parum spurii cuiusdam corticis. Ex iudicio saporis et externi habitus postponit istos ex Santa Fè multum vulgari cl. BAKER, cui de sapore effato quoque subscribo.

Quantum scio , in Europa serio neuter
hactenus praescriptus aegris fuit, sed mansit in
cinchalis collectum suppellectilis medicae .
Tractum vero peculiarem de eo conscriptum:
*Memoria o Dissertazione sopra la nuova China
del regno de St. Fè, nell' America meridionale
cioè Alcune Rifflessioni sopra la Medesima fatte
dal Dottore ASTI ed a lui scritte in due Let-
tere 1784. 1785. al chiar. Borsieri. In Mantua
1786. 4. quoad titulum modo novi .*

Designantur insuper aliae species Cincho-
nae in St. Fè oriundae, a botanicis hucusque
non satis determinatae, sed in collectione ill.
BANKS obviae, scil. Cinchona corymbosa a
cl. ORTEGA missa, Cinchona pubescens ab
eodem (GROSCHKE l. c.), quantum vero
cortices usu medico non inclaruerunt. Patet ex
omnibus nomine St. Fè adscripto locum nata-
lem non satis indicari, quum plurium provin-
ciarum australis Americae loca extent hocce
nomine insignita .



201. f.

Pharm. CHINCHINAE ANGUSTI-
FOLIAE Cortex.

Cinchona angustifolia; foliis lanceolatis pubescentibus, floribus paniculatis SWARTZ in *N. Vet. Ac. Handl.* 1787. p. 119 c. ic. tab. 3. *Cinchona angustifolia*; floribus paniculatis glabris, capsulis oblongis pentagonis, foliis linearilanceolatis pubescentibus ID. in *Prodr. veget. Ind. oecid.* p. 42. Arbuscula, habitans ad ripas fluviorum insulae Domingo.

Ibidem eam invenit cl. SWARTZ, qui unicus eiusdem et virtutis corticis hactenus meminit. Cortex inferioris trunci partis crassus, scaber, rimosus est, griseus praeterea vel obscuri coloris, interna superficie viscosus; superioris autem partis et ramorum minus viscosus. Sapor intense amarus et praeterea nonnihil dulcis cum levi aromate. In comparatione cum vulgari cortice Peruviano apparet, infusum tam aquosum calidum quam spirituosum profundiores colorem ex eadem quantitate adsciscere et hunc corticem breviori tempore decoctione cum aqua erogare partes suas solubiles (SWARTZ in *Vet. Handl. l. c. p.* 121 sq.). Vitriolo martis mixtum nigrorem pro-

fundum contrahit. Aemulari vires vulgaris medicas paucula SWAKTZII experimenta suadent.

Nolo heic peculiari articulo augere numerum corticum huius generis cortice *Cinchonae corymbiferae* FORSTERI (*Nov. Act. scient. Upsal. vol. 3. p. 176* LINN. *Suppl. plant. p. 144. Syst. veg. ed. 14. p. 214*) intra tropicos in insulis Tongatabu et Eaowe maris pacifici habitantis, quoniam modo formam et saporem eius novimus, qui amarissimus, subadstringens, simillimus cortici Peruviano describitur. Equidem mea specimina, quae cl. ABILDGAARD, Professori Hafnienfi, debeo, omnibus numeris congruere specimini sub litt. (B) corticis de St. Fè reperio. Convolutam formam habent. Id modo addo, cautum esse debere medicum in eligenda prae aegris una vel altera horum novorum corticum specie, ne fallatur nomine. Nam pharmacopolae servant sub eodem saepe diversissimos forma, et consequenter etiam virtute, cortices, ut pluries comperi. Dono mihi quoque misit cl. WRIGHT cortices *Cinchonae albae* s. *Cascarillae Hispanorum*, *Cinchonae brachyurae*, *Cinchonae triflorae*, qui omnes sap. re amaro vel et simul aromatico insignes vires spondent, sed omittendi hic sunt, quum de experimentis ex instituto cum iisdem factis mihi nihil innotuerit.

De cortice *Angusturae*, cortice *Chinchinae* regio s. *Chinchinae flavo*, item cortice *Chinchinae*
Su-

Surinamensis infra intra vegetabilia ignoti generis agetur.

R H O D O D E N D R O N.

LINN. *Syst. veg.* p. 337. *Gen. pl.* p. 218.

214. b.

(Vol. 2. p. 64. pone *Vaccinium Myrtillum*)

Pharm. RHODODENDRI *Herba.*

Rhododendron Chrysanthum; foliis oblongis imbricatis supra scabris venosissimis, corolla rotata irregulari, gemma florifera ferrugineo-tomentosa LINN. *Suppl. pl.* p. 217 *Syst. veg. ed.* 14. p. 405. *Rhododendron Chrysanthum*; foliis ovatis scabris, margine reflexis, subtus glabris, umbellis terminalibus, corollis flavis irregularibus PALLAS *Flor. Ross. tom.* 1. P. 1. p. 44. *tab.* 30. *Reise durchs Russ. Reich, vol.* 3. p. 369. *tab. n. fig.* 1. 2. KÖLPIN *prakt. Bemerkungen üb. d. Gebrauch d. Sibir. Schneerose* 1779. cum ic. ex PALL. *Inuer. cit.* *Andromeda* foliis ovatis, utrinque venosis, corollis campanulatis obliquis longissimis GMEL. *Flor. Sibir. vol.* 4. p. 121. *tab.* 54. absque flore. Fru. ex cretens in summis montibus nivalibus iugi Saia.

Saianensis ad Jeniseam fluvium, in elatioribus alpium inter Sibiriam et Dauriam, in alpestribus elatioribus circa lacum Baicalem; per omnem frigidam Sibiriam orientalem etiam in humilioribus montibus in Camtschatca et insula Beringia tam in summis rupestribus, quam locis depressis muscosis ad radices montium et stagna. In alpinis pedali minor, in depressioribus sesquipedalis.

Serlioribus modo annis hac stirpe aucta fuit suppellex medica, eiusque prima in sanatione morborum laus ex patria eius originem traxit. Inde quoque petere opus fuit herbae quantitatem, medicis cultiorum et a Russia remotiorum regionum necessariam; quod una cum valore cariori, quo venit, in causa videtur esse, quod pauciora experimenta cum eodem facta et per partes enucleata innotuerint. Sensim cecidit Petropoli valor a novem Rublonibus (KÖLPIN in GRUNER *Almanach für Aerzte u. Nichtärzte* 1783. p. 171.) ad unum pro libra (PALL. *Fl. Ross.* p. 45.). In Helvetia quidam Rhododendron ferrugineum L. illi substituere coeperunt (*N. nord. Beytr.* vol. 4. p. 404.).

Quodsi vero summam efficaciam exercere debeat, sedula ratio tam soli, quo crescat, quam temporis collectionis, habenda est, quibus momentis haud parum a gentibus, inter quas indigena est, peccatur. Ad Baicalem enim decerpta folia eminent sola vi narcotica, ad
Lenam

Lenam autem potius cathartica; ita in Cameschatea debiliora, et in insula Beringii decoctum fruticis nec inebriat, nec alvum movet, sed sensu suffocationis, licet post aliquot horas evanido, torquentur (STELLER in GMEL. *Fl. Sib. l. c. p. 124.*). Praestat efficacia stirps alpina isti in depressioribus locis crescenti. Male quoque herba nonnisi capsulis maturationi proximis vel serius a Cosaccis colligitur, quo tempore flavescere iam incipiunt folia nonnulla, minori amaritie instruuntur, quam dum floret (PALL. *Reise l. c. p. 370. Fl. Ross. p. 46.*). Merito itaque vel ante anthesin vel per eandem collectio fieri deberet.

Non potuerunt exteros ad usum medicum excitare, quae peregrinatores quidam antiquiores per Russiam proficiscentes suis schedis notarant, quum sero tantum ex tenebris suis protractae fuerint. Intelligo cl. JO. GE. GMELIN *Florae Sibiriae tomum quartum* (qui modo a. 1769. prodit, editore SAM. GOTTL. GMELIN), STELLERI et MESSERSCHMIDII pugillares. Verum postquam ill. PALLAS in peregrinatione sua per Russicas ditiones vires stirpis curatius investigasset et prolixius de iisdem postea exposuisset (*Beschäftig. d. Berl. Gesellsch. naturforsch. Freunde. vol. 1. 1775. p. 421. interprete cl. KÖLPIN. Neue nord Beytr. vol. 3. p. 399. vol. 4 p. 404. praeter Itinerarium et Fl. Ross. ll. cc.*), celebrari hinc inde coepit. In Germania inclruit praecipue KÖLPIN eleganter de eo conscripto libello, pluribus

bus casibus practicis ornato. — Postea praeter *Pharmacopoeam Rossicam*, p. 43. *Ph. Edinb. novissima* p. 50. eam recepit.

Ex Russia transmittuntur in pharmaceuticum usum non folia solum, sed et ramuli circiter palmares, quibus insident cum gemmis convolutis et serie squamarum gemmacearum, ramulos undique cingentium, et saepe una pedunculi residui terminales cum receptaculo florum, prout ex sarcina a generos. L. B. AB ASCH mihi missa cognosco. Deprehendo in hac quoque multa folia decoloria maculata, et folia quidem omnia versus ramulos replicata; unde vinculum fasciculos in formam rotundato oblongam coarctat. Stipites, ut cum pharmacopolis loquor, utpote inertes fere creditos relicere suatum (*PALLAS Fl. Ross. p. 45.*), sapor tamen tenellorum ramulorum licet differat ab isto foliorum, non tamen inertiam indicat. Nempe folia sicca austera sunt cum notabili amaritie; ramuli mihi parcius amari. sed magis austeri apparent una cum sensu acrimoniae manifesto; hunc et cognovi in cortice ramulorum lignosorum, dum in tenerioribus tota compages acri penetrari videretur. Odor in sicca stirpe ad rhabarbarinum nonnihil inclinat. Decoctum bruno rubicundum est et odorem spirat nauseosum; saporem vero exhibet ex austero, amaro et acri, compositum. Infusum concentratum ad Theam Boheam proxime accedit (*KÖLPIN l. c. p. 24.*). Adstringens
na-

natura sese etiam declarat nigredine infusi ex martialibus (HOME'S *clinical experiments* p. 145.).

Multa sese signa efferunt, quod in nervos eorumque fontem insignem efficaciam exserat, narcoticorum in morem. Non brutorum naturam contra hanc omnino obduruisse exemplum capreoli mansueti testatur, qui foliis denis devoratis post aliquot minuta pr. temporis tripudiare, caput allidere, titubare coepit, dein in genua procidit; relictus tandem somno per quatuor horas durante, ita tamen ut postea stirpem oblatam omnino repudiaret (STELLER in PALLAS *Fl. Ross.* p. 45.). Sed prout animantium indoles multipliciter discrepat: ita pabulum innocuum constituit cervorum et moschorum, et in horum quidem occisorum ventriculo reliquiae stirpis repertae sunt (PALLAS *Reise l. c. p. 370.*). Non culpa eam liberat, quod dilutum eius virus homines non afficiat, praecipue si vis consuetudinis sese immisceat, prout Tataris sylviculis ad Sajanense iugum degentibus instar Theae quotidiano usu et, ut putant, salutari venit (*l. c. p. 369. Fl. Ross. l. c. 45.*). Idem vero infusum, si saturatius sit, paullo inebriat, ut sint, qui grati inebriaminis instar istam usurparunt (STELLER *l. c.*). Et decoctum ex ramulis et foliis clauso probe vase paratum, quod saturum amarum et brunum est, calorem febrilem, inebriationem imo mentis absentiam generat, sub qua in artubus vel interioribus partibus, dolore correptis,

for.

formicationis sensus continuus enascitur, evanido postea dolore et reconciliata omnino pristina mentis serenitate (PALLAS *Reise l. c.*). Calor, qui sub usu subinde redundat, sitim ciet saepe intensam, quam si gelida pota restinguere tentant, emesis subsequitur vehemens et salutaris (PALLAS *l. c.*). Deducto foliorum duo vel tres dies potato venatores et glaciei mariae fossiores ad Lenam habitantes, dum primis diebus laborum defatigantur et perpetuo montium ascensu genuum dolorem contrahunt tam lassitudini quam dolori medentur, sed nonnisi praevio somno et inebriatione (GME-LIN *l. c. p. 123.*).

Haecce phaenomena alios invitarunt ad stirpem in doloribus rheumaticis et arthriticis applicandam, sub qua administratione accesserunt haud pauca alia, quae narcoticam naturam confirmant. Restrungenda autem eius laus est ad chronica mala vel saltem nonnisi defaeviente febre ea propinanda; nam licet in nonnullis arteria 14, 24, 30, 38 ictibus lentius et debilius post captam illam micet (HOME *cas. l. c. Conf. cas. cl. KÖLPIN*), item intermittat (KÖLPIN *cas. 1.*): alius calor fibrilis sentitur (Vid. supra et KÖLPIN *cas. 13. et 14.*); nec levamen ullum doloris in morbis huius naturae acutis subsequutum, rem dirigente cl. HOME, etiamsi venaesectio et medicina antiphlogistica non negligeretur, et Rhododendron tanta dosi caperetur, ut vertigo accederet. Absente febre autem quantum valeat,

casibus

casibus quindecim a cl. KÖLPIN, quatuor a cl. GRUNER (*Almanach cit. p. 172. sq.*) et duobus a cl. STARCK (in ZAHN *Diss de Rhododendro Chrysantho, Len. p. 18. sq.*) uberius descriptis, edocemur. Symptomata capta illa emergentia non apud omnes hosce aegros eadem sunt. Id tamen evincitur, nauseam vomitionem materiae viscidae brunae amarae et alvum solutam non rarum esse, caput obnubilari facile, quibusdam ardorem et constrictionem faucium molestam esse, alios sentire oppressionem pectoris, pruritum oculorum, nasi vel cutis, vel pati sensum ustionis, formicationem, vel punctionem quasi ab acubus, vel stuporem partis, quibusdam lacrymari oculos, exanthemata erumpere. Praeter dictas evacuationes in aliis sudoris copiosior eiusdemque foetidi eruptio adjuvat medelam. Quibusdam quoque lotium abundantius fluxit (HOME *l. c. p. 149.*). Varii ingrati sensus, de quibus dixi, acrimoniae stirpis, quantum apparet, effectus sunt, brevis tamen durationis. Praestantiam vero suam declarat, siue dolor fixus inhaereat, siue vage oberret (Casus a GRUNERO propositi). Tussim et scretus pituitosos ex malo pectus occupante quoque levat. Non sufficere ischiadi nervosae tollendae ex casu singulari annotavit KÖLPINUS (*l. c. cas. 13.*). PALLASIUS autem meminit viri diuturna ischiade nervosa paene claudi et emaciati, sed diuturno usu Rhododendri omnino sanati (*Fl. Ross. p. 46.*). Citius et efficacius aegris robustis et integritate virium fruentibus auxilium

80 RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

illum affert, quam contrario modo sese habentibus.

Mitigat quoque dolores artuum venereos, quamvis ipsum virus in Dauria non sufflaminaverit. Sed non omni huius generis efficacia carere, singulare exemplum persuadere visum est (KÖLPIN *cas.* 2.).

Audaciores admonendi sunt, rem esse cum efficaci remedio, quod providam administrationem, tam in selectu aegrorum quam dosi et ordine praebiorum adhibendam, requirit. Attamen et exemplum praesto est continuationis per biennium protractae et doseos quatuor unciarum infusi saturati impune capil (PALLAS

Fl. Ross. p. 46.). Sordes primarum viarum si latent, hae ante praebia stirpis everrendae sunt. Pro formula proponitur sequens: ꝯ. Stipit et folior. Rhodod. dr. ij. ad unc. 6. Infund. cum Aqu. font. unc. ix. Stent in digestionem in vase bene obturato per horas xxiv. ad ebullitionem usque. Colat. D. S. Capiatur cyathus dimidius vel supra pro dosi semel vel bis de die (KÖLPIN *l. c. p.* 26.). Prudentis et scientis est, pro re nata infusum vel laturatius vel debilius parare, augere vel minuere dosin, tum et praebia, si opus, per tempus intermittere. Generoso A DEMIDOF Moscuae placuit uti pro se aliisque tinctura ex foliorum unc. ij. Spirit. Gall. et Vini Hispan. ana lib. semis per duas hebdomades infundendo parata et cum decocto residui in libra una aquae diluta

luta ad cochlearia quinque mane (*Neve nord. Beytr. vol. 3. p. 399.*). Profuit multis, inter solitas molestias, in affectionibus arthriticis, etiam in haemorrhoidibus cœcis post usum per dies duo vel tres (*IBID.*).

Queritur medicus quidam Svecius (*DUBB in Veckoskrift för Läkare, vol. 5. p. 161.*) de inertia huius medicinae, et licet infusi libram unam per diem aegri eius hauserint, hi neque bonum neque malum effectum inde experti sunt. Diiudicare causam huius inertiae, in tanta brevitate dictorum non vacat.

Commodi ex applicatione externa quaedam quoque documenta adfunt. Scilicet ulcere cruris enato in arthritica foemina somentatio cum decocto secundario stirpis tam pus correxit quam consolidationem adiuvit (*KÖLPIN cas. 4.*). Dolores pariter dentium ex causa eadem conticuerunt, eodem dolenti parti admoto (*ID. p. 114.*).


De vi foliorum in alvi profluvio cruento coërcendo memorat MESSERSCHMIDIUS (*PALL. Fl. Ross. p. 44.*), quam vero subsequa ætas non curavit. — Nec de potestate eius in tumoribus scirrhis et cancrois mammarum, cuius Catharinaepoli quaedam indicia observata, serius aliquid cognovimus (*Vid. BÜTZOW in N. nord. Beytr. l. c. p. 399.*). Narratum vero, post captam unciam dimidiam

Vol. VI. F do.

82 RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

dolorem et tumorem imminutum, ichoris acrimoniam mitescere coepisse, et unam aegram post sesquiunciam omnino convaluisse (IBID.).

Pulvis scopo errhino in Sibiria contra catarrhum et in cephalalgia naribus attrahitur (L. B. AB ASCH in *litt.*). Ipse inde copiosum muci affluxum cum subsequente sternutatione in me percepi. Quin ex fasciculis modo herbae apertis, et in mensam vicinam repositis, pruritum singularem narium cum vellicatione ad sternutationem sensi.



310. b.

(Vol. 2. p. 308. pone Astragalum Tragacanthum.)

Pharm. ASTRAGALI EXSCAPI
Radix.

Astragalus exscapus; acaulis exscapus leguminibus lanatis, foliis villosis LINN. *Mant. pl.* p. 275. *Syst. veget. ed.* 14. p. 685. JACQU. *Collect. ad bot. vol.* 2. p. 269. Icon: EJUSD. *Pl. rar. vol.* 2. fasc. 1. tab. 17. recus. in GIR-TANNERI *Abhand. üb. d. ven. Krankh. tom.* 1. tab. ad eund. Cf. WINTERL *Ind. hort. bot. Pestin.* p. 14. *Astragalus perennis supinus foliis et siliquis hispidis flore luteo* KNAUTH *Fl. Hal.* p. 41. BUXBAUM *Pl. Hal.* p. 32. *Cicer montanum ακαυλον* C. B. *Pin.* p. 341. *Prodr.* p. 147. *Glaux lanuginosa montana acaulos* RUPP. *Fl. Ien. ed.* HALL. p. 270. *Planta perennis, in montibus Thuringiae, collibus saxosis, glareosis circa Nordhusam (C. B.), in collibus Wettinensibus Halae vicinis (KNAUTH), Traiecti ad Viadrum (HARTMANN apud TIEZ), in Hungaria, spontanea.*

Radix simplex, nonnisi versus apicem divisa, perpendicularis, quatuor vel plurium pedum, lente gracilescens, fibras ad latera spargens. Sicca radix multiceps, rugosa et stig-

matibus fibrarum resectorum notata, epidermide bruna, parenchymate albo, in filamenta facile longitudinaliter divisibilis. Sapor eius amaricans et subadstringens est, odor nullus. Decoctum sapore ad infusum Liquiritiae prope accedit, hinc non ingratis capitur (QUARIN *Animadv. pract.* p. 320.), alius cum Amygdalarum amararum sapore comparat (ENDTER *Diff. de Astragalo exscapo*, p. 12. *Gott.* 1789.) coloris subfusci. Idem vitrioli martis solutione sensim obscuratur, non vero nigrescit. Extractum aquosum pr. sesquidrachmam circiter ex uncia una constituit (ENDTER) alius eius scrupulos decem obtinuit (WEGERICHI *Diff. de Astragali exscapi radice*, *Erf.* 1789. p. 4.), saporis extracti Dulcamarae. Spiritus vini praebet extracti primi subamari grana triginta duo (*Diff. cit. Gott.*). Subtiliora vel magis ambigua experimenta (*Diff. Erford.*) non attinet hic repetere, ex quibus hoc etiam colligitur, acidum sacchari inesse. Nolo ex dictis expedire, quod sit resolvens, demulcens, involvens, et morbos, quibus tollendis par sit, divinare. Sed illis potius insistam, quae arte de eius vi explorata esse videntur.

Periodum, intra quam inclauit radix instar medicaminis ab anno 1786. numerare convenit, quo ipso ill. L. B. A. QUARIN in lectu dignissimo libro (*Animadv. pract.*) de experimentis quibusdam usui in lue venerea faventibus referret. De hoc cl. WINTERL, Prof. Pestinensis, Vindobonam perscripserat, in con-

fini-

finibus Hungariae, addit cl. SWEDIAVER (*On venereal complaints*, p. 259.) Turciae proximis a mulieribus morbos venereos decocti ope sanari. Capta igitur Vindobonae in nosocomio magno experimenta, quorum successum exoptatum historiis quatuor confirmat. In duobus horum arthritis cum symptomatibus variis di-
rioribus venereis, ut tophis, ulceribus, iuncta fuit; sed utrumque malum cessavit decocto ex Radicis uncia dimidia cum aquae unciiis quindecim, donec libra una remaneret, cocta, quod liquidum tepide mane et vespere sumendum erat. Haec formula etiam aliis, qui medicinam hanc tentarunt, pro norma fuit. Seriem experimentorum ibidem in nosocomio factorum continuat cl. CRICHTON Anglus, testis oculatus (in cel. GIRTANNER *Abh. über d. vener. Krankh. vol. 1. p. 406. sq.*). Haecce cum prioribus, nec alia, in dissertatione Gottingensi (*l. c.*) proposita sunt. Symptomata venerea, quae Astragalo chrata dicuntur, difficilioris quod partem generis sunt, ut exostoses capitis, tibiae, costarum, claviculae, nodique, tophi, exanthema faciei, gonorrhoea, condylomata labiorum pudendorum, bubones, scabies, exanthema squamosum superficiei corporis, bubones, tinea capitis, ulcera. Et hisce affecti aegri omnes, tam viri, quam foeminae, intra aliquot hebdomades vel menses valetudini restituti feruntur solo decocto radice, et subinde applicatione eius externa. In tinea capitis (CRICHTON *l. c. p. 410.*) adiumento fuit praescindere crines ante applicationem exter-

nam, unde exigua suppuratio et squamarum delapsus. Et hisce quidem nihil mercurii antea datum fuit, certe non sub decursum novae curationis. Testis fidei experimentorum nosocomii Vindobonensis quoque existit cl. WERNER (in *Diff. de virtute Saponariae offic. Traj. ad Viadr.* 1789.). Memorabile potestatis exemplum exhibuit decoctum ore captum et linteolis externe applicatum in puella, post rebellem luem veneream exostosi diuturna costae septimae dextrae cum foeda exulceratione tentata (TIETZ *Diff. de virtute Astragali exscapi antivenerae memorabile exemplum*, *Traj. ad Viadr.* 1790. p. 14.). Aveo legere historias a cl. CARMINATI concinnatas, quae EJUSD. *Opusculorum therapeut.* tomo 2. servantur, quum a viro tantae perspicaciae, ingenii et in experimentis instituendis patientiae, quicquid ad verum eruendum pertinet, discussum expectari possit: consecrariis inde factis non parum usui faventibus et dicta partim confirmantibus haecenus acquiescere oportet (expositis per litteras, Ticini regit datas d. 15. Febr. 1790. in *Allgemein. Litt. Zeit.* 1790. n. 60. p. 483.).


Quoad partem modo auxilio fuit foeminis tribus istis, de quibus cl. WEGERICH (*Diff. cit.* p. 9.) narrat. Sublata quidem varia pectoris, a morbo debilitati, mala, sed ulcera faucium et pudendorum et scabies pertinaciter potestati radice resistenterunt, excepto uno casu, quo ulcera faucium consolidata; ita ut ad alia praestantiora, quae spem confirmarunt, transcundum

eandum esset. Non miror, quod non suffecerit casu singulari, quo vuula et tonsillae consumptae erant, ossa nasi carie correpta et ulcera ichorem mali moris fundebant, praevio pyatissimo his excitato, licet initio levamen afferret (CRICHTON *l. c. p. 411.*). Miror potius, quod idem cl. CRICHTON, qui ambiguum huncce eventum describit, nec sine elogiio Vindobonensium experimente dimisit, propriis suis ferius Londini institutis, ad contrariam partem transgredi coactus fuerit (ARNE-MANN *Progr. de morbo venereo, 1790. p. 11.*).

Qui vere ex lae emerferunt, vel modo levati, in hisce omnium consensu post potum decoctum copiosus sudor praecipue noctu successit. Sunt, quibus uberius lotium movit. Initio curationis quidam alvum solutam inde experti sunt, sed postea cessantem et diaphoresi et diuresi locum cedentem. Sedimentum in lotio vulgo apparuit, album, mucosum (WERNER *Diff. cit. p. 4.*). Subinde effectum post dosin drachmarum duarum vel trium praestat, etiamsi quatuor vel sex et supra dari possint (CARMINATI). Mitigat symptomata; inprimis dolores nocturnos, et dissipat eos quadoque omnino. Nunquam dolores creat, ne in summe emaciatis et sensilibus, ut Guaiacum et Lobelia aliquando faciunt (IDEM). Ad iudicium CARMINATI, etiamsi inveteratam lue non sanet, progressui tamen eius obicem ponit longe certius, quam omnia ligna et radices,

dices, quae antivenerea censentur. Dignum igitur, quae recipiatur in suppellectilem medicam, et ulterius exploretur, an recidivo malo avertendo par sit, anne valeat tum, quando mercurius iners est, et anne in connubio mercurii plura praestet, quam hic ipse solus.

Supra memini solatii aegrorum, una cum lue venerea, arthritide vel rheumatismo correptorum. Hoc forsitan ansam dedit tentandi radicem in proxime dictis malis, sola dum infestarent. In hisce satisfacit cl. HUNCZOWSKY saepe egregie, quum tamen in eius apud venereos administratione voto exciderit.



P T E R O C A R P U S .

LINN. *Syst. veg.* p. 533. *Gen. pl.* p. 366.

313. b.

(Vol. 2. p. 312. pone Trigonellam Foenum graec.)

Pharm. SANTALI vel SANDALI
RUBRI *Lignum.*

Pterocarpus Santalinus; foliis ternatis subrotundis retusis glaberrimis, petalis crenatis undulatis LINN. *Suppl. plant.* p. 318. Auctore cl. KÖNIG, qui ex patria specimen cum descriptione et ligno transmisit, lignum hoc arbori praefixae tribuit LINNEUS iun. in *Suppl. HERMANNO* (*Mat. med. tom. 1. p. 236.*) non videtur omnino ignota fuisse; nam arborem indicat esse siliquosam floribus papilionaceis affinem. Sandalum rubrum RUMPH. *Herb. Amb. vol. 2. p. 47.* qui tamen stirpem ipsam non vidit, sed pleraque ab aliis recensita modo, praecipue ab HERBERTO DE JAGER, colligit propria diiudicatione usus. Moutouchi suberosa AUBLET *Guian. vol. 2. p. 742. tab. 200.* huc a LINNEO iun. ob similitudinem florum et fructus refertur. Arbor altissima in montibus Palicatensibus Indiae intra montes Hageri

et

et Kair. Haevram et in Zeylanicis habitans (KÖNIG l. c.), in Golkonda, in Timor et insulis circumiacentibus (DE JAGER in VALENTINI *Hist. simpl.* p. 386.).

Lignum. Idem ac lignum Caleaturicum (teste DE JAGER l. c. p. 406.). Plura ligna rubra Indica perperam Santali rubri nomine veniunt. Santalum dictum ob convenientiam odoris fragrantis cum reliquis lignis santalinis. Lignum, dum caeditur, odorem gratum spargit, tanto penetrantior, quo vetustior arbor est, quem odorem per tempus et exsuccum servat, radendo renovandum. Pars vero unice medullaris arboris in usum trahitur dicto nomine, quae, prout servatur, repraesentat frusta, secundum longitudinem scissa, compacta, rubra extus nigricantia fere, interne laetius rubra, fibris mox rectis mox undatis. Censeatur melius, quo floridius vel pallidius rubrum est. Saturatius rubrum, quale illud est, quod contusum venditur, vilius iudicatur, vel salino quodam additamento inquinatum.

Omitti commodè posset ex medicaminum censu, nempe neque sensus neque mutationes in corpore morboſo magnam potentiam produnt. Unus negat, aquam tingi exinde alio colore, quam in flavum inclinante (LEWIS *M. m.* p. 517.); alii contra affirmant, aquam inde obscura (CARTHEUS. *M. m.* vol. 2. p. 545.), vel grata, rubedine (BERG. *M. m.* p. 906.) imbui. Hoc notare non superfluum, quum


quum teste cl. KEWIS tingere aquam rubedine ligno Brasiliiano, quod facile cum Santalo rubro confunditur, non vero huic datum sit. Infusum huius generis quidem insipidum et inodorum, sed extractum inde paratum, quod $\frac{1}{8}$ pendit, falsum et leviter adstringens (CAR-
THEUSER; nisi de ligno Brasiliiano loquatur) est; et ipsum infusum vitriolo martis obscurius fit. Spiritus vini autem avidius absorbet tingentes partes ad $\frac{1}{4}$ circiter usque. Adeo rubrum est extractum spirituosum, ut tantillum eius magnam spiritus vini quantitatem rubro grato suffundat, non vero olea sive expressa sive destillata (HOFFM. *Obs. phys. chym.* p. 71. qui resinam illud vocat), excepto tamen ex horum censu oleo Lavendulae (LEWIS *M. m.* p. 518.).

In blanda adstringendi efficacia tota eius virtus continetur. Arabes tam hoc, quam reliqua ligna santalina, exercitio artis dicarunt, subscribente illis subsequente aetate; ut de Inodorum in eo collocata fiducia nihil commorem, in dysenteria cum Oryzae aqua, in mictione cruenta, vomitu sanguineo (RUMPH *l. c.* p. 52.). Nisi omnino hodie excludatur, vix nisi coloris causa amplius fertur apud hosce, qui gratiam remedii vel artem celandi medicinam in rubedine quaerunt.

Pluris facienda in arte tinctoria est ad texta lanea et lintea, gossypina, sericea, coloran.

loranda, quod eo successu sub necessario addi-
tamento fit, ut aëris iniurias impune ferant
(POERNERS *chem. Versuche u. Bemerk. 3.
Nutz. d. Färbekunst*, vol. 2. p. 96. sq. VOG-
LER in CRELLS *chem. Annal.* 1790. vol. 1.
p. 193.). Scriniarii quoque adhibent lignum
pro suppellectili varia lignaria, frequentius in
patria quam alibi, ubi pretium impedimentum
struit, et vix nisi opificiis tessellatis locum
concedit.

Succus speciem sanguinis draconis fugge-
rit (LINN. *Suppl. plant.* p. 319.).



G E O F F R O Y A .

LINN. *Syst. veg. ed.* 14. p. 667. *Suppl. plant.* p. 378.

313. c.

(Vol. 2. p. 312. pone *Pterocarpum fantal.*)

Pharm. GEOFFROYAE JAMAICENSIS *Cortex.*

Geoffroya Jamaicensis; inermis foliis pinnatis septemiugis (ad quindena) cum impari, pinnis oblongo-ovatis acuminatis, racemis compositis terminalibus MIH. *Geoffroea inermis*; caule inermi arboreo, racemis compositis SCHREB. in KLINGSOHR *Diff. de Geoffroya inermi eiusque cortice medicamento anthelminthico*, pag. 11. *Erlang.* 1788. *Geoffroea Jamaicensis inermis*, Cabbage-bark tree or Worm bark tree WRIGHT in *Phil. Transf. vol.* 67. *P.* 2. p. 512. *tab.* 10. Dicitur et wild Cabbage tree, ut distinguatur ab *Areca oleracea* L. quae simpliciter Cabbage tree vocatur. *Geoffroea inermis* foliolis lanceolatis SWARTZ *Prodr. nov. gener. et spec. veget. Ind. occid.* p. 106. *Spigelia* foliis oblongis obovatis nitidis pinnatis, cortice glabro cinereo, The Bastard Cabbage tree BROWNE'S *nat. hist. of. Jam.* p. 367. CHAMBER-

BERLAIN *on the efficacy of Cowhage in diseases of Worms, Vers. German. vom Stizolobium*, p. 21. Arbor procera, sed trunco modice crasso instructa, in Jamaica frequens, praecipue in planitie graminosa depressiori parteque occidentali.

Ligno instruitur duro, unde ad ea aedificiorum opera expetitur, quae duratione et firmitate insigni opus habent (CHAMBERLAIN *loc. cit.* p. 20.). Nectaria alliciunt copiam apum aliorumque insectorum. Sed in primis inclaruit cortice suo, cuius vis anthelmintica primum, quantum constat, in insula Jamaica et quidem praecipue apud nigritas explorata est. Dein haec post pauca ista. quae de eo a. 1775. tradiderat cl. DUGUID, Chirurgus olim Jamaicensis (*Essays and Observations physical and lit. of Edinb. vol. 2. impress. a. 1770. p. 290.*), eaque pariter pauca, quae cl. BROWNE (*Nat. Hist. of Jam. 1756. App. p. 367.*) de eo memoriae reliquit, in Britannia uberius innotuit litteris et commendatione cll. RUSH, med. Professoris in Philadelphia (*Med. and phil. Commentaries, vol. 1. 1773. p. 328.*), MAC DONALD, Chirurgi Jamaicensis (*l. c. vol. 2. 1774. p. 96. sqq.*), ANDERSON (*l. c. 1776. p. 84.*) ex Jamaica Edinburgum praxin suam transferentis. Praecipue autem ibidem celebritatem sibi acquisivit, postquam cl. WRIGHT (*l. c.*) stirpem botanica descriptione et icone instrueret, id quod a. 1777. factum est, additis quae ipse de virtutibus eius in Jamaica

maica cognoverat. Successerunt tempestive experimenta medicorum Scotticorum et Anglicorum, nec absque effectu probo expectato, licet multi vehementiam in vomitu et alvi purgatione cienda redarguerint (DUNCAN in *Comment. cit. vol. 1.*), alii in diuresi movenda (DONALD MONRO *l. c. vol. 2.*). Haec in medium prolata incommoda videntur vulgatiorem corticis usum retardasse tam in Britannia quam extra eam, et in causa esse, ut vix hactenus in libris de materia medica adoptatus exstet, nec, etiamsi in *Pharm. Edinb. a. 1783. p. 27.* receptus, in *Londinensi a. 1788.* locum obtinuerit.

Corticis memorantur duae varietates: alter cortex coloris est multo pallidioris, saporis ceteroquin fere communis, et vehementiorem effectum edit, scilicet alvi deiectiones fluidas, nauseam insignem, tormina quin subinde deliquia animi mox post eundem ingestum (ANDERSON in *med. and phil. Commentaries, vol. 4. p. 85.*). Alter, qui vulgo praxin medicam in insulis Americanis intrat, colorem obscuriorem habet, quem cl. ANDERSON comparat cum colore Cassiae lignae; quidni Cassiae caryophyllatae, cui similior est? Ingratum est, quod descriptiones auctorum de genuino cortice tantopere variant, et quod et specimina, quae possideo, inter sese haud parum discrepent; unde successus in medicina ipsa subinde ambiguus evadit. Amplissima descriptio corticis est, quam cl. CHAMBERLAIN, qui ipse in
Jamaica

Jamaica fuit (*l. c. p. 19.*), dedit, nimirum esse cinereum et subinde rubri vel ferrei coloris maculis distingui, epidermidem deglubi facile, corticem subiectum, si siccus evaserit, referre ferrum rubigine correptum et superficiem internam esse cineream, comparatque eam quoad externum habitum cum cortice Cascaillae. Hae notae satis bene quadrant in specimina ista, quae ipse clar. WRIGHT olim secum tulerat ex Jamaica et mecum liberali manu cum tot aliis materiae medicae et florae Jamaicensis cimeliis communicavit. Addo, specimina ab eo mihi missa, convexa pedalem assequi longitudinem, diametro pro aetate rami differre, item crassitie, quae aliquando lineam superat, epidermide dempta superficiem externam corticis minutis colliculis exasperatam esse, internam subtiliter striatam, frustra quaedam utrinque plane cinerea vel chalybeo colore tineta, alia extrinsecus vel profundius ferruginea comparere, texturam corticis esse fibrosam et modice tenacem. Recens detractus saporem mucilaginosum dulcem et insipidum prae se fert, odorem autem ingratum subnauseosum, etiam in decoctione superstitem, unde et arbor Bulge water tree vocata est (WRIGHT). Amaricantem subausterum reperio corticem iam mihi praesentem. Discrepat valde ab hacce descriptio ista cl. BONDT (*Diff. de cortice Geoffroae Surinamens* p. 17.), qui Jamaicensem corticem innuit interne Rhabarbarum referre fere, vel colorem ex flavo et viridi mixtum habere, ubi vero lignum tangat, flavo
fulcum

fuscum esse, saporis valde amari. Eiusmodi specimina quoque possideo, sed non dubito eadem spuria pronunciare, comparando ea cum Wrightianis. Deglubitur cortex de ramis non tam annotinis, quam biennibus vel triennibus.

Distinguunt Indi inter arborem masculam et foemineam, quarum illa debilior vi vermifuga; in quo autem verum discrimen arborum harum consistat, haftenus evinci nequit: utrum varietates an species adeo diversae sint (Vid. de hac re BONDY *Diff. cit. p. 14. et 104.* et CHAMBERLAIN *l. c. p. 20.*).

Cortex, prout asservatur, sensuum scrutinio subiectus, pauca modo effectus indicia prodit. Coniectura fert (WRIGHT *l. c. p. 509.*), narcotica vi efficacem esse; nec adversatur, quod alvum expediat, quum id in quibusdam aliis narcoticorum exemplis pariter contingat. Manifestius sensus vellicat praeparatione varia subactus.

Etenim aqua eius destillata subacris est, odore subnauseoso imbuta. Qui odor decocto, quod saturatione fuscum evadit, ut dixi, pariter inest. Inspissando illud ex corticis drachmis sex extracti aquosi primi grana sexaginta sex eruuntur, amari, tum nonnihil acris. Tinctura cum spiritu vini rectificatissimo et eadem, quam dixi, quantitate corticis parata, colorem vini Rhenani generosi habet, et extracti spiri-

tuosi primi grana viginti octo praebet, modice amari, acris tamen haud parum. Acrimonia singulorum tenacius ori inhaeret, praecipue autem extracti spirituosum secundi, quod adeo Hydropiperi vix acrimonia cedit. Arctus nexus inter gummosas et resinosas partes obtinet. In miscela cum solutione aquosa vitrioli martis enascitur ex pulvere color purpureus parum lutescens, neutiquam vero niger (Hasce aliasque encheireses tradit cl. KLINGSOHR *Diff. cit.* §. 6. 7.).

In lumbricis necandis et expellendis potestas eius nominatim explorata. Laborant hisce magna caterva nigritae insularum Americanarum, sed saepissime abigere istos hocce cortice succedit. Nec dubitatur etiam infantibus eundem ingerere (MAC DONALD in *med. et phil. Comment. vol. 2. p. 96.* WRIGHT *l. c.*). Subinde tamen irrita reddunt experimenta sua pertinacia (CHAMBERLAIN, *p. 30.*), vel assuescit natura medicamini (WRIGHT *l. c. p. 510.*), ut vel ad alia discedere oporteat, vel alia commoda connubia facere. Qui de nausea, vomitu, alvi purgationibus fortioribus aliisque incommodis queruntur sub usu obviis (*Med. et phil. Comment. vol. 1. p. 329.* WRIGHT *l. c. p. 511.*) confusione forsitan corticum sibi imponi passi sunt, vel dosi nimia nec aetati opportuna. Ubi nigritarum vel ignorantiae vel temeritati res committitur, non mirum delicti poenas aegros luere. Commune et habet hic cortex cum aliis remediis, ut initio aegrius
fera.


feratur, hinc plerumque initio vomitiones al-
vique deiectiones postea non percipiendae, dum
in progressu natura eidem affuescat. Rarior
est observatio, illum, loco excretionum dicta-
rum, diuresin potentius pellere (DONALD
MONRO in *med. phil. et Comm. vol. 2. p. 98.*).
Tanto maioris interest modum exhibendi illum
probe nosse.

Confert initium parva dosi facere et ean-
dem augere, donec aeger nauseam percipiat.
In pulverem cortex facile conteritur, et spe-
ciem pulveris Jalappae prae se fert. Homo
robustus eius initio grana triginta, iuvenis gra-
na viginti, infans biennis vel triennis gr. de-
cem ferr, infans anni unius dimidium, quod
valet et de reliquis praeparatis in hac aetate
(WRIGHT, p. 509.). Hac forma datus prae-
cipue cito alvum laxat, sed non aequè certo
vermes tum necat, ac in decocto. — Deco-
ctum parari potest ex costicis uncia una in
unciis triginta duabus (a quart) cocta, do-
nec colorem ambrae vel vini Maderaici assu-
mat (WRIGHT), vel (secundum consilium
DONALDI MONRO in *med. and phil. Com-
ment. vol. 2. p. 96.*), donec supersint unciae
octo (boiled to half a pint). Colato liquido
saccharum additur. Huius robustus quatuor
cochlearia capiat; iuvenis tria, infans dictae
aetatis unum (WRIGHT). Mane per tres
vel quatuor dies capiantur doses dictae (CHAM-
BERLAIN *l. c. p. 23.*), nisi necessitas requi-
rat, ut diutius usus continuetur in octo vel

novem doses usque, quod rarum est (ID.): Placet et decocti alia dandi ratio, scilicet ex corticis uncis duabus et dimidia et aquae quartis duabus ad libram civilem unam et dimidiam coctis, cuius colatae primo mane adulto detur cochleare unum, secundo cochl. unum et dimidium, sensim ascendendo ad cochlearia quatuor vel quinque et continuando octo vel novem diebus (ANDERSON in *Comment. cit. tom. 4. p. 87.*). Decocti creberrimus usus fit in America et efficacissimus, sed non diu servari potest, antequam corrumpatur. — Syrupus ex hocce dupla quantitate sacchari addita fit, servarique hic impune per aliquot annos potest, et capi eadem dosi, ac ipsum decoctum (WRIGHT). Est (RUSH *Comm. cit. vol. 1. p. 328.*), qui hanc formam reliquis corticem dandi praefert. — Extractum evaporatione decocti in balneo mariae conficitur. Tanta huic efficacia insidet, ut nonnisi gravis eius tribus adultis indigeat, et grana quinque robustum vehementius afficerent et pluries in eo alvum solverent, dein tamen grana modo decem eundem effectum exsererent (WRIGHT *l. c.*). Cl. WRIGHT non meminit necessitatis vel subiungendi vel interpolandi purgantia. Commodum tamen aliis visum, post usum decocti per plures dies continuatum dosim Jalappae cum paucis granis Calomelanos subiungere, unde plerumque vermes secesserunt vel vivi vel mortui (ANDERSON *l. c. p. 88.*); vel interserere Jalappam, Rheum, sal Glauberianum, vel quod praestat, olei Ricini unciam unam.

unam. Die autem, quo capiatur purgans, oportet corticem Geoffroyae huius omittere (CHAMBERLAIN *l. c. p. 23.*).

Multa vero incommoda exsurgunt, si aqua frigida bibitur durante effectu huius medicinae, ut nausea, vomitiones, febris, delirium; item si dosis modum excessit. Tum copla aquae calidae ingestae elvendus est ventriculus, multum illico olei Ricini purgandi scopo hauriendum et succus Limoniorum large potui vulgari admiscendus, cuius vis hic, ut accidorum cum opio iusto largius capto, summa (WRIGHT *l. c. p. 510.*) est. Casu dubio in febribus, quae corticem Peruvianum ferunt, e re est utrumque corticem commiscere, item, quando exeunte febre suspicio vermium latentium sese exserit (WRIGHT in *Lond. med. Journ.* 1787. *p. 256.*). Notatu dignissima sunt experimenta, sub moderamine cl. WENDT Erlangae (KLING-SOHR *Diff. cit. §. 10.*) instituta in infantibus quatuor ad novem supraque annorum forma pulveris cum saccharo, vel pilularum ex extracto, item subinde in miscela Rhei et salini instituta, ex quibus apparet, corticem hunc lumbricos quidem et ascarides, neutiquam vero taeniam (*l. c. §. 11.*), subigere.



313. d.

Pharm. GEOFFROYAE SURINAMENSIS Cortex.

Geoffroya Surinamensis; inermis, foliis pinatis quadriugis cum impari, pinnis ovalibus obtusis, racemis compositis MHL. Condidi hancce descriptionem ex ampliori cl. BONDT, quae comparet in EJUSD. *Diff. de cortice Geoffraeae Surinamensis cum tab. Lugd. Bat.* 1788, qui ipse tamen non vivam plantam examinavit, sed ramulos floriferos et foliiferos vel spiritui vini inditos vel siccos. *Geoffraea Surinamensis*; inermis, foliolis ovalibus obtusis s. retusis, carina dipetala BONDT *l. c. p.* 13. Wewe Indis, Blakke Cabbes vel Wormhoude, i. e. Cortex anthelminticus, Nigritis.

Corticis prima notitia debetur Americano cuidam sacerdoti et medico, nomine MACARI, qui ipse eodem a. 1770. servo nigritae, a veribus convulso et occoecato, auxilio fuit. Hunc salutarem effectum conspiciens cl. VAN STUYVESANT, qui praxin medicam tum in Surinamia exercuit, a meritissimo NEPUEU, tunc Surinamensis coloniae Gubernatore, precibus impetravit, ut soluta liberaliter pecunia eiusdem cognitionem redimeret. Sic ad experimenta ipsius dicti medici res processit. In Europa

Europa vero primum cortex in manus pharmacoplae Ultrajectini JULIAANS pervenit, una cum exemplis ipsius stirpis; unde copia facta fuit cl. VOLTELEN, Professori medicinae Lugduno-Batavo, JULIAANS M. D., DE MAN, RUMPEL aliisque medicis Belgicis, illum apud aegros bene multos explorandi. Accessit horum a cl. BONDT collectis historiis numerosis proprium eius in rimando cortice eiusque stirpe quoad varios respectus laudabile studium.

Cavendum maxime, ne confundatur cum cortice quodam a nigritis Tinkihoude dicto, qui instar cocculorum Indicorum pisces inebriat; nec minori noxa venditus fuit sub veri nomine cortex Mezerei (BONDT *l. c. p.* 18.). Genuinus cortex, ex trunco vel ramis detractus discinditur in frusta longitudinalia plana, pedem supraque longa et pollices aliquot lata, ponderosa crassitie notabilis, et diversae vel pro arboris aetate vel parte, a qua separatus fuit. Colorem habet extrinsecus cinereum ex lichenibus innatis, quibus separatis epidermis comparet rubra, purpurea fusca intermixto cinereo pro varia aetate. Sub hacce compages conspicitur filamentosa, lamellosa coloris ferruginei fuscescentis cum intermixtis striis maculisque profundius coloratis rubris fuscis. Transversali sectione splendet et variegatus est. Prope lignum colore tingitur atro-purpureo, vel variegato vel punctis albicantibus intersperso. In pulverem contritus exhibet colorem pallide ci-

namomeum. Odoris expers, nisi recens, qui nauseosum odorem spirat, saporis leviter amari et nonnihil austeri: manifestior tamen amarities sentitur in strato atro purpureo, qui cortici contiguus est (BONDY).

Destillatione humida prodit aqua oleo omni carens etsi nonnihil lactescens, odoris nauseosi, saporis fatui (BONDY l. c. p. 20.). Decoctum aquosum saturatius post collationem fusco rubrum est. Protrahitur autem coctio per duas saltem horas, ut omne efficax eruztur. Extractum inde paratum saporem valde amarum et acerbum habet, et sub inspissationem spirat odorem amygdalarum amararum. Unciae corticis octo erogant extracti huius mollis instar mellis uncias unam cum drachmis duabus praeter pellicularum drachmes supra tres. Tinctura spirituosissima profunda rubra resinam dimittit ex corticis unciis octo, ponderis drachmae unius cum granis viginti quatuor friabilem amaricantem. Terrae rhabarbarinae s. selenitis ex terra calcarea et acido Acetosellae, quaelibet uncia corticis continet grana decem (BONDY). Taceo ea, quae destillatione sicca eruta fuerunt (BONDY l. c. p. 18. sq.), utpote minus usui medico accommodata.

Pleraque experimenta in lumbricis instituta sunt, ut tamen etiam ascaridibus cortex insensus sit, quin casu singulari taeniam frustulatim vel per articulos expulerit (l. c. p. 89.). Summam vero vim exercet in lumbricis necandis

candis et exturbandis, qua in re vix efficacius aliud agnoscit remedium, et nocivo omni effectu caret, modo provideatur. Iuvat et tum, quum multa anthelmintica frustra antea tentata fuerunt (*l. c. p. 54. 58 62. 81.*). Una cum vermibus pituitae immensam molem sursum vel deorsum (*p. 40.*) eliminat, ut et fuerit, qui in hac re praecipuam vim quaereret (*DE MAN l. c. p. 63.*). Sic tamen nidi verminosi efficacissime destruuntur, et praeventitur, ne vermium nova pullities fiat. Praeter hasce evacuationes, quarum alvi solutio modica crebrius incidere solet, lotii vias manifestius afficit. Nempe aliquando impetuose mictionem ciēt et molestissimum vesicae tenesmus et stranguriam subinde creat (*VOLTELEN l. c. p. 40.*). Quum mortui saepe vermes cortice capto secedant et aliquando vivi protinus fugam eo ingesto capiant: videtur virosa potius quadam natura ipsos vermes aggredi, quam evacuando effectum suum praestare. Utut verò tutum sit, aliquando tamen turbas haud spernendas excitat, nauseas scilicet et vomitiones, item anxietates nonnunquam diras (*VOLTELEN l. c. p. 41. RUMPEL l. c. p. 65.*). Contigit hoc vel a iusto maiori dosi, aut alvo stricta, nec sub eius effectu soluta, item in corporibus strictioris habitus. Laxa contra et pituitosa corpora, uti infantum, minus hisce incommodis opportuna sunt. Molestus est quoque aliquando in sensibilibus vesicae tenesmus. Et ipsa mucī intestinalis per anum lactura tormina aliquando suscitāt, alvi tenesmos cum striis

san-

sanguineis muco intermixtis (VEIRAC apud BOODT p. 73.).

Varia, quae sub administratione corticis huius contra vermes sese exserunt phaenomena, ansam dederunt adhibendi eam in variis quoque morbis chronicis, vermium sodalities carentibus. Nec eventus spem fefellit. Etenim valuit, ubi labes gastrica, cruda, pituitosa subsistit, in colluvie serosa, solidorum relaxatione, humorum inertia, speciatim in obstructionibus lentis, febre quartana, leucophlegmatia, anasarca, chlorosi, nephritide pituitosa, asthma humido mucoso (VOLTELEN apud BONDT *l. c. p.* 40. 74.). Ita in tussi convulsiva et numerus et vis insultuum defaevit, et screatus pituitae levati sunt (*l. c. p.* 74.). In hydrope tam anasarca, quam saccato saepe quidem frustra tentatus, saepe emolumentum dubium praestitit; sed visa tamen eiusdem cum aliis hydragogis miscela idonea (*l. c. p.* 75.). In universum in hoc cortice praeter incidendi et attenuandi vim insignem tonicam agnoscit inclytus Haaganus medicus A THUESSINK (in *litt.* d. 25. Aug. 1790. ad cel. BLUMENBACH, ab hocce mihi amice oblatis).

Mutari potest forma modusque corticem huncce dandi pro voluntate aegri multipliciter. Nemo exempla uberiora huius rei dedit, quam cl. VOLTELEN. Acquiescere tamen licet deo octo, utpote satis efficaci, cuius formula esse poterit haec. \mathfrak{R} Cort. Geoffr. Surinam.

dr. iij

dr. iij Coqu. in Aqu. comm. q. f. colat. unc. viij
 add. Aquae flor. Naph. v. simil. unc. j M. A-
 dultus huius totum pro dosi sumat mane; ab
 anno 12 ad 20 duae tertiae partes conducunt;
 ab anno 6 ad 12 dimidium; pueris a 2 ad 6
 una tertia sufficit. Intra quatuor dies vermes
 plerumque secedunt, quodsi vero non contin-
 git, expellente opus est (VEIRAC apud BONDT
p. 67.). Quibusdam placuit decoctum saturatius
 exhibere e. c. ut pro colaturae libra una
 corticis unciae duae fumerentur (*l. c.* *p.* 43.
 82.); vel pro colaturae uncis octo, corticis
 uncia una (*p.* 33.). Sponte patet et hic sine
 limato medici iudicio aegrum salutare eventu
 potiri non posse. Syrupi grati e. c. Syrupi corti-
 cis aurantiorum additamento palato magis
 consulitur. — Cl. A THUESSINK (*loc. cit.*)
 aquae spiritum vini pro decocto addit, scilicet
 ita ut corticis huius unciae duae coquantur in
 aquae pintis duabus (puto Gallicis) additis
 spiritus vini uncis quatuor per quatuor horas,
 donec pinta una circiter remaneat. Huius pri-
 mo die unciae duae ter per subsequentes horas
 mane exhibentur, unde duae vel tres modo
 alvi deiectiones plerumque cum exigua nausea;
 secundo die, dum eadem quantitas praebetur,
 manifestior nausea incidit, raroque aeger vo-
 mit, sed foeces alvinae pituitosae redduntur;
 tertio die reliquum per cyathos capitur, unde
 unus vel alter vomitus cum deiectionibus pi-
 tuitosis et verminosis (si sterms praesto sunt);
 quarto die purgans rudius ex resina Jalappae
 et

et Calomelano offertur, quod ipsum immensam copiam pituitae et vermium necatorum evacuat in solatium aegri haud mediocre. Et successit haecce medelae ratio reliquis anthelminticis irritis adhibitis.

Extractum aquosum ad grana viginti quatuor admitti potest; quod ipsum vel teritur sacchari eadem quantitate, vel aqua Menthae solvitur, vel in pilulas compingitur (Vid. e. c. BONDY *Diff.* p. 43. *sq.*). Valde extollitur extractum spirituoso aquosum in affectionibus pituitosis, serophulis et obstructionibus glandularum (THUESSINK *l. c.*). — Locus quoque est tincturae ex corticis uncia una et spiritus vini unciiis octo ad guttas sexaginta supraque. — Item resinae saccharo mixtae, infantibus a gr. tribus ad octo, adultis ad scrupulum unum usque. — Pulvis rarius exhibitus fuit e. c. cum extracto Absynthii in pilulis, quo tamen validius visum electuarium ex pulvere hoc et robe Ribesiorum (BONDY, p. 91.). — Prodest etiam infusum vinosum. — Ad debellandas ascarides plurimum confert corticem in clysmate exhibere ex corticis uncia una in aqua ad colaturam unciarum sex cocta et addita mellis uncia una (*l. c.* p. 45.).

Prouti vero, ut supra iam innui, nisi sola hacce medicina vermes eliminari queant, e re est quarto die laxans subiungere, e. c. ex Rheo: ita artis pariter est, in chronicis malis combinare

nare cum cortice secundum conditiones diversas varia commoda, quorum et exempla nonnulla suppeditavi. Alia auxilia desiderat vehementior ipsius medicaminis effectus, anxietates, nausea, vomitus, quibus vel diminuta dosis, vel purgans additum vel aromata, carminativa blanda, antispasmodica subveniunt; sicut emollientia mucilaginosa et oleosa molestias viarum urinariorum tollunt.



MYROXYLON.

LINN. *Suppl. plant. p. 34. Syst. veg. ed. 14. p. 395.*

315. b.

(Vol. 2. p. 322. pone Cassiam Fistulam.)

Pharm. PERUVIANUM Balsamum.

Myroxylon perviferum; LINN. *Suppl. pl. p. 233.* Hoitziloxitl HERNAND. *Thef. rer. med. nov. Hisp. p. 51. c. fig.* Cabureiba PIS. *Inā. Hist. nat. et. med. p. 119.* Arbor in regno Peruviano, Brasilia, Terra firma, Mexico, habitans.

CL. MUTIS primus characterem botanicum determinandi ansam dedit, ramulo foliis floribusque instructo ex Terra firma ad LINNEUM jun. misso; antea enim ad medicamina ignotae originis hoc balsamum referebatur. Ferax arboribus balsamum fundentibus America australis gignit in hoc numero arborem, Houmiri balsamifera cl. AUBLET (*Hist. des plantes de la Guiane Francoise, tom. 1. p. 564.*) et Terabinthus procera balsamifera rubra cl. BARRERE (*Essai sur l'hist. nat. de la France equinoxia.*)

noxiale, p. 198.) dictam, quae simile Peruviano balsamum stillat per corticem, colore rubro et odore styracem aemulans.

Duplex nomine Balsami Peruviani venit, album et nigrum.

Album rarissime in officinis nostris praesto est. Elicitur inciso cortice parca quantitate tenax subalbidum (MONARD in CLUS. *exor.* p. 302.). Sensum solidescere et fragile fieri sicque intra corticem fructus cucurbitae transferri lego (LEWIS *M. m.* p. 125.). An hocce vere ex praecedente temporis mora enatum, an potius peculiarem speciem constituit (quorsum videtur inclinare NEUMANNUS in *Chym. med.* vol. 2. P. 1. p. 231.), Balsamum Peruvianum siccum, Gallis *Beaume en coque* dictum? Odoris fragrantioris est et gratioris altero, et censetur minus calidum et purgans altero. Gutta calidae aquae instillata mox instar Opobalsami per superficiem aquae se dispergit, et cuticulam format, quae facile demitur.

Nigrum hoc praecipue loco perpendendum. Coloris ex nigro rubentis est, dum vitro illinitur pellucidi, densitate ad syrupum brunum vulgarem accedit, odoris suavis fragrantis styracini, saporis acris calidi amaricantis. Saepe arte lucri causa effingitur. Fide cl. HERNANDEZ et hoc (fulvo nigrum vocat) incisione corticis evocatur. Sed aliam originem etiam agnoscit, scilicet coctione concisorum surculorum

rum cum aqua, ex cuius superficie dein auferitur; id quod perpetuo fieri in hoc ramulis imo trunco comminutis, MONARDES (*l. c. p. 302.*) edocet. Contra hoc coctionis artificium id dubium movet, quod portio balsami incidens in aquam fervidam sese dispergat in duas partes, quarum una maiorem fundum petat, altera subtilior saporis penetrantis per superficiem sese dispergat (*HOFFM. Opusc. med. p. 307.*). Unde forsitan alia quam dicta encheiresis pro eo obtinendo adhibetur.

Calefactum balsamum ardet flamma admodum. Diuturna statione in fundo vasis generantur crystalli salinae, quae solutae aqua flores Benzoes mentiuntur (*CRELLS chem. Journ. P. 1. pag. 58.*). Spiritu vini facile solvitur. Connubium oleorum destillatorum facile intrat, sed respuit miscelam cum expressis vel pinguedine animali. Aquae fundum petit; nec nisi mucilage quadam vel vitello ovi addito unionem cum illa subit: attamen aqua cum balsamo hoc conquassata impraegnatur partibus odoris. Non satis constans connubium praestat saccharum, si eo excipitur. Destillatione cum aqua dat ponderis sui $\frac{1}{4}$ olei destillati, coloris rubicundi, odoris fragrantis et saporis pungentis. Destillationi siccae debemus oleum empyreumaticum ex flavo rubrum, aquae supernatans, cui succedit crassius ponderosum (*HOFFM. l. c. p. 307.*).

Bal--

Balsamorum fama prout in universum se-
rioribus temporibus valdopere imminuta, ita
et huius balsami. Laudes similes tulit, quales
alibi de Balsamo Copaivae attrigi (*Vol. 4. p.*
51. sq.), ut vel hocce nomine liceat esse
brevioribus. Quales Peruvianus nominatim
olim reportaverit, vel unice interprete FRI-
DERICO HOFFMANNO (*Diff. de balsamo*
Peruv. l. c. inde a p. 309.), gravi alias viro,
cognosci potest, utne mentionem faciam prae-
coniorum, quae ex patria balsami com meatu
iusto liberaliori profuxerunt (V. HERNAN-
DEZ, MONARDES, PISO). Respiciunt hae
et vulnerariam virtutem, qua recentia vulnera
consolidare absque suppuratione subsequente et
cicatricis vestigio fertur. Locum habet hoc,
ut alia balsama, quando progenies carnis te-
nellae nimis, lente succedit, at haecce igitur
arte acceleranda est. In primis vero hoc cele-
bratum ad arcenda et lenienda symptomata
atrocia, quae ex laesis tendinibus vel nervis
consequi solent, dum leniter calefactum vul-
neri instillatur, dein spatula calefacta admota
curatur, ut undique sese diffundat; si nimis
arctum vulnus est, dilatio adeo eius requiri-
tur; involvendum vero postea est totum mem-
brum cataplasmatibus aut epithematibus, foven-
dum quoque oleoso blandissimo (SWIETEN
Comment. vol. 1. p. 242.). Sic hoc balsamo
applicato vulnere spasmus atrox et trismus ex
laesione tendinis Achillis, in quo opium fru-
stra tentarunt, sedatus, et idem ultra drachmae
dosin saccharo exceptum et primum ter dein

bis quotidie, donec tres unciae consumptae essent, ingestum convulsiones, ex cohibita excretionem cutanea exortas, subito sopivit (KIRKLAND'S *Trearise on childbed fevers*, p. 28. *Cas. 5. p. 32. Cas. 6.*). Colicae pîctonum dolorem sustulit SYDENHAMUS (*Proc. integ. in Oper. p. 605.*). guttis huius balsami viginti, triginta vel quadraginta, sacchari cochleari uno instillatis et bis vel ter de die captis; paralyfis vero inde non cessit. Haec species elaeosacchari vel et syrupus ex balsamo factus in asthma pituitoso efficaciam egregiam praestitit (HOFFM. *l. c. p. 311.*). Quicquid in hisce boni perperat, videtur stimulante potestate praestare, qua nervos vellicat et vasa irritat.

PRAEPARATA ET COMPOSITA.

Essentia balsami Peruviani *Ph. Würt. p. 78.* Digestione paratur. Vires, adscriptae in ulceribus externis et internis, saeculi nostri iudicio non accommodatae sunt. Nec pro roborando stomacho fidem habet calidum remedium.

Syrupus balsamicus *Ph. W. p. 204.* Ex Julapio rosato et essentia nuper dicta. lisdem laudibus, quales dixi, condecoratus.

Spiritus balsami Peruviani *Ph. W. p. 188.* Destillatione cum alcohole vini addito sale tartari. *FR. HOFFMANNI (l. c. p. 206.)* encomium celebravit tanquam praestantissimum in nervorum et cerebri item glandularum affectionibus frigidis. Sed nec hocce constantiam habuit.

Balsamum Locatelli *Ph. W. p. 29.*
 Balsamum Apoplecticum *Ph. Würt. l. c. p. 28.*
 Emplastrum Stomachicum *l. c. p. 73.*
 Essentia Benzoës composita *l. c. p. 78.*



? T O L V I F E R A.

LINN. *Syst. veg.* p. 331. *Gen. pl.* p. 102.

316. b.

(Vol. 2. p. 325. pone Guilandinam Moringam.)

Pharm. BALSAMUM TOLUTANUM.

Tolvifera balsamum ; LINN. *Spec. pl.* p. 549. Balsamum Tolutanum, foliis ceratiae similibus C. B. Conf. *Tolvifera* JUSSIEU *pl. p.* 372. Arbor in Americæ provincia Tolu pone Carthagenam sita proveniens.

Nondum rite botanicis cognita, sed celebris non solum Indig (MONARD. in CLUS. *exot.* p. 304. *sq.*), verum et exteris ob balsamum, quod fundit. Præfertur ob hocce culta et domestica. Colligitur illud fauciato arboris cortice, qui tenuis est, intra supposita et arbori annexa cochlearia ex cera nigra illarum regionum confecta, ex quibus in alla vascula effunditur (MONARD.) Qui sponte exigua quantitate erumpit liquor balsamicus in terram decidit absque usu. Transfertur ad nos alter in dimidiatis testis cucurbitarum exiguarum.

Nam

Nam licet initio tenax liquidum referat, sensim indurefcit, qua natura facile distinguitur a reliquis exoticis balsamis, quae officinae fervant. Balsamum hoc coloris est rubicundo aurei, pellucidum, aetate fragile, ut digitis in pulverem conteri queat, cuius fragilitatis miror MONARDEM non meminisse, odorem spargit gratum inclinantem ad citreum, masticatione emollitur et dentibus adhaerescit. Igne liquatur et flammam concipit grato fumo. Aqua illud quidem non solvit, attamen per duas vel tres horas cum eo cocta apparatu tecto recipit fragrantem eius odorem; prout quoque destillatione aqua impraegnatur odorifera eius parte. Requiritur ideo mucilaginis adiuventum, ut perfectum connubium fiat, solutione lactescente. Spiritu vini perfecte solvitur. Facile sese commiscet oleis destillatis, difficilius expressis et adipe. Destillatione absque aqua prodit non solum oleum empyreumaticum pallidum et profundioris coloris, sed subinde exigua portio salinae materiae, floribus Benzoës natura similis.

Taedet transcribere virtutes de balsamo de Copaiva et Peruviano memoratis, a quibus eo tantum natura differt, quod blandius est, nec ita calescit et stimulat. Laus eadem ceteroquin et vituperium idem locum habet. Indicatae simul optimae illud usurpandi viae sunt; nec dosis ex dictis difficultatem parit.


PRAEPARATA ET COMPOSITA.

Britannicis medicis in pretio esse, testantur formulae novissimis adeo pharmacopoeis insertae.

Tinctura balsami Tolutani *Ph. Lond.* 1788. p. 92. Tinctura Tolutana *Ph. Ed.* 1783. p. 121. Digestione balsami cum spiritu vini rectificato.

Syrupus Tolutanus *Ph. Lond.* p. 115. Aquae cum balsamo coctae et colatae saccharum admiscetur.

Syrupus balsamicus *Ph. Edinb.* p. 192. Ex syrupo communi et tinctura tolutana.



347. b.

(Vol. 3. p. 82. pone Clematidem rectam.)

Pharm. VITALBAE *Folia*.

Clematis Vitalba; foliis pinnatis, foliolis cordatis scandentibus LINN. *Spec. pl.* p. 766. *α.* *Clematis latifolia integra* JO. BAUH. *Hist. rom.* 2. p. 125. *β.* *Clematis latifolia dentata* J. B. *ibid.* Variat foliolis integris et incisus saepe in eodem individuo; hinc quidam haecce discrimina non curent. Icon: BESLER *Hort. Eystett. aest. ord.* 6. *tab.* 4. *f.* 3. JACQUIN *Flor. Austr. tom.* 4. *tab.* 308. Partes fructificationis microscopio indagatas sistit VON GLEICHEN in *auserl. microsc. Entd.* 53. 54. Planta perennis sarmentosa, sensim truncum lignosum basi crassum formans, crebra in australioribus Europae regionibus ad sepes, locis lapidosis, acclivibus.

Quae iam dudum elanguerat existimatio eius medica reviviscere iam incipit. Acris haud parum stirps. Folia enim recentia linguam et fauces ardoris sensu afficiunt, ibidemque facile vesiculas cient et cutem exulcerant. Siccatione mitescunt, ut tamen etiam ex siccatis faucium ardor enascatur, sapore ceterum ex acido sub-

H 4

dulci

dulci et adstringente. Externa recentium applicatione cutis ruborem et vesicas contrahit. Quod in lucrum suum mendici vocant, exulcerantes crura foliis adultioribus impositis, unde l'Herbe aux gueux haec stirps dicta fuit (SAUVAGES DE LA CROIX in *Mem. de l'ac. R. d. sc. de Paris* 1739. p. 473.). Gustatio aliarum partium stirpis acre latens pariter prodit (MÜLLER *Diff. de Clemntide Vitalba* L. eiusque usu medico, Erlang. 1786. p. 9.).

Aqua ex siccis foliis destillata lacteum colorem gerit ob oleum essenziale, quod licet prae exigua mole non possit separari, in superficie tamen sese prodit colore flavo instructum, urentis saporis. Aqua spirat odorem aquae Anemones Pulsatillae, et paullo lentius ardorem in faucibus suscitatur. Ex herbae uncia una extracti aquosi primi fusci, saporis ingrati dulcescentis, salivam provocantis uncia dimidia, granis quatuor exceptis, eruitur; et ex eadem quantitate extracti spirituosii primi fusco virescentis odoris balsamici saporis amaricantis subadstringentis, fauces nonnihil irritantis drachma una et dimidia elicitur. Decoctum aquosum bruno flavescentis est; tinctura spirituosissima fusco virescentis. Omitto explorationes fortiori igne factas et examen partium hocce auxilio erutarum (quae ut reliquae analytes cl. MÜLLERO l. c. debentur). Solutione vitrioli martis infusum aquosum nigrescit (*Ibid.* p. 17.). Folia fortiori siccatione et vetustate acre.


acredinem suam perdunt et effoeta fiunt, cuius rei ratio in volatilibus partibus evanidis, quas et chemia revelat, quaerenda.

Revellendi potestatem cum aliis acribus stirpibus sub externa applicatione communem habet. Hinc folia huius contusa et in calyculo podagricae parti imposita dolorem in viro quodam superaverunt (CHESNAU *Obs. med.* p. 411.). Eundem in finem iccolae insularum Hybridum in dolore capitis et artuum eadem imponunt (MARTIN *Descr. of the Western Islands of Scotland*, p. 77. 178.), prout iam MATTHIOLUS (in DIOSC. ed. BAUH. p. 681.). — Scabiem a contactu plebs Avione (Avignon) in Gallia brevi sanat herba recente dissecta et contusa, demum pauxillo olei olivarum remixta, qua ipsa partes affectae perunguntur, unde cutis inflammatur et rubescit, item calor febrisque accedunt, assentiente medico experto (VICARY in *Mem. de la Soc. R. de med.* tom. 3. p. 186.).

Tutus tamen quoque eius internus usus est, cuius vestigia quaedam maiores nostri reliquerunt, quorsum narratio MATTHIOLI de efficacia in quartana et TRAGI de virtute in hydrope pertinet. Sed quae magis medicos ad imitationem invitant, sunt pericula lectu digna, quae ill. WENDT auctorem habent, testem successus cl. MÜLLERUM (V. EJUSD. *Diff. cit.* p. 22. sq.). Nimirum, isto auspice, Vitalba acrimoniam scrophulosam mitigavit, cephalaeam

lancam diram rheumaticam sustulit, luem veneream inveteratam et ulceribus emaciatione corporis, vitiatum pectore, diarrhoea, infestatione rel. stipatam sanavit. Videntur pauciora haecenus experimenta cum illa fuisse capta, at tamen consuetudina deduci potuerunt haec, quod aliis vere medelam attulerit, aliis modo mite levamen, subinde quoque spem fefellerit. In binis lotium largius ex usu fluxit. Infusum vero ad cyathos ternos quotidie haustum est.

Tanto tutius usurpatur in medicina, quum in Gallia turiones eius in cibum recipiantur (SAUVAGES DE LA CROIX l. c.), ut alia obscurius de usu cibario dicta omittam, sub quo simul subinde alvum movendi scopus fuit.



374. b.

(Vol. 3. p. 167. pone Prunum Laurocerasum.)

Pharm. PADI Cortex; Baccae.

Prunus Pedus; floribus racemosis, foliis deciduis basi subius biglandulosis LINN. *Spec. pl. p. 677.* *Cerasus racemosa sylvestris*, fructu non eduli C. B. Icon: *Flor. Dan. tab. 205.* Arbor Europaea, in sylvis, praecipue locis depressis, crescens, in Svecia ad sepes pagosque crebra.

Placet fragranti florum vere erumpentium odore et elegantia, sed hisce denatis ob aphides, quibus conspuatur, taedium parit. Fastidiunt herbam equi, quin caprae (LINN. *Fl. Svec. p. 166.*). Lignum nonnisi flexilitate et laevitate sese commendat. Rarissimi usus medici, sed non spernendi. Hinc locis, ubi deficit, per depactos ramos propagare eam, quod facile, operae pretium est.

Corticis praecipue mentio facienda est. Recens ex ramis separatus fragrans odore instruitur, sapore autem amaro et subadstringente ad amygdalas amaras accedente. In sicco similia vestigia remanent. Stratum eius externum praesertur interno, quoniam istud minus lignosum

sum et magis resinofum est (COSTE et WIL-
 LEMET *Essais sur quelques plantes indigenes* p.
 63.). Decoctum corticis pallide luteum est,
 odoris quasi amygdalarum amararum contusa-
 rum vel florum Persicorum, saporis amari. Ex
 uncia corticis redundant drachmae duae cum
 granis quadraginta extracti aquosi; et ex eadem
 quantitate corticis grana 116. s. drachmae duae
 fere extracti resinosi primi (*l. c.*). Hieme col-
 lectus cortex decoctum praebet rubrum, quod
 vitriolo martis nigrescit (BERG. *M. m.* p.
 402.).

Intermittentes febres corticem subigere,
 non ambigua fide nititur. Celebratus autem tri-
 ginta supraque annos scriptione academiae scien-
 tiarum Nanceianae oblata; ab eo tempore pau-
 peribus plerumque optimo successu exhibitus;
 nec in autumnalibus febribus aegros sine ope
 dimisit. Etiam in quartana et tertiana duplici
 auxilium praestitit constans. In pulvere datur
 ad corticis Peruviani modum vel et in electua-
 rio, in quo salis ammoniaci additamentum
 dubium quoddammodo reddit solum corticis
 meritum; cuilibet electuarii praebio superbibita
 est portio decocti corticis (COSTE et WIL-
 LEMET *l. c.* p. 62.). Non vero in Lotharin-
 gia sola, sed etiam in Svecia vis f. br. fuga eius
 enituit (LUNDMARCK *Diff. de usu Linnaeae*
medico, praes. ACREL, p. 4.).

Fennones moliri curationem syphilidis de-
 cocto saturatissimo corticis, iam dudum nota-
 tum

tum (Ex GADDIO LINN. *Fl. Svec.* p. 166.): ast paucos modo ante annos per experimenta curatius exposita certiores de virtute ista redditi sumus (auctore BJÖRNLUND in *Vet. Acad. Andl.* 1784. p. 209. sq.). In affectionibus venereis lenioribus, ut exanthematibus genitalium, oris, gonorrhoea, decoctum solum videtur sanationem absolvisse; graviores mitigavit vel ante connubium mercurii, ei vero iunctum curationis tempus abbreviavit. Vile etiam, quo venditur, pretium, praerogativam prae aliis decoctis, quae cum mercurii usu combinari solent, tribuit. Reliquiis insuper tollendis idoneum censendum. Paratur vero decoctum ex corticis sicci vel recentis concisi unciiis sex, ad octo, et aquae cantharo uno ad dimidium coctis, dein collatis. Huius quotidie libra una haustibus quatuor diversis bibitur, maius praebium fastidium parit. Quod alias quoque in quibusdam incidit primis diebus donec ventriculus decocto assuescat. Praeter vim in ipsum virus solatur aegros, qui una cum hoc inquinamentum scorbuticum vel labem concoctionis virium patiuntur (*Ibid.*). Balneis quoque ex decocto Padi contigit, ut pessima symptomata venerea tollerentur, donec subsequente mercurialium administratione perfecte aegri convalescerent (LUNDMARCK in *Veckoskrift för Läkare*, vol. 7. p. 67. sq. Conf. vol. 8. p. 115.)

Bacca sic dicta drupa est nigra, pili magnitudinis, saporis acidulo subadstringentis, nau-

nauseosi, nuce ovata rugosa, intra quam nucleus saporis, qualis in Persicae nucleo. Vix nisi pueris in deliciis esse potest, prout in Norrlandia pauxillo salis ab hisce ingeritur (LINN. *Fl. Lapp.* p. 115.). Ast baccae recentes sive siccatae cum nucleis confusae atque vino albo persusae vinum largiuntur Cerasorum vino sapidius. Fermentationi commissae spiritum erogant tanta ubertate, ut ex baccarum congiis duodecim spiritus librae novem redundant (VON AKEN in BERG. *Mat. med.* p. 401.). Baccis in dysenteria Fennones utuntur (GADD *l. c.*).



MESEMBRYANTHEMUM.

LINN. *Syst. veg.* p. 389. *Gen. pl.* p. 252.

389. b.

(Vol. 3. p. 251. pone Cactum Opuntiam.)

Mesembryanthemum crystallinum; foliis alternis ovatis papulosis, floribus sessilibus, calycibus late ovatis acutis retusis LINN. *Suppl. plant.* p. 259. *Mesembryanthemum crystallinum*, plantaginis folio undulato DILL. *Hort. Elth.* p. 231. *tab.* 180. *fig.* 221. Planta annua de qua adhuc dubium, an ex Africa sit (LINN. *Spec. pl.* p. 688.).

Colitur in vaporariis ob gratum papularum, praecipue caulibus insidentium, pellucidarum, earumque ibidem insigniter prominentium aspectum, qui remotius speciem fert stirpis crystallis glacialibus, obsessae; unde Germanicum nomen *Eispstanze*. Si maior eius copia requiritur, feri poterunt semina in olla, et plantulae inde enatae in aream austro obversam transferri. Semina haud aegre intra vaporarium apud nos maturescunt.

128 MESEMBRYANTHEMUM CRYSTAL.


Sapor *herbae* blande salinus, refrigerans. Est, qui eum cum sapore terrae foliatae tartari comparat (LIEB).

Tractatulus, de quo mox agam, ansum dedit experimentis quibusdam chemicis cum herba institutis a cl. (CRELLS *chem. Annals* 1787. vol. 1. p. 503. sq.) et C. A. HOFFMANN (*Almanach für Scheidekünstler u. Apotheker* 1788. p. 81. sq.), quorum hic mucilaginem, pauxillum tartari vitriolati haud parum vero salis digestivi et longe minorem quantitatem nitri, elcuit. Transeo experimenta ope vehementioris ignis facta.

Commendatio cl. LIEB (in tractatulo: *Die Eispflanze als ein fast specifisches Arzney-mittel empfohlen*, 1785. 8.) in causa praecipue est, quod eius hic mentionem iniciam. Hic ipse eam adhibuit in infarctu pituitae abdominali, lotio suppresso vel dolorose misso, spasmu vesicae urinario, item tussi convulsiva, uti quidam casus quatuor de succo declarant, doli cochlearis, cuius integrum pro adulto, dimidium pro infante sexenni fuit. Mirum paucas doses et tam exiguum quantitatem tam pertinacibus malis sufficisse. Nolo hic disquirere, an ex tam paucis documentis tamque breviter expositis tuto satis istae virtutes colligi possint, et dubito adhuc coniecturis additis de virtute eius in corrigenda bile aliisque morbis tollendis subscribere. Attamen ad iteranda experimenta excitat quoque exemplum cl. MÖHRING,

RING, medici Jeverani, senis venerabilis, qui de auxilio, quod sibi in proprio morbo hac herba attulit (*Litteris d. 26. Sept. 1786.*) me olim certiores reddidit. Querebatur tum, se per tres annos cruciatus dirissimos ex spasmo vesicae urinae absque calculo vel haemorrhoidibus perpeffum. Post multa frustra tentata, cognita scriptione supra dicta, usus fuit succo plantae expresso, pauxillo sacchari mixto, eo eventu, ut capto ter vel quater omni bishorio cochleari eiusdem lotium longe facilius manaret cum dolorum decremento. Continuat ad tria vel quatuor cochlearia per diem usus solatium confirmavit, unde ad tempus usque, quo scribebat, supra quinquaginta uncias consumpserat.

Vix videtur herba huius stirpis viribus ab affinium, Telephii, Sempervivi, Portulacae, Rhodiolae, herbis differre, quae omnes succo aquoso, subsalfo, refrigerante, turgent.



F A G A R A .

LINN. *Syst. veg.* p. 134. *Gen. pl.* p. 60.

430. b.

(Vol. 4. p. 36. pone Amyridem Opobalsamum.)


Pharm. TACAMAHACAE *Gummi.*

Fagara octandra; foliolis tomentosis LINN. *Mant. pl.* p. 40. Elaphrium tomentosum JACQU. *Hist. pl.* p. 105. *tab.* 71. *fig.* 1 - 3. Arbor in Curaçao Americes habitans; item in insula Franciae (SONNERAT *Voyage aux Indes orient.* tom. 2. p. 27.).

Olim (*Appar. medic.* vol. 1. p. 50.) suadente LINNEO (*Mat. med.* p. 215.) Populo balsamiferae gummi hocce sic dictum adscripsi. Iam ex plurium consensu refero ad arborem præfixam. Huic tribuit eandem JACQUINUS (LINN. *Diff. Observ. in Mat. med.* p. 7.); assentitur BERGIUS (*M. m.* p. 71.). Nec ullibi legitur, ex gemmis arboris resinam originem trahere, sed vel sponte vel inciso cortice exsudare .

Quam

Quam inique autem eiusmodi mala rheumatica chronica, qualia (*loc. cit.*) recensui, suffragiis varii generis tractentur, crebra experientia edocat, ut qua ipsa saepe stasis vel pertinacior evadit, et loco exoptatae discussionis in abscessus et fistulas sive gangraenam transit, vel materia stagnans ad interiora repellitur, unde ossa vicina exostosi vel carie vitiantur, vel haemoptysis, asthma, colici dolores aliaeque viscerum internorum iniuriae emergunt.



S W I E T E N I A .

LINN. *Syst. veg.* p. 332. *Gen. pl.* p. 209.

431. b.

(Vol. 4. p. 58. ante *Aesculum.*)

Pharm. SWIETENIAE *Cortex.*

Swietenia Mahagoni; LINN. *Spec. pl.* p. 548. JACQUIN *select. stirp. americ. Hist.* p. 127. *Swietenia* foliis abrupte pinnatis pinnulis ovato lanceolatis obliquis: floribus ramosis (racemosi dicantur) minimis CAVANILL. *Diff. bot.* 7. p. 365. tab. 209. *Cedrela* foliis pinnatis floribus sparsis ligno graviore BROWNE'S *Nat. Hist. of Jam.* p. 158. Arbor foliis pinnatis nullo impari, nervo ad latus etc. CATESBY'S *Nat. Hist. of Carol.* vol. 2. p. 81. Arbor in insulis Caribaeis maioribus spontanea. Proccera, habitus ob comam amplam elegantemque spectabilis, et ob lignum nitidum magni habitum. Digna nomine, quod JACQUINUS in memoriam viri, commendatione et consiliis de re herbaria quoque meritissimi, illi impertiit, digna grato JACQUINI animo et eiusdem sensu pulchri.

Lignum


Lignum eius rubro brunum, durum, polituræ obsequens; hinc in America non solum, sed et in Europa reliquis lignis pro suppellectili varia palmam fere praeripit. Quoniam aqua aegrius corrumpitur nec facile a vermibus consumitur, pro navibus illud eligunt, ob pondus vero insigne nonnisi pro earum inferiori parte adhiberi potest, pro superiori levius lignum eligitur. Cavendum solleter, ne substituaturs aliud simile lignum sub eiusdem nomine, ut a fabris lignariis in Germania saepe fit, e. c. ex *Cedrela odorata* L. quae pallidius lignum praebet, ex *Mimosis* variis.

Corticis vero hic nominatim res agitur; nam non ad lignum, ut perperam a peregrinatore Londino ad nos praescriptum, sed ad corticem vires medicae pertinent. Hic in trunco extrinsecus asper describitur et brunus, in ramis et surculis griseus et laevior. Quae liberalitati cl. WRIGHT debeo numerosa specimina, videntur deglubita de trunco esse vel saltim a ramis maioribus. Nempe plano convexa sunt, pedem circiter longa, a tegmine spongioso, extimo plurimam partem cultro liberata, rubicundo bruna, texturae lamellosae, tenacis, lineam circiter crassa. Siccatus cortex sapore adstringente et amaro refert corticem Peruvianum, sed amarior est. Deficiente hoc ipso pulvis corticis Swieteniae procurandis febribus intermittentibus commode surrogatur (WRIGHT in *Lond. med. Journ.* 1787. p. 287.). Probo successu in Jamaica id

factum est (LIND *on the Diseas. in hot. climates* p. 308. WILSON'S *litt. ad cel. LODER* in SAUNDERS *Beob. über die rothe Peruv. Rinde*). Nempe apyrexiae tempore eadem norma, qua Chinchina capitur, nec obstructions viscerum vel ulla alia mala sequela inde metuenda est (LAUDER, Chirurgus olim ad classem Jamaic. in *litt. citt.*). Iterarunt quoque eandem medelam Londini. Significatur in fidem rei nomen cl. BAKER (MICHAELIS in RICHT. *chir. Bibl. vol. 5. p. 530.*). Accesserunt alia experimenta aequae felicia cl. WILSON, SHELDON, FREAKE; quibus elucet, quatuor aegris in dolore capitis periodico opem tulisse, et unum a febre tertiana liberasse (WILSON). In sano corpore neque pulvis nec decoctum nec infusum nec extractum vel minimum molestiae excitavit (ID.). Ampla drachmae unius dosi taedium facile aegro parit, sed iam ex paucis tam magnis effectus expectatus redundavit, sensim declinante paroxysmo.

Fraude pluries Swieteniae cortex a venditoribus Peruviano admixtus est (LIND *l. c.*).

Haecce novisse iuvat, donec per iterata tentamina de pretio eius certiores reddamur.



? M Y R I S T I C A.

SWARTZ *Prodr. veget. Ind. occid.* 1788. p. 96.
 THUNBERG *Diff. Nov. gen. pl. P.* 5. p. 83.
 EJUSD. *Diff. de Myristica moschata* 1789.
 DE JUSSIEU *Gen. plant.* p. 81.

483. b.

(Vol. 4. p. 401. ante Winteram.)

Pharm. NUX (potius nucleus) MO-
 SCHATA s. MYRISTICA.
 MACIS.

Myristica aromatica; foliis ellipticis subtus
 pubescentibus, calycibus ovatis, fructibus lae-
 vibus SWARTZ *l. c.* qui ad Monadelphiam
 Triandriam refert, flores tamen dioicos agno-
 scens. Copia illi facta flores ex insula Banda
 et Isle de France allatos examinandi ad exem-
 pla multa, quae intra spiritum vini in museo
 ill. JOS. BANKS servantur. *Myristica moscha-*
ta foliis lanceolatis fructu glabro THUNBERG
 in *Vet. Acad. Handl.* 1782. p. 49. et *Monogr.*
cit., qui monoicam facit. Descripsit florem et
 fructum ex partibus spiritui vini inditis, ut
 tamen et novum lumen de floribus a posteris
 I 4 exspe.

exspectet. Nooten. Moskaat Boom ex speciminibus, spiritui vini immerfis HOUTTUYN et SWAGERMAN in *Verhand. door de Hollandsche Maatschappij der Weetens. to Harlem vol. 26. p. 222.* ubi gynandra declaratur cum *tab. florem* repraesentante. Hisce varii errores in LINN. *Suppl. pl. p. 40. 265. Syst. veg. ed. 14. p. 493.* corriguntur. Ne in novos incidam, omitto Le Muscadier SONNERAT, cui icosandra monogyna videtur, in *Voyage a la nouvelle Guinée p. 194. sq. tab. 116.* ubi ramus cum fructu absque flore, qui nec describitur, et *tab. 117. 118. fig. 1. 2.* Nux myristica, Pala RUMPH. *Herb. Amb. vol. 2. p. 14. tab. 4.* Arbor magnitudine Pyri vel ultra, in insulis moluccanis spontanea, hodie praecipue in Banda et tribus exiguis eius ditionis insulis, nimirum Neyra, Lantoer et Pulo ay colitur. In reliquis Moluccis ex pacto cum incolis insularum inito cultus Myristicae negligitur, prout rursus Bandenses nullos Caryophyllos colunt. Neyraschenfes nuces optimae sunt; Pulo-ay autem maximas et elegantissimas arbores producit.

Excludere ex systematibus oportuerat arborem ob ignorationem floris ad novissima usque tempora. Attamen discrimina characterum, quae adhuc supersunt, testantur, scrutinium eius in loco natali nondum superfluum esse. Species verae plures quum serius detectae fuerint (THUNBERG *l. c.* SWARTZ *l. c.*): difficile diiudicatur, an Myristicae, alibi visae, sint praedicta aromatica, nec ne. Ita Capita-
neus

neus FOREST (*Voyage to new Guinea* 1779. p. 108.) in insula Manafwary septentrionem versus a nova Guinea sita Myristicam se detexisse narrat. In insula parva a littore australi Novae Guineae haud procul remota cl. COOK arbores pro veris habitas detexit, quarum duodecim arbusculas in insulam Otaheite transplantavit (*London Magazin* 1780. p. 307.). Quae in Pulo Candor crescunt arbores, harum fructus carent sapore et odore (Ita quidem ab anonymo auctore libri *Journal of Captain COOK'S last voyage* 1781. Vers. germ. p. 355.). Sed tacet omnino de hocce invento cl. navarchus KING in vol. 3. itinerarii *Voyage to the pacific ocean*, Lond. 1785. In ipsa insula Nova Guinea apud nationem Papoux vidit cl. SONNERAT (*Voyage à la nouvelle Guinée*, p. 194. sq.) duas Myristicae varietates, aromate praeditas, quarum una fructum et nucem gerit sphaericam (Myristica mas dicta), altera fructum et nucem oblongam (Myristica foemina), item tertiam fructu extus rugoso, magnitudine ovi gallinacei, nuce minori et graciliori absque aromate. — Praeter M. aromaticam in India nonnunquam usurpata *M. tomentosa*; foliis ovatis fructu tomentoso THUNB. *Diff. cit.* p. 4. Nux myristica mas, Pala Lacki-Lacki RUMPH. l. c. p. 24. tab. 5.

Propagandi sese auxilium arbori afferunt columbae, quae nuces deglutitas consumpta modo Macide et pulpa integras per alvum deiciunt (RUMPH. l. c. p. 20.). Avi quoque

que paradisiacae in deliciis est, quae vero inde inebriatur et mortua decidit, quibus factis formicae adrepunt et pedes consumunt. In insula Tanna maris australis vidit cl. FORSTER (*Observations during a Voyage round the world* p. 171.) nucem suo tegmine inclusam in columba sclopeto transfixa, sed magis oblongam et inodoram. Ast aequè certum est, Belgas fructus integros ferere, et arbusculas inde enatas transponere commodis stationibus. Hae montosis locis praecipue delectantur, et umbroso et contra ventos muniente aliarum arborum tegmine. Fructus anno quinto vel sexto ferre incipiunt, octavo autem vel nono uberimam messem concedunt. Haec fit, dum ad maturitatem pervenerunt, quam praesto esse cognoscitur colore epidermidis rufescente et fissuras agente. Tum arbores conscendunt, fructus longis hamis attrahunt et avulsos in terram proiciunt. Messis vero ter quotannis fit ob diversum florendi tempus, novem vero menses pro maturatione requiruntur. Lucrum mercaturae nucum myristicarum inde ab a. 1621. quo tota ista regio in foederati Belgii provinciam redacta fuit, in manibus Belgarum fuit. Ast diu Gal'o-Franci, invidi tanti thesauri, lucrum hoc in suas partes trahere allaborarunt. Fructus, quos a. 1768. ex insulis Philippinis in insulam Franciae adferri, adiutore cl. PROVOST, curarunt, tertiam a me commemoratam varietatem fuisse, cl. SONNERAT *l. c.* p. 196.) existimat. Sed dein in ipsas Moluccanas instituerunt expeditiones suas, rem consi-

liis

liis promovente cl. POIVRE (Vid. *Notice sur la Vie de Mr. POIVRE in Gött. Anz.* 1787. p. 477.), primum a. 1770., ex qua vero plurimam partem nuces spurias h. e. magnas oblongas, quales in Manilla occurrunt, exigui odoris reportarunt, quum genuinae sint parvae et rotundae; harum quidem quinta modo pars translata. Altera expeditio a. 1771. felicior, quum in hac ex iudicio commodorum arbitrorum participes verarum facti fuerint (LE GENTIL *Voyage dans les mers de l'inde*, tom. 6. p. 688.). Translatio autem in insulas Isle de France, Bourbon et Seichelles facta est, et successus testimonium dedit academia scientiarum Parisiensis *Mem. de l'Acad. de sc. de Paris* 1772. P. I. p. 56.).

Fructus drupa est, pyriformis, sulco longitudinali notata, magnitudine fere Persicae fructus. Extima eius pellicula in hac specie glabra est, initio laete virens, maturescendo gilva. Dehiscit sensim una cum carne substrata, quam vestit, albicante, duriuscula, attamen succo tenui repleta; tumque in conspectum venit membrana pulposa subpinguis chermesini coloris in lacinias lineares ramosas fissas, quae MACIS vocatur. Male igitur in plerisque linguis Europaeis haec membrana floris nomine venit e. c. Muskotblomma, Fleur de Muscade. Haec immediate cingit nucem, cuius putamen nigrum sine pedunculo obverso obtusum est, altero instructum acumine exiguo. Inter hoc, quod tenuius nonnihil est cortice
nucis

nucis avellanae, latet nucleus subrotundus pallide cinereo brunus, reticulate rugosus, utrinque obtusus, qui ex parenchymate carnosio pingui consistit, ex acu infixâ oleum emittente. Atque haec ipsa pars in vita communis nux moschata s. myristica audit, *nucleus* maiori iure dicenda. Figuras elegantes omnium harum partium praestitit cl. GAERTNER (*de fructibus et seminibus plant. tab. 41. c. explicatione p. 194.*). Sponte patet descriptionem a me dictam ad recentem fructum pertinere.

Transmittitur vero ad nos unice nucleus, qui ficcus subdurus est, cultro facile discinditur, interne flavescens venis fuscis; et Macis, quae siccatione luteo sanguineum colorem adipiscitur. Fructibus collectis cultro extimum putamen auferitur et in sylvis, ut putrescat, relinquitur. Domi Macis primum separatur caute, et sole super quadratis receptaculis extractis siccat; tum ipsae nucs per tres dies solis ope siccantur; quidam in eundem finem in aedibus per mensis spatium super tabulatis easdem exponunt. Ita luridae factae fustibus vel saxo supervolvendo contunduntur, quo putamen frangatur. Sequitur tum nucleorum dispartitio in tres cumulos; quorum primus maximos et optimos in Europam transmittendos complectitur, alter viliores, in Indiis consumendos, tertius minores et vilissimos, oleo eliciendo potissimum destinatos. Nucleis libratis emptor eos intra corbulos in cupam
aqua

aqua calcis repletam bis vel ter immergit, quo a putredine muniantur, tumque in promptuariis in acervum excutiuntur.

Macis vero ficcata aqua marina conspergitur, ne ob fragilem naturam comminuatur in exigua frustula, vel quod probabilius, ut putredo et insecta arceantur; tum ponderatur et sacco inditur ad libras usque 161., pedibus firmiter compingendo, alioque sacco prior obvelatur, ut in Belgium transmitti queat.

Cultum vel messis et confarcinationis rationem penitus cognoscendi avidius prolixiori rerum omnium enarratione satisfaciunt RUMPHIUS (*l. c.*), et testes digniores forsitan adhuc fide, commissarii iurati BOUDENIUS et HAUPTIUS (in VALENTINI *Hist. simpl. p. 461. sq.*), qui ex inquisitione in Banda ipsa facta a. 1682. rationem omnium momentorum reddunt, et calculis per decennia subductis lucrum insigne, in societatem istam ex nucleis et macide redundans describunt.

Olim distinguebatur sedulo inter *nucem moschatam marem*, sive spuriam, quae specie altera longe maior, oblongo rotunda erat, nullius vel exigui modo saporis et odoris, ex Malabaria (Panem Palka RHEED. *Hort. Malab. tom. 4. p. 9. tab. 5.*); et *foeminam*, quae nostra est: hodie haec unice in usum trahitur, et ridemus sexuale nomen.

Odor

Odor *nuclei* noviter dissecti vel rasi grate fragrans, sapor aromaticus subpinguis, linguam blande pungens et os grato calore replens. Destillatione cum aqua, praevia digestionem, prodit cohobatione aqua lactea simulque oleum subflavum in superficie aquae residens, una cum glebulis albidis, quae non camphora sunt, sed oleum congelatum (GAUB. *Advers.* p. 37. sq.). Oleum istud aethereum $\frac{1}{2}$, secundum CARTHEUSERUM, $\frac{1}{2}$ secundum NEUGANNUM (Chem. vol. 2. P. 3. p. 431.), $\frac{1}{16}$ autem secundum SPIELMANNUM (M. m. p. 282.) constituit. Praeter hoc autem largior longe copia olei unguinosi in nucleis residet, scilicet ultra $\frac{1}{4}$ (NEUMANN), vel $\frac{2}{8}$ (CARTHEUS.), vel $\frac{1}{2}$ (SPIELMANN.); et hoc quidem expressione eruitur et densitatem butyri habet, unde maiori iure butyrum nucis moschatae diceretur, quam, ut vulgo fit, oleum nucistae. Estque hoc unctuosum, opacum, albo rubellum, odoris saporisque aromatici, sed levioris comprehendens tam volatiles partes odoras et sapidas, quam sebaceas, inodoras, insipidas (Vid. GAUB. l. c. p. 42.), haeque instar vehiculi sunt priorum. Spiritus vini solvit $\frac{1}{4}$ (NEUM l. c. p. 432.), quippe hoc pondus extractum spirituosum efficit, quod linguam et nares efficaciter ferit. Aqua rursus extracti pr. $\frac{1}{8}$ reddit odore saporeque omnino carentis. Sponte igitur elucet, quale menstruum eligas. Partes terrae supra tertiam partem constituunt.

Macis

Macis olei aetherei odorati $\frac{1}{4}$; et olei unguinosi bruni odoratissimi, unguenti consistentiae $\frac{1}{8}$ exhibuit (SPIELMANN.); extracti aquosi pr. $\frac{1}{4}$, spirituosi pr. autem plus (NEUM. l. c. p. 437.), scil. eius uncias quatuor et dimidiam ex libra civili macidis .

Inter veteres medicos nuclei primam mentionem Arabes iniecerunt, et inter hasce AVICENNA. Hodie et ille et *Macis* condimentum vulgare in cibis ditiorum sunt. *Macis* magis aromatica est. Atque sic omne aromatum meritum in palato grate stimulando et viribus digestionis ventriculi sollicitandis continent. Saccharo condire fructus nondum maturos Belgae in India solent; item muria condire encheiresi et faciliori et minus pretioso (RUMPH. l. c. p. 22.). Saccharo conditi solent etiam in Europam transferri, ut delicias secundae mensae ditiorum augeant; licet nec suo commodo careant in stomacho roborando .

Ob calidam naturam nonnisi in chronicis quibusdam morbis admitti dictae istae partes possunt; et nucleorum praecipue ratio habetur. Non pugnat contra nucleos, quod largius ingesti vertiginem, deliria, pectoris oppressionem, mortem attulerint, quum omne nimium in vitium vertatur. Dictorum incommodorum exempla varia recenset RUMPHIUS (l. c. p. 21. sq.), delirii nominatim LOBELIUS (Obs. 570.), et una cum hoc stuporis, somnolentiae aliorumque vitiiati systematis nervosi symptomata.

ptomatum SCHMID (in *Misc. n. curios. Dec. 2. ann. 2. p. 278.*) et CULLEN (*Treatise of the Mat. med. vol. 2. pag. 204.*). Vaporum arboris effectus noxii in iis, qui sub ea pernoctantur, tamen suspicionem latentis in arbore veneni movent. Ventriculum et intestina relaxata egregie roborat, et flatus inde collectos dissipat, vomitus quoque ex sensilitate nimia enatos compescit. Praesertim alvi profluvia, diarrhoeam nimiam et dysenteriam stimulo prius eiectione coërcet. Augetur haecce vis rosthione nucleorum, quae olim magis, quam hodie, in usu fuit. Rarius sola nuclei aliqua portio exhibetur, quam in miscela commoda, vel in praeparatorum iam recensendorum aliquo genere, quorum quaedam, nonnisi extrinsecus adhibentur, In reliquis aemulatur aliorum aromatum virtutes, modo memineris, multum unguinosi reconditum habere.

Macidis vires suppare, cuius tamen oleum aethereum magis volatile et nonnihil acrius.

PRAEPARATA ET COMPOSITA.

Oleum Destillatum nucis mofchatae *Ph. omn.* Vide de natura et praeparatione supra dicta. Ad paucas guttulas contra affectiones primarum viarum dictas instar Elaeosacchari capi potest. Abdomini quoque inungitur, et partibus paralyticis.

Oleum

Oleum Expressum nucis moschatae *Ph. omn. e. c. Ph. Würt. p. 126.* Ex contusis nucleis et per vapores aquae emollitis. De hoc quoque ad partem supra dictum. Transmittitur ex India plerumque in urceis terreis, et molle et fragrantius est, coloris lutei. Aliud solidas massas refert, plerumque planas et quadratas, odoris debilioris et coloris pallidioris, idque ex Belgio petitur. Saepe corrumpitur spermate ceti, scilicet contunduntur nuclei ruditer, admiscetur sperma ceti et digestis iis exprimitur pingue (FERBER *n. mineral. Beytr. vol. 1. p. 336.*). Externe unice in torminibus, vomitu, alvi fluxu, abdomini illinitur, et linimentis unguentisque nervinis stomachicis additur. Balsamis odoris saepe quasi fundamentum praebet, a quo reliqua recipiuntur.

Balsamus nucistae *Ph. W. p. 30.* Paratur ex combinatione utriusque dictorum oleorum. Usus externus in iisdem affectionibus.

Oleum destillatum macidis *Ph. omn.* Vid. supra. In vetusto generantur crystalli pellucidae flavescentes, saccharo cando similes, ardentes flammae candelae admotae; spiritu vini, oleo terebinthinae et amygdalarum nonnisi praevia ebullitione solubiles, sed refrigerio rursus menstruum reliquentes; aquae ebullientis nonnisi magna quantitate solubiles (WIEGLEB in *not. ad VOGELS Lehrsätze der Chemie p. 221.*).


Vol. VI.

K

Aqua

Aqua melissae spirituosae *Ph. Würt.* p. 20. Aqua carminativa spirituosae *l. c.* p. 11. Aqua anhaltina *l. c.* p. 8. Aqua mastichina *l. c.* p. 19. Elixir balsamicum spirituosum HOFFM *l. c.* p. 53. Elixir vitrioli mynsichti *l. c.* p. 58. Emplastrum de crusta panis *l. c.* p. 61. etc. nucem moschatam continent; species imperatois *l. c.* p. 178. etiam Macidem. — Olea alterutius occurrunt in balsamo stomachico *Ph. W.* p. 31. Balsamo succini *l. c.*

Taedet vel titulos transcribere omnium et singularum formularum, Germanorum dispensatoriis insertarum, a quarum usu iam multitudine receptorum absterremur.



B.

PARTES VEGETABILES.

Ignoti generis vel speciei.

I. RADICES.

I.

Pharm. CALAGUALAE s. CALAGUELLAE *Radix.*

Radix Americam meridionalem et nominatim ditionem regni Peruviani Quito patriam habet. Praeter Indos apud Italos celebritatem nostro tempore obtinuit. De stirpe ipsa hactenus modo rescivimus, quod folia gerat, Asplenii Scolopendrii foliis similia, sed minora, et filicis species sit, quantum ex descriptione obscura colligi potest, Polypodii generi associanda.

K 2

Ra

Radix genuina (quam hactenus non vidi) nodosa est , qualis in Polypodio vulgari vel Osmunda regali , saporis expers . Et haec quidem unice efficax ; nam cavendum , ne confundatur cum duabus aliis inertibus ; quarum una dicta Calagualae foeminae radix foliis largissimis instructa , et seminibus , ut fertur , destituta ; alia Calagualae spuriae nomine venit , ex lucro aliquando substituta (V. *Della radice di Calaguala Lettera del Sig. Dott. DOMENICO LUIGI GELMETTI al chiar. Sig. Dott. Giammaria Mazzi*, quae epistola inserta legitur in *Giornali della Medicina*, tom. 5. p. 409. sq. et BRUGNATELLI *Biblioteca fisica d' Europa*, P. 5. p. 135. sq.).

Prima eius , quoad sciam , mentio fit in diario medico Londinensi (*Lond. med. Journal. vol. 5. ex recens. MICHAEL. Bibl. vol. 1. p. 186.*) ubi posterior nominis scriptio obtinet et Romae contra hydropem usurpatam radicem fuisse , optimo successu traditur . Reliqua clarissimo GELMETTI debentur . Indi decocto radice in pleuritide , contusionibus et apostemate interno utuntur . Hisce cognitis prima experimenta Mantuae capta . Quatuor exemplis per partes expositis in Italia , duce viro cl. dicto , salutarem effectum praestitit . Unum spectat ad affectiones varias pectoris ex contusione molestas et chronicas ; alterum ad febrem hecticam ex pleuritide ; tertium ad pleuritidem diram ; quartum ad colicam convulsivam cum febre , vomitu bilioso et obstructione alvina .

Con-

Conficitur ex dictis, vim aperientem attenuantem, resolventem illi inesse. Ratio autem radicem exhibendi in decocto est, parato ex radicis drachmis duabus et aquae communis quantum satis, sive libra sesquialtera ad tertiae vel quartae partis consumptionem coctis. Et huius quidem cyathi aliquot instar Theae bibuntur. Unde diuresis copiosa absque ardore tamen vel dolore in viis urinariis.

Certiora iam exspectamus ex commentatione extra Italiam haecenus non dispertita, quam cl. CARMINATI de radice Calagualae novissime Ticini regii edidit, in qua, tam propria quam ill. FRANCK (*Litt. Eiusd.* ad me 1791. verna) experientia suffultus inertiam huius radicis demonstrare narratur.



2.

Pharm. CASSUMNIAR. s. CASUMUNAR, s. RISAGON, s. BENGALÉ *Radix*.


Nomina tria priora fictitia sunt ad celandam stirpem, quarto autem sive Bengale in India innotescit (RALL *Hist. plant. tom. 3. p. 649.*). Nempe ex India orientali transfertur.

Radix comparet divisa in varia segmenta, mox secundum longitudinem, mox transversim in orbiculos, qui diametro circiter digitum aequante et a linea ad pollicem crassi sunt. Adhaeret parenchymati interno, pallidiori, albido flavo, cortex nodosus, hinc inde circulis horizontalibus distinctus, cinereo flavus. Decennio septimo praeteriti seculi in Angliam pervenit, et commentatiuncula de eius virtutibus tum typis impressa ad commendationem multum tunc temporis contulit medicus PEACHY, qui nomen Cassumuniar illi dedit (SLOANE in *Phil. Transf. n. 264. p. 580.*), aliisque MARLOW (DALE *Pharmacolog. p. 276.*) focius indicatur. Cel. MEAD quoque illi multum tribuit (QUINCY *Pharm. p. 84.*). Hinc diu in *Pharmacopoea Lond. et Edinburg.* locum obtinuit, exclusa tamen in novissimis.

Sa-

Sapore proxime ad Zedoariam vulgarem venit, amaricante et aromatico, ut et sensum camphoraceum linguae imprimat; ideo forsitan illi adscriptum fuit a DALEO aliisque nomen Zedoariae radice lutea ex BREYNIO (*Prodr.* 2. p. 207.), qui tamen de stirpe ipsa nihil certi constituit. Odor fragrans Zingiberis. Spiritus vini vires maxime evoluit indeque ascsit colorem profunde croceum, prout ipsum extractum inspissando tincturam. Hoc gratam amaritiem et calorem constantiorem gustanti impertit.

Stomachicam vim inesse radici, quilibet facile dabit. Praeco qui eius olim fuit, cl. PEACHY extulit eam, ut solent alii similes medicamentorum laudatores, in morbis multiplicis diversitatis, in apoplexia, paralyfi, vertigine, motibus convulsivis, affectionibus hysteriis, torminibus (RAIUS *loc. cit.*). Sed, post cognitam naturam remedii cuiusdam, sanior pathologia optime docet, quando illud proficiat, quando noceat. Corrigi corticem Peruvianum eius ope idem venditavit (*l. c.*): sed nihil ille cortex mali continet, si a scito medico administratur.



3.

Pharm. CHYNLEN Radix.

Ex China attulit illam peritissimus in arte sua et scientia physices et historiae naturalis pariter inclytus navarchus Svecicus EKEBERG et cel. BERGIUM (*Mat. med. p. 908.*) de usu medico ibidem obvio certiore reddidit. Nec alios fontes haecenus adire licet notitiae eius cupidis.

Radix describitur cylindrica, subtoruloso flexuosa, crassitie pennae anserinae vel angustiori rugosa, subsquamata fetis subulatis frequenter exasperata, fragilis ex luteo rubra. Prostat frustulis pollicem vel ultra longis.

Odore caret, sed sapore valde amaro et tenaci instruitur, salivam tingit colore croceo. Chinenses magno eam pretio vendunt, eiusque stomachicam virtutem praecipue depraedicant, quam infusione radice cum vino sibi in usum vertunt in colica, concoctione ciborum labefactata similibusque vitiis. Confirmat egregiam efficaciam ex sua experientia cl. BERGIUS, qui tamen quibusdam emesin excitasse observavit.

4.

Pharm. COLUMBO, aliis CALOMBAE, COLOMBAE, COLUMBAE, CALUMBAE *Radix*.

Primus, qui radicis Calumbae, ut eam nominat, quantum novi, meminit FRANCISCUS REDI (*Experimenta circa varias res naturales* 1685. p. 142.) est, qui ad nova experimenta cum eadem excitat et alexipharmaci maximi laude distinctam significat, absque alia ulla de ista commemoratione. Eodem forsitan tempore JO. CURVUS SEMMEDUS (*Pugill. rer. indic. s. Hist. varior. simpl. ex Ind. orient. Amer. Vers.* VATERI 1722. p. 37. Quando archetypus prodierit lingua Lusitanica nescio, auctor vero alium librum iam edidit a. 1697.) eam memorat, qui licet plurimis virtutibus eam ornet, quam sobrio iudicio respondent, laudat tamen etiam in affectionibus vero magis consentaneis, ut doloribus colicis, contra pravas digestionem ventriculi, in diarrhoea, in flatulentia. Arbitror utrumque significasse eandem, quae, recentius Anglorum praecipue praeconio, apparatus medicaminum auxit.

Quan-

Quantum haecenus erui potuit, ex testibus idoneis, qui diu in India orientali versati sunt, stirps in continente Asiae parte crescit, et inde in urbem Columbo insulae Zeylonae transplantata est, unde per totam iam Indiam dispergitur. Memorabile est, quod horum unus indicaverit in Zeylona et Anglicis coloniis lingua Lusitanica *Rays de Mosambique* vocari (PERCIVAL'S *Essays medical and experimental. vol. 2. p. 3. sq.*). Respicit hoc nomen aliam, quam Asiaticam patriam, scilicet Africanam. Cognitum enim recentius est, radicem a Lusitanis e Mozambique Tranquebariam adduci, ibi a Caffris in continenti emptam proflare et mercem lucrosam esse (KÖNIG litt. in RETZ. *Obs. bot. fasc. 4. p. 5.*).

Iusta fuisset expectatio, fore, ut radix per Belgas potius priusque, ut in quorum possessione urbs Columbo est, quam per Anglos in medicorum notitiam venisset. Ast in Anglia iam per quinquaginta circiter annos cognita et passim usitata fuit (WHITE'S *Treatise on the management of pregnant and lying in Women, ed. 2. p. 75.*). Ab eo autem tempore imprimis celebrata in nostra Europa est, quo cl. PERCIVAL experimentorum ingeniosorum cum ea captorum recensum evulgaret (*Lib. cit.*, cuius primum caput inscribitur: *On the Columbo Root.*), adeo ut iam in recentissimis designationibus pharmaceuticis tantum non omnibus, iis adeo, qui selectu rigidiori delectantur, ut *Pharm. Lond. Edinb. Rossica* locum ob.

obtineat, et in quolibet lautiori pharmacopolio iam obviam veniat.

Radix transfertur dissecta vel in orbiculos, qui pollicem dimidium ad tres diametro aequant, vel in frusta quartam pollicis partem ad duos usque pollices longa. Extrinsecus vestitur sub hacce forma cortice rugoso, crasso, ex viridi profundius bruno. Interna pars pallide flava est et medio contrahitur, ita ut intra tumidum marginem concavitatem formet rugosam centro, ut videtur siccationis adjuvandae causa, perforato. Discerni oculis in orbiculis facile possunt tria strata, cortex, pars lignea et medulla, quae ipsa blandior est reliquis et masticata copiam mucilaginis effert. In pulverem redacta viridescentem colorem induit et humiditatem attrahit. Fricta cultro aroma spirat, gustata ingrate amara at modice pungens sentitur. Sapor ingratus corrigitur additamento corticis Aurantiorum in utriusque infusione (PERCIVAL *l. c. exper. 2. p. 20.*).

In putredine carnis bovinae arcenda Radix haec cortice Peruviano inferior est (*l. c. exper. 4. p. 22.*), etsi omnino in infuso radicis caro diutius illaesa persistat, quam in mera aqua. In corrigenda putredine iam enata cedere quoque cortici dicto debet (*l. c. exper. 5.*). Felli bovino autem putredine corrupto illico integritatem restituit, quum contra ea infusum corticis Peruviani foetorem manifeste auget et coagulum illi inferret (*l. c. exp. 6.*).

6.). Euntes adhibita bile recente hominis violenta morte absumpti in foetore corrigendo idem fuit BERTRAND DE LA GRESIE in *Hist. de la Soc. de Med. tom. 2. p. 293.*). Elegans inde conclusio deduci potest ad efficaciam illustrandam, quam in cholera aliisque malis abundantia et depravatione bilis copulata praestat, de quibus infra uberius, et ad salutarem usum huius medicinae, etiamsi evacuationes necessariae non praecesserint. Simul elucet, cur in eiusmodi morbis cortex minus salutaris censendus sit. Addendum tamen magni viri ill. CULLEN (*Treatise on the Mat. med. vol. 2. p. 78.*) dubium, an vere specificam virtutem in bilem exserat. In fermentatione et acore ciborum coercenda radicem valere cognoscitur mixtura ex mica panis, carne vervecina assata et iusculo radicis Columbo parata, quae ipsa ne post decimum quidem diem acorem manifestavit, quum contra miscela, in qua omissa erat radix, fermentationem subiret post duodecim horas et post quadraginta octo horas acorem contraheret (PERCIVAL *l. c. exp. 8.*). Arteriae ictus non auget ore capta, ut igitur non amaris calefacientibus annumerari possit, nec hecticis et phthisicis, quando amara ventriculus labefactatus requirit, noceat (*l. c. exp. 10.*).

Destillatio radicis cum aqua nullum olei vestigium prodit, attamen debilem saporem balsamicum habet et odorem quasi ex Cumino (CARTHEUS. *Diff. de radice Colomba 1773. recus.*

recus. in EJUSD. *Diff. phys. chym. med. p.* 149.). Ex radicis uncia una, digesta cum aqua sufficiente, infusum subfuscum redundat valde amarum et blanda evaporatione extracti drachma una cum granis viginti quatuor, quod ipsum valde amarum, sed odoris descripti debilis. Tinctura cum spiritu vini facta saturate flava odoris balsamici grati, ad moschum vel Hyacinthum accedentis, et saporis intense amari; extracti spirituosii primi grana modo viginti quatuor ex uncia radicis evolvuntur (CARTHEUS. *l. c.*). Vinum cum radice digestum mediocriter amarum est. Extractum ex spiritu vini et ex aqua iunctim moderatioris ignis ope ad iudicium narium et linguae virtute non cedit pulveri radicis ipsius; quod et ipsa administratio in aegris confirmat, nisi extractum praestantius habendum sit (PERCIVAL *l. c. p.* 22.). Minutiae sub hisce experimentis obviae, vel alia remotioris usus sunt aliunde petenda (ex CARTHEUS. *Diff. cit. et Hist. de la soc. de med. de Paris, tom. 3. p.* 243. *sq.* auctore pharmacopœla JOSSE.). Id tamen ex hisce consequitur, quod odoraë partes, licet in reliquis primaria vix resideat, avidius a spiritu vini, quam aqua excipiantur, et gummosarum plus quam resinosa radici insit. Infusum radicis aquosum celerius corruptelam init, quam illud reliquorum amarorum, nam intra nychthemeron sedimentum in eo apparet copiosum et intra biduum viscosum et vapidum evasit (PERCIVAL *l. c. p.* 20.).

Ab Indis iam dudum eximium remedium in affectionibus variis ventriculi et intestinorum habita radix fuit. Subscribit recentior experientia, quae et in bilis vitiis corrigendis excellere docet. Indi radicem concisam vel rasam cum vino Maderaico ingerunt (PERCIVAL *l. c. p. 4.*).

Ad coërcenda alvi profluvia effrena et vomitus pertinaces sedandos magni nominis est. In dysenteria tam apud Anglos (PRINGLE in GAUB. *Advers.* PERCIVAL.) quam Batavos multum valuit (CARTHEUS. *l. c. p. 142.*), nec in Gallia spem fecellit (BERTRAND DE LA GRESIE *l. c. tom. 1. Hist. p. 344. tom. 2. p. 292.*). Imo iam initio diarrhoeae vel dysenteriae, quo adstringentia nocunt, haec radix et cum fructu praecipitur, et tum antispasmodicam virtutem exserere videtur, quum constet multas turbas nonnisi irregularibus primarum viarum motibus excitari; declinante tamen morbo convenientior est (PERCIVAL *l. c. p. 8.*). — Nauseae et vomitui gravidarum (WHITE *l. c. p. 75.* PERCIVAL *l. c. p. 13.*) et puerperarum egregie subvenit; in hisce febre puerperali existente ob vim bilem vitiatam et exundantem temperandi confert ad scrupulum vel drachmam dimidiam in pulvere, vel in extracto, vel in infuso ter vel quater de die data; tantoque magis conducit, si simul alvus nimium fluxa est (Conf. VERRYST in *Verhandel. door de Hollandsche Maatschappye der Weet. te Haarlem, P. 21. p. 6.*). Vomitus

tus, qui biliosam colicam comitatur, prae-
vio emetico huius radice infusi compescitur (PER-
CIVAL *l. c. p. 8.*). Nec infantili aetati ad-
versa est, quae saepe sub dentitione vomitu et
diarrhoea tentatur; hosque tanto felicius iuvat,
si ad acidum frangendum cum pauxillo creatae
vel magnesia iungitur (*l. c. p. 11.*). Imo in
habituali vomitu, si a debilitate vel nimia ir-
ritabilitate ventriculi, acore, bili acri, secre-
tione vel iusto uberiori vel depravata succi
pancreatici, enascitur in connubio aromatum,
martialium vel absorbentium levamen insigne
affert (*l. c. p. 12.*). Supprimat quoque in
intermittentibus febribus autumnalibus vom-
itum, quo frequenter stipantur; et si cortex
Peruvianus ob emesin crebram inanis est, opii
vices in delendo vitioso isto ventriculi sensu
agit (VERRYST *l. c.*). Queritur tamen CUL-
LEN (*Treatise of the Mat. med. vol. 2. p. 78.*),
licet multis medelam vomitus attulerit, haud
paucos tamen spe excidisse; quin iis casibus,
in quibus redundantia bilis subfuit. - Cholerae
obicem ponere, saepe exploratum est, et in
hac simul cum evacuantibus torminum saevi-
tiam frangit, bilem corruptam emendat, mo-
tus praeternaturales sopit, et vires erigit. Nau-
tis drachma dimidia ad duas pulveris omni
trihorio vel quadrihorio data (JOHNSON
apud PERCIVAL *l. c. p. 6.*). Aliis suffecit in
hoc morbo minor dosis decem (MAKITTRICK
de febre Ind. occid. maligna flava in coll. diff.
BALDING. *vol. 1. p. 143.*), quindecim, vel
viginti granorum, in cochleari uno vel altero
aquae

aquae Cinnamomi vel Menthae simpl. (GARDINER *on the animal oeconomy*, p. 347. sq.). Profuit in cholera ex eodem fonte orta, post praemissos lapides cancrorum cum succo Citri eandem adhibere (*Veckoskrift för Läkare*, vol. 2. p. 77.). — In hisce morbis sanatis prout manifesta saepe bilis vitia praesto fuerunt, ita in febribus biliosis ipsis salutem affert. Laudatur connubium tartari vitriolati et quidem utriusque ad grana quindecim, vel viginti (PERCIVAL *l. c.* p. 9.); evacuantibus praemissis nihil efficacius est ad nauseam et vomitionem sedandam; et etiamsi remissiones manifestae sint, longe tutius exhibetur in hisce quam cortex Peruvianus, et efficaciter bilem corrigit, ventriculum roborat et vires restaurat (HAYGARTH apud PERCIVAL p. 10.).

Absentibus quoque vitiis, quae dixi, bilis et spasticis constrictionibus, stomachicum primi ordinis considerandum est, languente vigore ventriculi et primarum viarum indeque proficiscentibus cibi appetitus iactura, concoctione laesa, flatibus, nausea. Placuit simplex decoctum aqua factum, cochleatum pluries sumptum (SELLE *Handb. d. med. Prax.* p. 683.), item pulvis eius aromate quodam commixtus, vel infusum vino Maderaico paratum; deficiente autem bile, miscela pulveris cum felle bovino pilularum forma aegris consultum est (PERCIVAL *l. c.* p. 12.).

5.

Pharm. IKAN Radix.

Ex speciminibus, quae coram habeo, descriptionem *Radicis* exarare licet. Sunt haec ovato-oblonga, nonnihil compressa, utrinque attenuata, magnitudine nucis olivae, vel paulo exiliora, altero extremo desinentia in filum tenue duorum supraque pollicum, quod videtur fibrilla esse. Epidermide externe obducuntur ex luteo grisea, rugosa, arcte adhaerente parenchymati, interne duro, corneo, subpellucido, quod media parte comprehendit similem radicem contiguam, cuticula sua limitem denotantem. Bulbus videtur radix quasi ex orchidea plauta, et simili modo inter dentes commanſa sese habet, et diuturniori ibidem mora mucilaginis aliquid exundat. Bulbulum tamen innatum maiori in radice Saleb saltim non conspicio. Odoris expers, nec equidem aliquid acre illi inesse sentio. In provincia Chinenſi Suchuan, ex qua provenit, planta crescere fertur (HAGEN *Leherbuch der Apothekerkunst*, ed. 2. p. 386.).

De morbo, in quo adhibeatur, nihil habeo, quod tradam. Servant modo pharmacopae nostri radicem inter rariora exotica.

6.

Pharm. LOPEZ s. LOPEZIANA
Radix.

Nomen duxit a JOANNE LOPEZ PIGNEIRO (JUAN LOPEZ PINEIRO) Lusitano. Prima de hac radice narratio mihi obvenit apud FRANCISCUM REDI (*Experimenta circa varias res naturales*, p. 138.), nisi illi coevus censendus SEMMEDUS (*Histor. variorum simplicium exoticor.* p. 40.), de quo dubio supra (p. 154.) dixi, qui hanc quoque radicem significat. REDIO teste in provincia Zanguebar Africae in ripa fluminis Cuama LOPEZIUS hanc radicem invenit. Ex alia relatione Asiam patriam habet, et ex Goa in insulam Malaccam, indeque Bataviam transfertur (GAUBII *Advers. varii argument.* p. 80.); alius iterum edixit, Malaccae insulae propriam esse, multoque commercio tam Goam ad Lusitanos, quam ad emporium Batavorum Indicum pervenire (*l. c.* p. 89.).

Ex arbore originem traxisse, visu facile cognoscitur; nec videtur ex arbusculo, ut quidem cl. REDI indicatum, colligi, quum aliquando ramos insignis crassitie repraesentet. Proletarie valde haecenus modo arbor descripta
est

est (apud REDI), ut soli radici inhaerere necesse sit. Haec ipsa inter Europaeos medicos non nisi ab anno inde 1771. inclaruit, quo GAUBIUS illam ex tenebris suis protraxit, et propria et aliorum medicorum in Belgio degentium experientia pretium eius constituit. Iam et in officinis largius instructis copia illam aegris praeciendi exstat, per Belgas in Europam transecta.

Servantur bacilli diversae longitudinis, octo adeo vel novem pollicum, crassi pollicem unum, imo duos, saepe exiliores, lignosi, quorum lignum colorem stramineum prae se fert, leve et transversim dissectum, porosum est, excepta medulla, quae durior, densior et ex albo subrusa comparet. Cingitur hoc cortice fusco, tegmine molli, spongioso, luteo, per strata obsito. In quodam mihi obvio specimine supra lineam illud crassum deprehendo. Non multum ad notitiam eius confert figura ci. REDI *l. c. p.* 138.). Bacilli exiliores praestant crassioribus virtute. Odoris expers est, et saporis pariter ad iudicium GAUBII (*l. c. p.* 90.); equidem tamen amaricantem inveni, manifestius autem in pulpa spongiosa corticis externa. Perquam amaram perperam REDI facit.

Neque decoctum aqua factum, quod flavi coloris, nisi modicam amaritiam prodit. Salis essentialis quaedam indicia adsunt, tam in hoc decocto, quam in tinctura, quae fuscum colorem

lorem habet, et, abstracto spiritu vini, balsamici aliquid ardentis saporis, quasi opii amaricantis, prodit. Solutione vitrioli martis non fuscatur decoctum (Conf. cum Gaubianis experimentis *l. c. p. 90. sq.* alia eiusdem naturae et eventus cl JOSSE in *Hist. de la Société de Medecine*, tom. 3. p. 246.). Nihil neque sensuum exploratione, neque chemico scrutinio dicto detegitur, ex quo divinari possit egregia in sistendis alvi pertinacioribus profluviiis efficacia. Nempe haecce est, quae hodie attentionem medicorum suscitavit. Nullam enim fidem meretur eiusdem contra morsus vel puncturas animalium venenatorum olim prolata laus, vel in febribus intermittentibus extinguendis item vulneribus consolidandis pristinum praeconium (V. REDI *l. c.*). Verior modo indicata virtus Indis quoque nota hodie est, qui ipsi radicem super porphyrite cum aqua contritam in alvi profluviiis aegris propinant.


Hancce exhibendi illam rationem in lien-teria pertinaci et diarrhoea cum successu amplexus est GAUBIUS (*l. c. p. 79. sq.*), quem nunquam radix fefellit, nisi in sene decrepito, viribus exhausto, et fluxum coeliacum perpeffo. Imo profuit illi radix in diarrhoeis tabi pulmonali supervenientibus, quin consummata phthisi alvum coercet (*l. c. p. 82.*). Aequae felici eventu experti sunt eam cl. inter Belgas medici DE MONCHY, BOUDE, WYNSSEN et PATYN, quorum interpretem GAUBIUS agit. Ille quidem praeprimis in diarrhoea colliquativa

tiva phthisicorum reliquis omnibus eam praefert (*l. c. p. 83.*), quod et praeter GAUBIUM cl. PATYN (*l. c. p. 86.*) confirmat, quin praesentibus iam aphthis mali moris. Sic diarrhoeam habitualetm radix in decocto panis cum paucis vini remixto compescuit (*l. c. p. 84.*). Aequè prodest puerili aetati (*l. c.*), quam senili (*l. c. p. 87.*), et nominatim diarrhoeae puerperarum symptomaticae accommodata est (VERRYST in *Verhand. door de Hollandsche Maatschappye der Weetenf. vol. 21. p. 7.*). Habet etiam hanc non spernendam vim, quod cortex Peruvianus si alvum laxet, suo additamento diarrhoeam inde enatam compescat, et sic beneficio corticis frui aegrotum permittat absque subsequa alvi obstructione (*ID. l. c.*). Mira celeritate effectum suum exserit, ut sint, quibus a paucis modo dosibus turbæ iam notabiliter sopitæ, et frequentes deiectiones alvinæ ad paucas redactæ fuerint (GAUB. *p. 84. fq.*).

Datur opportune in pulvere sive syrupo, sive mucilagine aut apto electuario in pilulas efficta, dosi granorum quindecim ad triginta, ter quaterve de die. Febris si abest, vel stomachus torpet, spiritus vini cochlear exiguum superdari poterit. Tincturæ quæque locus est, scilicet ex radicis drachma sesquialtera, spiritus vini unciis duabus cum semisse, cuius ter de die cochlear exiguum, paucis vino rubro dilutum, ingeritur. Haud exiguum emolumentum

tum quoque spondet decoctum aquosum, modo digestio praecefferit.

SEMMEDUS pro suo more multas fide destitutas vires illi adscribit, ex quibus hic modo recenseo, miraculi instar curare a vipera commorosos, scilicet ita, ut vulneretur vertex capitis lanceolata, et plagae pauxillum pulveris eius applicetur (V. l. c. p. 40. fq.).



7.

Pharm. MATALISTA Radix.

Huius specimina in officinis vulgo occurrunt in orbiculos mœx crassiores aliquot linearum, mœx tenuiores dissecta. Amplitudo pariter variat, nam sunt, qui diametro pollices quinque excedunt. Externe superficiem cineream valde rugosam formant, interne albidiora comparent, et undas concentricas effingunt, et hinc inde aliquando porosa conspiciuntur, ut fere erosionem a vermibus suspicareris, nisi maior adesset regularitas. Substantia mediocriter compacta et notabiliter ponderosa. Negligitur hodie omnino.

Stirpem Americam inhabitare lego, ubi non additum, radicem alvum purgare, debilius Jalappa, paullo fortius Mechoacanna, dosi drachmarum duarum (VOGEL *Mat. med. p.* 240.).



8.

Pharm. TIMAC Radix.

Caribaeis dicitur Timac, Hispanis Liane a coureux. Quae de hac novimus, debentur medico GERARD, qui eandem in insula St. Domingue in hydropse utiliter tentavit, et Regiam societatem medicam Parisiensem de successu certiore fecit (*V. Hist; de la Société Royale de Medecine, tom. 1. p. 341.*). Nunquam eam vidi, nec iste descriptionem eius concinnavit. Censetur Aurantiis vel Terebinthis cognatione iungi. Deest haecenus in pharmacopoliis.

Decoquantur radices unciae duae in tribus pintis aquae (= lib. vj. civil.), cuius decocti aegri primis diebus vitra tria ingerunt (= unciis quatuor cum semisse circiter); augetur dosis quarto die, et si aeger fortioris naturae est, additur uncia una rasurae Guaiaci, aliquot grana Scillae et paucillum Canellae, ut potus aromate imbuatur.

Accedat oportet nova experimentorum series.

II. C O R T I C E S.

9.

Pharm. ANGELINAE Cortex.

Arbor huius corticis procera est, insulae Americanae Grenada incola. Anno 1785. Chirurgus GRIEVE ibidem commorans in Scotiam (Vid. DUNCAN'S *Medical commentaries*, vol. 9. p. 365.) virtutem eius anthelminticam perscripsit. Explorata haec fuit ab eo in infantibus dysenteria verminosa correptis, quae multis antea exitio fuit. Corticis huius unciae quatuor in quartis tribus (= lib. vj. civil.) aquae coquebantur, donec duae superessent. Huius decocti mane cochleare maius infantibus ingestum, biennio minoribus, et sesquialterum, vel duo, infantibus hac aetate maioribus. Abstinentum ab omni potu ciboque ad meridiem usque. Tormina excitat, qualia subinde a Jallappa. Subsequente die opus purgante est. — Sic stupenda vermium caterva per alvum eliminatur. Lumbricorum ratio nominatim videtur habita esse.

IO.

Pharm. ANGUSTURAE *Cortex.*

Altis scriptura corticis *Augustini* placet (*Göttingische Anzeigen* 1790. n. 4.), quae aliam patriam, scilicet urbem St. Augustin, in Florida orientali sitam, assignat. Quantum constat, prior rectior est, ex Angustura Americae australis, unde Hispani illum in insulam Trinitatis (Trinidad) transvexerunt. Ex quam arbore proveniat, nondum evictum; ex specie Magnoliae esse conjectura tulit (*Litterae Londino scriptae in Braunschw. Magazin* 1790. n. 5. p. 74.), et ulterior divinatio ex Magnolia glauca L. (BRANDE in *Hannöv. Magazin* 1790. n. 15. p. 235. sq.). Nuperrime (ex litteris cl. BRANDE in *Hannöv. Magazin* 1790. n. 69. p. 1099. sq.) tamen momenta quaedam probabilia suadere visa sunt, ex abyssinico frutice Wooginoos in Abyssinia dicto, f. Brucea antidysenterica JO. FRID. MILL. 36. *coloured Plants*, tab. 25., quae eadem est ac Brucea ferruginea (L'HERETIER *stirp. nov.* tab. 10. AITON *Hort. Kewensf.* vol. 5. p. 397.), peti. Descriptio enim corticis, quam BRUCE (*Travels to discover the Source of the Nile*, vol. 5. p. 70.) de dicta planta praestitit, congruit cum ista corticis Angusturae, et ipse ille agnovit,
conve-

convenire utrumque; et cortex fruticis vivi in horto Kewensi obvii, in plerisque quoque convenit.

Primam eius cognitionem dederunt anni 1788. altera parte medici duo insulae Trinitatis, cll. EWER et WILLIAMS, litteris Londinum missis, et insertis periodicae scriptioni (*London medical Journal* 1789. P. 2. p. 154. sq.), quarum copia ibidem facta adolescente anno 1789. et nunciatum, Londini suppetere eam corticis quantitatem, quae experimentis sufficeret. Sensim quoque per alia pharmacopolia ditiora cortex hic distributus fuit; nec deficit in nostris.

Affertur hic cortex frustis convexis, diametri circiter sesquipollicis, vel minoris, longitudinis plurium ad sex pollicum, lineam circiter dimidiam crassi. Epidermide albida inaequali vestitur substantia luteo bruna, dura, firma, nec in fibras discerpenda. Pulvis, in quem contunditur, flavedine Rhabarbarum fere refert. In lingua amaritiem mox prodit cum aromate, quod diu calorem in lingua relinquit. Odor recentis ingratus describitur, cuius vero nullum vestigium reperio in sicco praesente. Tam aqua, quam spiritus vini tingitur infundendo colore pallide aureo. Aqua nihil nisi amaras partes eruit, spiritus vini autem aromaticas simul. Ex corticis uncia una alcohol vini digestionem drachmas duas extracti resinosi primi, valde amari, eruit; aqua autem ex eadem

dem quantitate decoctione extracti gummosi circiter drachmas tres cum semisse, paullo minus amari; infusione autem extracti scrupulos quatuor, quod clarum est, et saporis fere eisdem, ac sal Chinchinae (HEYER in *Braunschw. Magazin*, l. c. p. 76.). Decoctum eius videbatur pulmones vituli contra putredinem paullo diutius tueri, quam decoctum corticis Peruviani (*ibid.* p. 78.).

Pauca haecenus experimenta, publici iuris facta, virtutes eius uberius enucleant. Multum vero iam promittit sapor. In insula Trinitatis adhibetur omnibus casibus, quibus cortex Peruvianus alias opportunus est; quin antistare in eo illi ibidem creditur, quod minori dosi idem praestet (*London medic. Journal*, l. c. p. 155.). Haec laus ad febrem intermittentem inprimis spectat, in qua plerumque sex aut octo doses suffecerunt; quin unica aliquando suffecit (l. c. p. 159. 161.). Modice intra usum alvus lubricatur. Eximia ista febrifuga virtus etiam Londini in tertiana confirmata, plusculis pulveribus ponderis granorum quindecim datis (BRANDE in *Hannöv. Magazin*. 1790. p. 238.). Suffecerunt drachmae duae, vel tres, etiam pertinacissimis cuiuscunque generis, dum post evacuationem praemissam quindecim ad viginti grana omni trihorio darentur; et in quartam quinque mensium doses duodecim, quarum singulae grana quindecim continuerunt, perfectam sanationem effecerunt (IDEM in *Hannöv. Mag.* 1790. p. 1104.).

— Similis potestas sese exseruit in affinis periodicis quibusdam morbis, scilicet deliquio animi periodico, cephalalgia et odontalgia eiusdem naturae (Conf. BRANDE in *Hannöv. Mag.* p. 238. Item IDEM in *Lond. med. Journ.* 1790. p. 41.). — Valuit et in febribus insigni debilitate et labe primarum viarum iunctis. — In febre putrida casu singulari antisepticam vim vel fomentatione externa declaravit (*Lond. med. Journ.* 1789. p. 146.).

In diarrhoeis et dysentericis Nigritis frequenter in insula Trinitatis exhibent (*l. c.* p. 159.). Nec fessellit Europaeos usus in hisce malis (BRANDE in *Hannöv. Mag.* 1790. p. 238. 1103. item in *London med. Journ.* 1790. p. 44. item Anonymus in CRELL'S *chem. Anal.* 1790. vol. 1. p. 248.), omnique casu conducit, quo laxitas et atonia subest. Concinne praemittuntur per alvum vel os purgantia, subsequente eiusdem infuso (BRANDE *Hann. Mag.* *l. c.* p. 238.). Non tamen in diarrhoeis colliquativis videtur tutus. Omnia conveniunt, in stomacho roborando et viribus digestionis restituendis valere eximie.

Profecit etiam in habitu scrophuloso et in eruptionibus cutaneis, quae vulgo scorbuticae dicuntur (BRANDE in *Lond. med. Journ.* 1790. p. 45.).

Pulvis corticis a granis decem ad viginti pro dosi capitur, a qua proxime dicta tamen delicatiores uno vel duplici casu nauseam contraxerunt, ut itaque minores doses ventriculo magis amicae sint, et gratum caloris sensum afferant. Extractum a granis quatuor ad octo exhibetur. Decocti aquosi, ex pulveris drachma una cum aquae unciiis quatuor parati, unciam vel sesquiunciam fert aeger ter vel quater de die. Gratius sumitur decoctum eius vel infusum additamento leviter aromatico: octo scil. unciiis liquidi (ex tribus vel quatuor drachmis corticis pro aquae unciiis sedecim praeparati) additur Syrupi corticum aurantium uncia dimidia et tincturae Lavendulae compositae drachma una (BRANDE in *Lond. med. Journ.* 1790. p. 40.). Tincturae, ex corticis uncia una et spiritus vini unciiis sedecim, drachma una pro dosi concedi potest. Doses experientiae cl. BRANDE debentur.

Nisi coniectura fallat, in fidem virtutis antidyntericae ipsum exemplum cl. BRUCE (l. c. p. 71.) in medium proferri potest, qui cortice Wooginoos, ad cochleare exiguum pro Thea bis quotidie cum lacte camelino ingesto, subiuncto mane cyatho infusi corticis cum lacte eodem calido, se a dysenteria liberavit, aliisque etiam tam pulvere, quam infuso aquoso et tinctura spirituosa praesidio fuit.

II.


Pharm. BELA - AYE Cortex.

Nomen praefixum gerit arbor in Madagascari in montibus decem miliaribus a mare remotis. Cortex eius haecenus nonnisi observationibus cl. SONNERAT, per cl. MAUDUYT divulgatis (in *Mem. de la Soc. R. de Medec. vol. 3. p. 689.*), in ea qua vivimus plaga innotuit. Neque proprio nec alieno auso mihi suppetiit characteres eius proponere.

Indi corticem addunt potulento cuidam ex arundine saccharifera parato, Tok ab illis dicto. Huius vero loci praeprimis est ob vim in alvi profluviis cognitam. Ipse SONNERATUS in India eo infuso capto deiectiones cruentas (flux. de - sang), quibus laboravit, sopivit, item plures alios, qui per duos vel tres annos easdem sustinuerunt. In hisce videtur malum haemorrhoidum potius cruentarum, quam dysenteriae nomine insigniendum esse.

Huius

Huius in pulverem redacti post prae-
 alvi purgationem exhibentur grana viginti qua-
 tuor, mane in cyatho infusi theae vel pauxil-
 lo vini, et totidem grana vesperi. Exactis die-
 bus septem aut octo, augenda dosis, eiusque
 grana triginta sex mane modo danda, ad per-
 fectam curationem usque. Repetita Parisiis ex-
 perimenta eodem successu. Diarrhoeis diutur-
 nis et contra alia rebellibus mederi ibidem
 pariter contigit.



12.

Pharm. CORTEX CHINAE vel
CHINCHINAE REGIUS
s. CORTEX CHINAE
FLAVUS.

Hic cortex haud ita pridem sub priori nomine Londinò petitus. Patriam ignoro; sed mense Iunio a. 1720. quum Francofurti ad Moenum versarer, specimina vidi apud experitissimum pharmacopolam SALZWEDEL. cui et horum unum debeo, dein quoque in pharmacopolio Wisbadensi. Caro tum pretio adhuc vendebatur, et quidem ab aromatariis Francofurtensibus, fratribus EITLING libra una thaleris sedecim.

Cortex hic constat frustis subplanis, digitum circiter longis, pollicem latis et lineam crassis. Color ferrugineo flavus est. Extrinsecus magis ad ferrugineum inclinat, ex epidermide tenaciter cortici intexta, quam in superficie interna. In fractura, quin et superficie, fibrillosus apparet. Discerpitur facile digitis,

Vol. VI. M imo


imo in pulverem conteritur flavum. Sapor intense amarus cum leviori adstrictione.

Frankofurtani aliquot medici in intermittente febre superiorem longe vi vulgo adhibitis corticibus repererunt.

Non debito pro eodem illum habere, quem mihi nuperrime mittere placuit per Ill. L. B. AB ASCH sub nomine *Corticis Chinae flavi*; qui tamen nonnihil ponderosior et compactior mihi altero visus est; facie tamen illum referens, nec amaritiae illi cedens.

Opus erit confusionis vitandae causa in posterum hunc corticem *Chinae regium flavum* dicere, quum Amstelodami cortex aliquis nomine corticis Chinae regii nuper venditus fuerit pretio florenorum quatuordecim pro libra una, qui ex specimenibus a me visis in omnibus refert corticem Peruvianum rubrum, modo quod nonnihil pallidior rubro sit. Retulerat de hoc cl. A THUESSINK (in litt. ad cel. BLUMENBACH d. 25. Aug. 1790.) Regium dici, quod usui familiae Regiae Hispanicae destinatus sit, et superiorem longe vulgari cortice Chinchinae virtute esse, ex propriis experimentis. Ferrugineum potius colorem, quam flavum, gerit.


Meminerunt quidem corticis in regno Peruviano obvii, cuiusdam flavi DE LA CONDAMINE (*Mem. de l'ac. R. d. sc. de Paris* 1783. p. 228.) et JOSEPHUS DE JUSSIEU (*Hist. de la Soc. R. de Medecine* 1779. p. 253.), et flavescens (Yellowish s. Calcarilla amarylla) ARROT (*Philos. Transact.* vol. 40. p. 81. sq.). Sed ex descriptionibus eorum non eae enucleari notae possunt, quae in hunc quadrent.



13.

Pharm. CORTEX CHINAE vel
CHINCHINAE SURINA-
MENSIS.

Nomine *corticis Chinae novi* misit cl. A THUESSINK Haga - comitum eius specimen ad cel. BLUMENBACH, quod una cum litteris (d. 25. Aug. 1790.) lustrare mihi concessum. Ex colonia Belgarum Surinamensi transfertur hic cortex. Specimen praesens spithamam longitudine, digitum diametro, lineam dimidiam crassitie aequat; fere tubulosum est, vestitum epidermide profundius et sordide brunna, hinc inde cinerea, lineis prominulis longitudinalibus notata. Parenchyma pallidius brunum in festucas fragiles discerpi se patitur. Sapor eius intevse amarus, ut in iis febribus intermittentibus conducere videatur, quae amarissimum cedunt. Ast specifici nihil inest, et vulgari cortice longe in hisce superatur (A THUESSINK).



14.

Pharm. IUBABAE Cortex.

Fragmenta coram habeo, aliquot pollices longa, vel minora, *corticis* fragilis, pallide bruni, convoluti et flexuosi, item subinde ramosi, vel per longitudinem dissecti ex ramis, ut videtur, mox angustioribus, mox crassioribus, e. c. diametri duarum linearum, deglubiti. Epidermide rugis longitudinalibus distincta, grisea, vestitur, cui quae subiacet pars corticis profundius bruna est, quam parenchyma, quod albidum est. Ex India transvehi dicitur.

Comparari video (in SPIELM. *Pharm. generali* p. 126.) quoad saporem odoremque cum Vanigliis. De odore, etsi debiliore, id largio: praecipue si manu incalescit; non de sapore, qui mihi modo amaricans est.

Vis nervina iactata et ratio, cur Vanigliis substituta fuerit, aliis documentis (l. c.) comprobanda restat.

Pharm. MASSOY Cortex.

Innotuit RUMPHII litteris a. 1680. ex Amboina exaratis (Vid. *Misc. nat. curios. Dec. 2. ann. 1. Obs. 22. p. 55.*). Provenit in Nova Guinea, eiusque occidentali parte, quae Onim dicitur.

Tenuis est, fere planus, coloris cinnamomei obscurioris, cortice (nonne epidermide?) griseo striato tectus, suaveolens, saporis dulcis cui gratum Cinnamomi aroma immixtum. Atque haecce fere SPIELMANNI (*Pharm. gener. p. 141.*). Nam mihi non suppetunt; nec DALE (*Pharmacolog. p. 378.*), qui eam receperat, notas ullas in medium profert. Indi co trito et in pulvem cum aqua redacto inungunt corpus tempestate frigida et pluviosa, quoniam calefacit, tormina ventris sedat et gratum odorem spirat (RUMPH *l. c.*).

Destituuntur eo nostrae officinae pharmaceuticae.

Pharm. POCGEREBAE Cortex.

Exempla huius nuperrime (a. 1790.) mihi misit L. B. AB ASCH. Haftenus enim modo pauculis istis, quae de eo tradiderant paucissimi de materia medica libri, mihi acquiescendum fuit. Iam possideo fragmenta a diametro pennae anserinae ad pollicarem crassa, quorum crassissima lineam assequuntur, convoluta, passim ramosa, bura, ponderosa, compacta, mox distorta, mox rectiora. Externe haec sunt rugosa, in quibusdam speciminibus annulata, epidermide tenaciter affixa et profundius bruna, quam substratum parenchyma. Adstrictionis et falsedinis subaluminosae mitem sensum mihi in lingua excitat; in iunioribus speciminibus amarorem levem quoque animadverti; nares vero nullo modo ferit.

A. 1758. (VOGEL *Mat. med.* p. 295.)
notatum, ex America aliquot annos antea trans-
M 4 latum

latum fuisse, nullo sapore instrui, aut alvi fluxus egregie sistere, eoque sine Americanis acceptum existere. Additur Parisiis quoque vim in diarrhoeis, dysenteriis et fluxu hepatico confirmatam, et tres uncias adulto sufficere, et intra biduum morbum tolli.

Rosionum a vermibus crebra vestigia, quae in speciminibus deprehendi, praecipue crassioribus, de neglectu huius corticis hodierno testantur.



III. L I G N A.

17.

Pharm. Lignum ALOES s. AGAL-
LOCHI VERI ;
CALAMBAC ;
ASPALATHI

Iunctim propono haec ligna, etsi nondum omnino evictum, an eiusdem arboris progenies sint. Aloexylum Agallochum vocat cl. LAUREIRO (*Flor. Cochinch. tom. 1.*) arborem, cui lignum Aloës et Calambac adscribit, et ad plantas decandras refert. Excoecariae Agallochae L. lignum tamen genuino Agallocho tam prope venit, ut loco hulus vendatur. Quin praeparatione a Sinensibus refert Agallochum optimum, quod Calamba v. Calambac nomine insignitur (RUMPH. *Herb. Amb. vol. 2. p. 238.*, quod repetiit HOUTTUYN *natuurlyke Historie, vol. 2. P. 3. p. 480.*). Agallochum spurium vocat RUMPHIUS. Huic arbori Moluccanae insulae praecipue patria sunt. Quae ab aromataris emuntur, vel inter cimelia col-
lectio.

lectionum rerum naturalium ostenduntur, exempla, sub diversis istis nominibus, differunt quidem subinde colore, duritie aliisque notis; saepe tamen eodem redeunt. Quae de vero Aloës et Calambaci ligno narrantur, non in quavis arbore reperiri et, id quod in eo praecipuum est, resinofam materiem, odoris, post exsiccationem ligni, gratissimi, colligi in cavis internis, erosione quasi enatis (GARCIAS AB HORTO in CLUS. *exot. p.* 172. *sq.* KÄMPF. *Amoen. exot. p.* 904.); haec et de Excoecariae ligno valent, quod Agallochum verum imitatur, adeo ut istud quoque suffimigiis inserviat. Odore arbor genuina initio destituitur, morbofa autem mutatione eundem adsciscit, qua ipsa partes resinosae peculiaribus locis stagnant, et arbor sensim perit, ante quod tempus eam caedere, operae pretium non est (LAUREIRO).

Selectissimum itaque lignum Aloës dicitur Calambac. Rarissime hoc ob insignem valorem in Europam pervenit. Hinc inter pretiosissima munera, a rege Siamensi Galiae Regi, LUDOVICO XIV. oblata, ligni Calambac portio numerabatur (SAVARY *Diët. vol.* 1. *p.* 93.); Aureo suppar censetur vel duplo s. triplo argenti ponderis in China venditur (RUMPH. in *Misc. nat. cur. Dec.* 2. *Ann.* 3. *p.* 74.). Memini, fragmento mihi a B. OTTONE A MUNCCHAUSEN olim moneri dato generosissimum virum adscripsisse, esse partem frustul digiti longi, pro ducato aureo a se empti.

Pos.

Possideo maiora, minora, eius fragmenta, in quae quadrant characteres optimo Calambac adscripti. Praefertur nimirum nigricans, cinereis venis percursum, plurima resina praegnans (GARCIA AB HORTO l. c.). Nodosa varia specimina offendo, ut inde videatur assertio KÄMPFERI firmamentum obtinere, circa nodos resinam colligi. Praesto est frustum, quod una parte putredine quasi excavatum cernitur, et in fovea resina rubicundo bruna repletur. Optima nota praestantiae ligni est, quod igne accensum multum humoris exsudet; falluntur, qui eam inde diiudicant, quod in aqua coniectum fundum petat, nam selectissimum aliquando natat. Quidam pretium quoque a magnitudine frustorum diiudicant. Aliud criterium hoc indicatur, quod vitro fortius affricum, vestigia resinosa relinquat, quae nec aqua, vel saliva, vel oleo expresso; nec lixivio alcalino, ablui sese patiuntur, sed tantum spiritu vini (BERGIUS *Mat. med.* p. 904.). Sapor eius resinoso amaricans est, nec ipsam resinam valde amaram inveni; a colore igitur, quo refert Aloën succotrinam potius, quam a sapore, nomen ligni Aloës petatum videtur. Venale lignum Aloës vel Agallochi vario gradu a dicto deflectit.

Nolo memet in antiquitates horum lignorum demittere, quum praavideam, me in hac indagine subtilitate GARCIAE AB HORTO victum iri, qui ipse effata DIOSCORIDIS,
PLI.

PLINII, Arabum, inter sese comparat et diiudicat.

In Malacca, Cambodia, regno Siamensi et Sinenfi, aliisque Indiae locis reperiunda arbor est, ad cuius lignum quaerendum mercenarii sylvas adeunt, vetustissimas arbores et carie foedas prostratasque findunt, et ex hisce fragmenta resinosa eximunt (Vid. RUMPH. l. c. p. 29. et Kämpfer.).

Fateor, ex apparatu medicamentorum facile lignum Calambac omitti posse. Attamen in potu halitum oris corrigere, stomachum heparque roborare, dysenteriam sedare etc. quidam censent (PALUDANUS, nota ad LIN. SCHOTEN *Hist. de la navigation aux Indes orient. p. 126.*). Pulvis quoque ad scrupulum captus in cholera prodesse referunt, item ascarides puerorum necare (BONT. *Hist. natural. et medic. p. 43.*). Ditiorem est, sphaerulas pro precibus ad numerum recitandis inde effingere, ut subinde factum (CLUS. *exot. p. 173.*). Maximum autem huius ligni impendium est pro suffimigiis in terris orientalibus, quo ipso utuntur in sacrificiis, aulisque (BONTIUS). Imo magnates Sinae et Japoniae vix ullum convivium celebrant, quin, ut magnificentiam affectent, hocce pretioso suffimento multum aeris prodigant (Kämpfer.). Eo etiam in festucas dissecto et in acerram coniecto, advenis appropinquant, honorem testificaturi et vires totius corporis restauraturi (DE-
MA-

MANET *Nouvelle Histoire de l'Afrique Franc. tom. 2. p. 153. sq.*) - Turcae subinde Tabacum succuri eius festucam in caput fistulae immittunt (Ex litt. L. B. AB ASCH a. 1778.).

Lignum *Aspalathi* distincte quasi ab alia arbore a quibusdam, ut DALE, GEOFFROY, ALSTON, LINNE' proponitur. Describitur a cl. DALE (*Pharmacolog. p. 379.*), quem et alii secuti sunt, bituminosum, Ligno Aloës laxius et crassius, pallidius, saporis amaricantis pinguis et resinosi, odoris debilioris. Ut discernatur a ligno Aloës, notat cl. BERGIUS (*M. m. p. 905.*), maioribus *Aspalathi* Lignum frustis obtinere, odorem eius fragrantem non esse, fumum minime gratum spargere, ponderosius esse magisque aequale, colorem obscure fuscum prae se ferre, nec vitro affricum vestigia relinquere. Viribus suppar' habetur priori, modo debilius. Ex India orientali ad nos transfertur.



III. GUMMI et RESINAE.

18.

Pharm. Gummi AMMONIACUM.

Dolendum, de medicina efficaci et usitata tractationem carere iis momentis, quae medicaminis cuiusvis historiae basis vera et fulcrum sunt, nempe neque constare, ex quonam genere vel specie hoc concrementum petatur; nec quomodo, vel ex qua parte eliciatur; nec quatenam, vera eius patria sit.

Umbellatae stirpi debere suam originem eatenus probabile est, quod illi intermissa compareant saepe semina, Anethi semen referencia, aut nonnihil illo maiora. Quodsi illud idem vere sit, ac Ammoniacum veterum, cuius iam meminit HIPPOCRATES et DIOSCORIDES: in Africae ea parte nascitur, quae Aegypto ad occasum adiacet, et hodie regnum Barca nominatur, in quo delubrum istud inclytum Jovi Ammoni sacratum olim fuit. Per Turciam ad nos transfertur, item ex India orientali.

Occur:

Occurrit vulgo magnis massis, duplreis coloris, dum in substantia flavescente grana lactei coloris (Amygdalas s. unguis varii illa dicunt) immersa, sed cum altera unita deprehenduntur. Utraque pars opaca est, et utriusque superficies externa ex tactu aëris rufescere solet. Gravem fortemque odorem spirat, Galbano tamen gratiorem; saporem vero subdulcem et subamaricantem nauseosum edit. Calore digitorum mollescit, iisque adhaeret. Frigore autem fragile. Funditur facile cochleari ferreo. Candelae admota ardet, spumescitque. Quo pluribus granis lacteis distinguitur, eo praestantius hoc gummi est. Hinc et haecce sola si segregantur, unde emergit id, quod Gummi amygdalodes dicitur, depuratione eius non opus est. Quam ipsam alias requirunt arenae, lapides, semina, aliaque heterogenea admixta.

Non verum gummi, sed gummi-resina est, quae plus gummosarum, quam resinotarum partium continet. Quam amico connubio autem utraeque iungantur, inde elucet, quod aequae libenter fere hae aquae ac spiritui vini auscultent. Ita ex gummi ammoniaci uncia una extracti resinosi primi drachmae sex eruntur; et ex eadem quantitate extracti gummosi pr. drachmae sex et scrupuli duo cum semisse (NEUM. *Chémie* vol. 2. P. 2. p. 387.). Aqua si teritur, in emulsionis speciem seu liquidum lacteum resolvitur, quod tamen paullo post copiam resinae in fundum vasis demittit et clarum

rum sit. Spiritus vini ab hoc gummi tingitur colore rubicundo luteo. Solvitur et triturationis ope aceto, vino, cereuisia. Nihil plane olei destillatione cum aqua erogat. Et exiguum modo odoraе partis ab aqua excipitur.

Resolvendi vi insigni instruitur. Et haec quidem pituita pulmones gravante et tussim, raucedinem, respirationis difficultatem creante cognoscitur, quibus ipsis in malis screatus levat. Ideo in peripneumoniam notha opportunum est. Ita si sputa in inflammationibus pectoris moram trahunt vel supprimuntur, pectus liberat. Quin ipsis phthificis opportunum, si puris eiection non succedit. Quando a stimulo nihil metuendum, elegans connubium est huius gummi cum Oxymelle scillitico addita aqua destillata et syrupo. Liquida forma in universum placet in pectoris affectionibus. Vereor, ne ill. CULLEN (*Treatise of the Mat. med. vol. 2. p. 369.*) iusto timidior fuerit in administrando eo in scopum expectorantem, calidam eius naturam accusans. Commode quoque in obstructionibus viscerum usurpatur, in quibus forma pilularum solum, vel in miscela aliorum efficacium, ut extracti Taraxaci, vel amari cuiusdam, saponis, antimonialis, etc. adhibetur, dosi scrupuli, vel maiori. Largius sumptum alvum movet.

Non minoris praestantiae est in tumoribus, qui emollientibus et solventibus, cum leni stimulo iunctis, opus habent; id quod de tumo-

moribus frigidis valet, nam in calidis non conducit. Varia ideo emplastra officinarum intrat. Quoniam vero haec magis composita sunt, tanto manifestior eius vis elucet, dum modo gummi ammoniacum aceto solutum applicatur. Hocce gummi, aceto scillitico subactum, et in emplastrum densatum, intra quatuor hebdomades fungum articuli in genu sinistro, auctore CLOSSIO, dissipavit (PLENK *Mat. chir.* p. 153.). Ita rigiditas manus post fracturam radii eodem disparuit (SCHNEIDER in *RICHT. chir. Bibl. tom. 7. p. 605. sq.*). Simili emplastro, ad quod vero solum acetum vini adhibitum, crassius corio superdato, et per duodecim dies una serie relicto, dein pro ratione necessitatis repetito, cl. EVERS (*Bemerkungen und. Ersahr. d. Wundarz. p. 112. sq.*) pluries fungum articulare f. hydropem genu curavit; quum demeretur emplastrum, semper copia lymphae exsudasse apparuit. Ganglia et metastatici tumores variolarum aeque feliciter hacce medela dissipantur (ID. p. 115.). Unguento vero ex gummi hocce et aceto scillitico, ter de die inuncto, praemisso quavis vice suffimigio ex baccis Juniperi, tumor insignis albus genu, ex causa arthritica enatus, binis exemplis evanuit (MICHAELIS in *Biblioth. cit. tom. 6. p. 146. FIELIZ l. c. tom. 7. p. 778.*). In comoda miscela adeo hoc gummi ad discutiendos tumores cysticos valet (GIRARD *Lupologie. RICHT. chir. Bibl. tom. 3. p. 449.*).

Recentius emplastri ex hoc gummi et aceto vini beneficium in tinea capitis tollenda constitit. Quo sine vel ope corti crassius illitum applicatur, vel calide ipsi capillitio illinitur, superimposito dein corio, tandem mitra. Praescindi vel abradi autem prius debent capilli, et crusta unguento nutrito vel axungia porcina emolliri et auferri. Relinquitur emplastrum hoc per sex vel octo hebdomades. Videtur hac ratione liquidum tenax in bulbulis capillorum et folliculis sebaceis stagnans attenuari et ad exitum provocari (V. de hoc cl. EVERS consilium in *Gött. Anzeig.* 1790. n. 41.).

PRAEPARATA ET COMPOSITA.

Gummi ammoniacum colatum *Ph. Lond. ed.* 1761. p. 23. Paratur solvendo gummi ammoniacum in aqua frigida et post colationem inspissando. Sic exuitur vel purgatur quidem quiescentibus variis, sed iacturam odorarum partium patitur. Hinc forsitan omisit hoc praeparatum *ed. a.* 1788. Erit tamen, ni fallor, ex usu, quando exaestuationis ex hoc gummi subsequuturæ metus exsurgit.


Lac ammoniacum *Ph. Lond.* 1788. p. 107. Hodie solutio Gummi ammoniaci in simplici aqua destillata fit.

Pilulae de ammoniaco *Ph. würt.* p. 236. Nimis compositae; ob copiam Aloës s quae dimidium fere constituit, aloëticae potius, dicen-

dicendae, hinc calidae. Depraedicantur vi res-
solvente et incidente.

Emplastrum de ammoniaco *Ph. W. p. 59.* In tumoribus frigidis emolliendis et discutiendis omnino confert. In parotidibus post peripneumoniam dissipandis e re fuit; hoc emplastrum, quinta parte vesicatorii mixtum, applicare, imponendo desuper cataplasma emolliens; hac ratione in paucis modo suppuratio orta (*QUARIN Method. medend. inflammat. p. 92.*).

Emplastrum diachylon compositum *Ph. W. p. 63.* Empl. de cicuta *l. c. p. 60.* Empl. de meliloto *l. c. p. 67.* Empl. oxycroceum *l. c. p. 69.* aliaque emplastra; item pilulae scilliticae, syrupus de ammoniaco, multaque alia composita pharmacopoliorum, praecipue Germanicorum, gummi nostrum comprehendunt.



Pharm. BDELLIUM v. *Gummi*
BDELLIUM.

Si Bdellium DIOSCORIDIS (*M. m. lib. i. cap. 80.*) et PLINII (*Hist. nat. lib. 12. cap. 9.*) idem cum eo, quod hodie in officinis servatur, est, ex arbore provenit. Id omne est, quod de origine scimus. Ex Arabia et India orientali petitur.

Massis transfertur solidis variae magnitudinis et figurae, fragilibus, fracturae superficiae aspera, coloris profunde bruni, hinc inde pellucidis, festucarum ex ramulis, membranularum, aliarumque vegetabilium partium, inquinamento foedis; odoris haud ingrati, subfragrantis; saporis amari et leviter pungentis, calidique. Emollitur calore digitorum, dentibusque sub masticatione adhaeret; flagrat admodum candelae, etsi aegrius, odore balsamico, simulque crepitat, et liquidam materiem ex superficie exsudat, remanente carbone atro. Tentaminibus cum aqua vel spiritu vini factis elucescit facile, esse gummi resinam, et gummi eius plurimam partem efficere. Nam aqua
pro

pro prima solutione adhibita, sibi vindicat extracti $\frac{1}{2}$; spiritus vini vero extracti spirituosi priori $\frac{1}{4}$ (saltem ad explorationem NEUMANNI *Chym. vol. 2. P. 2. p. 399.*). Solutio aquosa colorem glaucum prae se fert, spirituosa rubicundum. Destillatione aquam fragrantia sua imbuat.

Vires eius solent ad Myrrham a multis exigi, cui tamen multum cedit amaritiae. Desuevit usus eius nostra aetate, et vix unquam ore hodie capitur; qua via tamen sumptum olim instar deobstruentis, becchici, diuretici, emmenagogi celebratum fuit. Externe subinde discutiendi et emolliendi scopo adhibetur. Memoriam eius servant emplastra varia obvia, e. c. Empl. diaphor. mynsichtl, sticticum, opodeldoch, item unguentum Apostolorum etc., quae quidem tantam farraginem continent, ut inde diiudicari Bdellii virtus nequeat.



Pharm. CARANNA s. CARANNAE
Gummi.

Tlahueliloca quahoitl (i. e. Arbor infaniae) Caragna vocata HERNANDEZ *rer. med. nov. Hisp. thes. p. 56.* Gomme Garanna DES MARCHAIS *Voyage en Guinée et a Caranne, tom. 3. p. 259.* Palmae species ad assertionem auctoris proxime dicti.

Ex cortice eius vel sponte, vel eodem vulnerato, gummi hocce provenit. Transfer-
tur ex nova Hispania aliisque regionibus Ame-
rices. Oscitanter modo eius meminit MONAR-
DES (in CLUS. *exot. p. 298.*), qui illud,
uti HERNANDEZ, comparat cum Tacamaha-
ca, sed liquidiores vocat, et paullo post ad-
glutinantem naturam illi adscribit. Quod for-
sit a iuniori aetate dependet. Caranna in of-
ficinis nostris obvia solida et fragilis est. Mas-
sis arte complanatis, variae figurae, reliquiis
foliorum lunci vel Arundinis hinc inde obte-
ctis, ad nos pervenit, opacis, extrinsecus pro-
fundius brunis, interne pallidioribus, et quasi
variegatis. Facile frangitur, superficie inaequali
sub.

subnitente, vel digitis conteritur. Vidi tamen et specimina compactiora, viridi nigra, quae sola sine dubio SPIELMANNUS (*M. m. p.* 312.) ante oculos habuit. Saporis resinosi debilis. Accenditur flammae admota facile, et ardet odore balsamico. Inter dentes non emollitur, nec compingi se patitur, sed arenosam naturam mentitur; salivam tamen tingit. Aqua tingitur eadem colore aureo, et extracti gummosi pr. eruit circiter $\frac{2}{3}$. Similem colorem spiritus vini inde contrahit, qui extracti resinosi $\frac{2}{3}$ fere evolvit. Praevalet igitur resina in eius miscela. Accedit ad hasce partes oleum essentielle subtile, acre, aurantiaci coloris et fragrans, destillatione Carannae cum aqua evolvendum (GEOFFROY *Mat. med. Traité tom.* 4. *p.* 35.). Item sub inspissatione tincturae spirituosae exsurgit oleum in superficiem aromaticum et modice amarum (LEWIS *M. m. p.* 179.).

Hodie exolevit hoc gummi, quod olim externa applicatione ad tumores inveteratos solvendo, dolores tollendo, vulnera consolidanda, defluxiones revellendas efficax censebatur (MONARDES). Calore facile in emplastrum pro hisce scopis emollitur. Temporibus in patria applicatur ad odontalgiam tollendam (DES MARCHAIS *l. c.*). Sufficit quoque ad corrigendum aerem.

Pharm. GALDA Gummi.

Aliena unice luce hic uti cogor; nam gummi hoc ipse non vidi, raroque exstat in pharmacopoliis, et paucissimi auctores de materia medica illud commemorant. Certe vix hodie amplius a medicis praecipitur. Variant insuper auctores in descriptione eius; etenim e. c. alius (BÜCHNER C. resp. SEELMATTER *Dissert. de Gummi resinis Kikekunemalo, Look et Galda*, p. 18.) subgriseum describit, lactescens, friabile, lamellosum, inodorum, saporis fortiter amari et acris; alius (SPIELM. *Pharm. gener. p. 100.*), extus nigricans, intus album, durum, odoris et saporis Elemi; adiungitur, inter dentes lentescere, ad flammam liquari, et ardens odorem haud ingratum spargere.

Nihil olei destillati erogat, sed aqua pro destillatione adhibita valde debilem modo odorem et sorem balsamicum suscipit (BÜCHNER *l. c.*). Etiam hoc gummi-resina est, sed praevalet resina, nimirum gummi huius uncia una extracti gummosi grana quindecim, extracti autem resinosi drachmas sex suggerit.

Amarities supra commemorata extractio etiam inhaeret, item acrimonia (*l. c.*).

Abhorreo a recensu virtutum coniecturæ tantum vagæ ex hisce iudiciis superstructarum in quo Dissertatio academica citata prodiga est: scilicet prodesse in morbis variis, incidendo, humores depurando, leniter alvum subducendo, et lotium movendo. Ex GERHARDI experientia (*l. c.*) profecit ad expectorationem puris in phthisi ex inflammatione levandam, et ulceris depurationem et consolidationem, præcipue forma electuarii cum melle rosarum. Sed de eiusmodi consiliis iam alibi iudicavi. Alius (SPIELM. *l. c.*) vim roborandi illi adscribit, qua de causa emplastra et unguenta intravit. Haud parum itaque iudicium de Galda variat.



Pharm. KINO *Gummi* s. GUMMI
ADSTRINGENS GAM-
BIENSE Fotherg. et Ph.
Edinb. s. GUMMI GAM-
BIENSE Ph. Lond.

Arbor, quae hoc gummi fundit, in loco natali *Pau* (a Palo Lusitan de sangue dicitur, et crescit ad fluvium Gambia Africae. Quantum constat, prima gummi huius mentio fit a cl. MOOR (*Travels into the inland. parts of Africa*, ed. 2. p. 113.). Eo teste oculato ex cortice, post praevisam incisionem, copiose guttatim promanat, moxque confluit et, adiuvente calore solari, in massam indurescit. Perperam quidam pro sanguine draconis purissimo illud habuerunt, et pari errore gummi Senegal verum reputatum est.

Ex tenebris suis a. 1757. illud protraxit meritissimus practicus JO. FOTHERGILL (*Med. Observations and Inquir. vol. 1. ed. 4. p. 358.*), eoque, descriptione, variisque historicis momentis in medium prolatis, apparatus medicum

cum auxit; ipse vero fatetur, medicum quendam Anglicum, OLDFIELD, narratione sua de potentia eius in sistendis alvi profluviiis inveteratis se primum in eius favorem incitasse. Iam in Anglia et Scotia probabile, non insuetum in praxi medica esse, quum in utriusque regionis Pharmacopoeam receptum, et in *Ph. Edinb. noviss.* insuper in formulis compareat. Rarius alibi praecipi videtur, etsi tantus eius commeatus contigerit, ut eo et germanicis officinis bene provisum fuerit. Ita *Pharmacopoea Würtenb.* serius (*Ed. 1786. p. 126.*) illud adoptavit. In nundinis autumnalibus Francofurt. a. 1790. libra una florenis 4 $\frac{1}{2}$ venalis fuit.

Massas diffformes constituit, duras, non pellucidas, quibus saepe folia arundinaceae stirpis adglutinata extrinsecus cernuntur, coloris ex rubro nigri, fracturae splendentis et saepe cellulosae. Fragile tantopere est, ut facile inter digitos conteri possit. In pulverem redactum manifestiorem rubedinem, sed profundam, declarat. Masticatum stridet primum, dein adhaeret dentibus, mox saliva solvitur, quam colore profunde rubro tingit. Sapor tum sentitur valde adstringens, subsequa dulcedine miti. Odore omnino caret. Flamma aegre accenditur, nec liquatur, sed igitur modo relictis tandem cineribus griseis. Solvi ut tam aqua, quam spiritu vini, et utrumque mentisrum inde coloratur, spirituosum tamen profundius, ita et hoc paullo plus solvit, quam aqua.

aqua. Solutiones hae vitriolo martis mixtae mox intense nigrescunt. Et hisce quidem notis facile a sanguine draconis (*Conf. Appar. med. vol. 5.*) discernitur, cui primo aspectu simile est; nam sanguis draconis non adstringit linguam, nec aqua solvitur. A Catechu (*Conf. Appar. med. vol. 2.*) quoque differt, quum hoc multum mucilaginis prodatur, quod non in gummi Kino reperio.

Supra iam innui, istud obstinatas chronicas diarrhoeas egregie compescere (OLDFIELD). JO. FOTHERGILL (*l. c.*), qui tum temporis non videtur illud in usum traxisse, commendat in diarrhoeis habitualibus, fluore albo, fluxu menstruo immodico, et in universum omnibus morbis a laxitate et acrimonia provenientes.

En documenta, quousque eius angurium eventui responderit. Recentius diarrhoeas et dysenterias, praevia necessaria evacuatione, eo compescere contigit cl. ANTONIO FOTHERGILL (*Mem. of the med. Society of London, vol. 2. p. 106.*). Ita eo levamen quoque subinde manifestum attulit in profusione nimia menstruorum. Porro puer quatuordecim annorum ab ineunte aetate incontinentia urinae tentatus, solatium haud exiguum expertus est quotidiano usu gummi huius, in electuarium cum syrupo e meconio redacti. Frustra vero in chronica dysenteria, diabete, debilitate seminali, singularibus casibus et contra alia quoque

quoque rebellibus tentatum est (*l. c. p. 107.*).

Sed sigillatim de efficacia, quam iste in sistendis febribus intermittentibus de eo casibus duodecim expertus est, iam dicendum est. Aemulari corticem peruvianum natura sua aromatica et adstringente existimat, quam ferio-rem equidem in Kino non reperiō. Quicquid sit, in obstinatis febribus Intermittentibus varii typi, inque varia aetate medelam aliquando praestitit, cortice Peruviano antea frustra ingesto. Praemisso emetico, vel eo pro conditione varia omisso, pulveris eius scrupulus unus, vel drachma dimidia, omni quadrihorio sub apyrexia in infuso quodam theaeformi datur, vel tincturae (ex Gummi Kino unciis duabus et spiritus vini tenuioris libra una per sex dies digestis et colatis) uncia dimidia, sive drachmis sex, omni trihorio vel quadrihorio. Fidem confirmat ingenua confessio, quod tribus aliis casibus, a reliquis fortunatis non discrepantibus, voto non satisfecerit, sed corticem Peruvianum gloriam sanationis deportasse (*l. c. p.*).

In fluore albo pertinaci, non venereo, ex relaxatione locali tam magna, ut per interna remedia tolli nequeat, iniectiones ex gummi Kino. in aqua calcis soluto, conducunt; vel intrudere convenit spongiam hacce solutione madidam (THILEN. *med. und. chir. Bemerk. p. 148.*).


PRAE.

PRAEPARATA ET COMPOSITA.

Tinctura e Kino *Ph. Edinb.* 1783.
p. 112. Ex Gummi Kino unciis duabus et spiritus vini tenuioris fœsquilibra, per octo dies digestis et colatis.

Pulvis stypticus *l. c. p.* 203. Ex alumine et Gummi Kino.

Electuarium Iaponicum vulgo confectio iaponica *l. c. p.* 206. Succo Catechu, aromatibus, Opio, Gummi Kino additur; deinceps syrupus, formae causa.



23.

Pharm. KIKEKUNEMALO Gummi.

Ex America advehi (BÜCHNERI et SEEL-
MATERI *Dissert. de gummi-resinis Kikekūne-
malo etc. p. 9. Pharm. Würt. p. 125.*) lego;
sed, ex quam eius plaga vel regione, reti-
cetur. Tanto minus arbor, quae illam fundit,
nota est. Quid permoverit WEINMANNUM
(*Phytanth. tab. 294.*), quod cuidam arbori,
Cancemum ab illo dictae, quae pariter ignota
est, adscribit, adiungens, ex illo Kikekunema-
lo DIOSCORIDIS profluere, ignoro.

Molestum in hoc gummi, ut aliis vario-
ribus ignoti generis est, quod auctorum de-
scriptio adeo variet, nec specimina, quae ex
variis fontibus coram habeo, cum eorum effatis
bene congruant, licet mea tanquam genuina
mihi tradita fuerint. Qui eius inter primos
meminit, SCHENDO VAN DER BECK (in
Act. nat. curios. vol. 1. 1727. Append. p. 120.),
Gummi Copal album declarat, unde colligitur,
istum illi colorem album adscribere. Ita et
flavicans, semipellucidum, extus crusta tenuis-
sima nigricante obductum pronunciat SPIEL-
MANNUS (*Pharm. general. p. 127.*). Melius
cum


cum speciminibus meis conspirat descriptio BÜCHNERI (l. c.), colorem habere viridescentem, magis opacum esse, quam pellucidum, aemulari aspectu gummi Guaiaci; addit esse valde fragile. In meis hinc inde glebas exiguas, pellucas, albas vel flavescentes, reliquae massae opacae immerfas, conspicio; inquinata quoque sunt festucis corticis vel ligni. Naribus offert odorem gravem et debilem balsamicum, carbonibus iniectum autem fortem non ingratum odorem. Inter dentes stridet, quasi arenulae inessent, cuius vestigia visu in superficie comparent, nec compingi se patitur. Lucida flamma candela admodum ardet, simulque liquatur, relicto, ubi consumptum fuit, carbone griseo. Saporem vix nisi resinofum cum levi acrimonia linguae imprimit.

Cum aqua destillatum hanc odore forti balsamico gratoque imbuit, cui oleum aetherum albicans, odoris vel saporis balsamici, et leniter acre innatat. Ex libra dimidia eius drachmae fere duae eliciuntur. Resinosae fere naturae totum est, ita ut ex uncia eius una scrupulus modo unus gummosi extracti obtineatur. Aqua coctione eius fusca evadit, amaricans, et saporis acriusculi; item spiritus vini fuscus evadit solutione, odoris saporisque balsamici, cum leviuscula acredine. Resina inspissata eiusdem saporis et coloris albicantis est. Et haec quidem fide BÜCHNERI.

Utinam

Utinam aequae certa essent, quae inde
 concludit ad virtutem roborantem, nervinam,
 resolventem, discutientem, antispasmodicam in
 variis morbis, quorum recensio ex eius assertis
 petendi; qui et pro interno usu vel eius pul-
 verem, vel olei aetherei aliquot guttulas com-
 mendat. Ne vero deficient vera experimenta,
 en exemplum tetani in virgine ex refrigerio
 contracti, qui per quatuor dies duraverat, sed
 gutta una olei destillati per bihoria data, post
 decimum praebium sublatus est pedissequo lar-
 go sudore (GERHARD in *Diff. cit. p. 13.*);
 et aliud mali hysterici, quod eiusdem olei ope,
 iuncto suffimigio uterino, ex hac resina cessit
 (ID. *l. c.*).

Commendabile quoque est pro vernice
 alba, maxime nitida, et fere crystallina (VAN
 DER BECK *l. c.*).



LOOK *Gummi*.

Hoc quoque sic dictum gummi vix alio fine in officinis servatur, quam ut materiae medicae studio deditis praesto sit. De arbore, quae illud fundit, nihil constat. Quin ipsa patria mox Iaponia indicatur (BÜCHNERI et SEELMATTERI *Diff. de gummi resinis Kike-kunemalo, Look et Galda*, p. 15.), mox Africa (SPIELMAN. *Pharm. gener.* p. 136. item *Pharm. Würt.* p. 126.). Refert primo intuitu succinum. Est nempe durum, ut in superficie nihil deradi unguibus possit, pellucidum, in flavedinem inclinans, mox pallidiorem, mox profundiorē, fracturae superfacie splendida. Obtinet frustis multiformibus, subinde fere hemisphaericis et superfacie convexa, quasi lima rasa fuissent. Equidem nullum saporem acrem, amaricantem, vel aromaticum in eo sentio, quod tamen in dissertatione Büchneriana asseritur. Debilem resinoseum odorem spirat. Stridet comminuta inter dentes, nec mihi lentescere sub masticando visum. Ardet illico, admotum candelae, flamma lucida, simulque spumescendo liquatur inter halitus non ingratos, absque cineribus relictis. Oleum destilla-

tum.

tum erogat, sed parca quantitate, ut gummi libra dimidia scrupulum unum modo eructet. Uncia eius una continet extracti resinosi drachmas quinque; gummosi autem modo grana quindecim (BÜCHNER *l. c. p.* 16.): hinc resina iustius vocatur. Utrique acrimonia ad-iudicatur.

Auctor dissertationis allegatae ex hisce iudiciis hariolatur virtutem multiplicem in chronicis morbis, resolventem, aperientem, discutientem, depurantem, antispasmodicam; omis- sis documentis ipsa experientia suffultis. Pluries iteratur, temporibus applicatum odontalgiam et capitis dolores sanare.

==

Pharm. MYRRHA s. *Gummi*
MYRRHAE.

Ex quam arbore petatur, etiamnum nos latet. Nec sitim exstinxit cl. BRUCE itinerario suo, quod vel hocce argumento magnam sui expectationem excitaverat, quum botanica descriptione accurata arboris et figura omne de hac re diffidium in futurum diremptum iri, spes summa obtinuerat. Verum repetiit modo iisdem verbis serius (*Travels to discover the source of the Nile*, 1790. vol. 5. p. 27.), quae iam multos annos antea (1775. in *Phil. Transact.* vol. 65. P. 1. p. 408.) legenda dederat, et nomine Sassa non delineavit (in *Travels*) arborem Myrrhae, sed aliam, cuius gummi ad augendum pondus Myrrhae addi fraude solet; de qua infra pluribus. Huic cl. peregrinatori multa historica momenta de myrrha debemus. Esse ex genere Mimosae, et quidem specie, Acaciae verae propiori, suadent unice folia, utut mutilata, item cortex et spinae, quae in faccis, quibus includitur Myrrha, nonnunquam reperiuntur (BRUCE'S *Travels*, vol. 5. p. 27.). Alio igitur peregrinatori relictum

dictum est, hancce lacunam supplere. Ex Mimosa esse, alii tamen prius subolfecerunt. DIO-SCORIDES (*M. m. lib. 1. cap. 75.*). iam similem esse Aegyptiacae spinae edixit.

Σμύρνα DIOSCORIDIS, THEOPHRASTI, GAL-LENI. Vox Myrrhae Arabicae originis est. Nostra Myrrha cum ista veterum eadem est. Et hodie ex iisdem regionibus petitur, scil. ex Arabiae felicitis orientali littore, et ea Abyssiniae regione prope mare rubrum sita, quae Troglodytia appellatur (Conf. DIOSC. cum BRUCE in *Phil. Transf. cit.*). Prout olim ita et hodie Myrrha Troglodytica s. Abyssinica Arabicae praefertur. Maxima prioris copia ex Massowa, insula exigua Abyssinica, transfertur; at in universum tam exigua quantitas ob commercium gentis huius cum aliis infrequens foras venit, ut plerumque Arabica, in Chinam missa, acquiescere oporteat. Accedit, quod penuria eius sensim, ex usu quotidiano ligni arboris huius pro foco et operibus ligniariis, metuenda sit.

Integritas gummi huius ab aetate vigoreque arboris, item colligendi gummi modo, dependet. Ut optimum obtineatur, eligitur arbor iuvenis, muscoso, alioque adventitiorum stirpium tegmine libera, et supra primos ramos crassiores securi vulnerant arborem mox post cessans tempus pluviosum, et tres menses post Myrrha exstillat. Myrrha, quae primo anno per hoc vulnus affluit, est illa primi proven-
 tus,

tus, nec unquam magna copia promanat. Succus, qui semel axundare assuevit, per hanc plagam sponte fluere pergit quovis anno eodem tempore; sed pluviae tropicae tantum fordium et aquae insinuant plagae, ut secundo anno arbor putredinem eo loco concipiat, et integritate gummi inferius sit priori, eiusdemque pretium tertia parte vilius sit. Ita Myrrha ex vulneribus radici vicinis, et in truncis arborum vetustarum, secundi gradus est, et subinde peioris indolis. Haec vulgo in Italicis officinis venalis est, tanquam proba; coloris ex rubro nigricantis, sordidi; solida et gravis, et mora paxillum modo ponderis perdit, nec facile ab Arabica discernitur. Tertium et pessimum genus est, quod colligitur ex vetustis plagis, olim grandaevis arboribus inflictis, vel quod derelictum per totum annum adhaesit arbori; estque nigrum et terrei coloris ponderosum cum exiguo odore et amaritie. Indurescit Myrrha illico, postquam profluxerit, aeris tactu, nec in fluido statu remanet, etsi recentior facilius aqua solvitur (BRUCE *l. c.* p. 411.). Significat quoque DIOSCORIDES plures Myrrhae species, integritate et pretio discrepantes et numerosiores dictis; sed difficile est discrimen ad dicta referre.

Myrrha recens, nec diu servata, odorem spirat fortem, mucidum, oleosum, et in aquam proiecta globulos emittit oleosos in superficie. Hoc nontribuendum ipsi Myrrhae, sed pelli-
bus caprinis butyro oblitis, in quas sub colle-
ctio.

tionem Myrrham indunt, et intra quas in nundinas eam transferunt. Ita volatiles partes Myrrhae recentis collectae servantur, quae alias facile in iacturam ponderis, quidni et pretii, aufugerent (BRUCE *l. c. p. 412.*).

Commiscetur saepe Myrrha gummi quodam vero, ponderis augendi causa. Ita in regione Troglodytica, ubi arbor myrrhaefera crevit, alia arbor prodit, gummi cuiusdam saturate bruni ferax, Sassa dicta, et depicta a cl. BRUCE (*Travels vol. cit. duabus figuris ad p. 28.*), quae Mimosae species videtur. Valde probabile est, gummi hocce esse Opocalpasum GALENI, quo ipso commisceri aliquando innuit Myrrham, licet venenatum pronunciet, quod quidem non verisimile est. Proxime venit hoc ad naturam gummi Tragacanthae, nempe intumescit aqua, unde et additamentum hac nota detegi potest (ID.). Miscella eius quomodo facta fuerit, neque GALENUS, neque BRUCE exponit. Credidissem eam semper solo additamento frustulorum fieri, nisi DIOSCORIDES notasset. Myrrham adulterari gummi macerato aqua, in qua Myrrha maduerit, ac dermisto. Haecce adulteratio aliam, quae in Belgio fit, in memoriam revocat, nempe Myrrham gummi Cerasorum commisceri (FERBER *neve Beytr. zur Mineralgeschichte, vol. 1. p. 366. not.*). Iam intelligitur, undenam advenierint frustula ista dura, splendentia gummi Arabicum referentia, sapore et odore destituta, quae saepe intermixta reliquis verae Myrrhae.

coloris profundioris, deprehendimus, et quae reicere longe facilius est, quam si gummi verum impactum ipsi Myrrhae perpetuo esset. Bdellium additum pariter aliquando inter Myrrham conspectum est (LEWIS *Mat. med.* p. 391.). Memorant et alia additamenta, ad quae lucri cupido animum dedit (Vid. CAR-
THEUS.). Cavendum vero, ne imponat aetas arboris vel gummi diversa, de quibus differui, vel pinguedo obvolvens.

Genuina myrrha constat ex glebis variae magnitudinis et figurae, subinde nuce iuglande maioribus saepius minoribus, vel multiformibus, vel stalactitiis instar, ex condensatis depluentibus guttis induratis, rubro brunis, subpellucidis, solidis, fragilibus, externa superficie inaequalibus; fractura subnitente. Specimina maiora interne subinde distinguuntur particulis albidis, quae vel maculas in fractura s. ungues, vel strias semicirculares referunt. Sponte fragrantem gratumque odorem, saporem vero intense amarum, pungentem, cum aromatis nonnullis vestigiis, edit. Masticata dentibus sensim adhaeret, dein plurimam partem saliva solvitur, quae inde lactescit. Flammae admota, saltem in meis speciminibus, difficulter ardet cum flamma fuliginosa, strepitu, et relicto carbone griseo. Digestione calida cum aqua integre solvitur; sed prout refrigerat liquida, pars resinosa materiae fundum petit. Solutio aquosa colata profunde flavicat, sed turbida est. Extractum inde inspissatione paratum

paratnm supra $\frac{2}{3}$ constituit, servatque odorem saporemque Myrrhae (CARTHEUS *M. m. p.* 225). Spiritus vini tingitur Myrrha colore ex flavo rubicundo, dicto modo sensus feriens; inspissatione tincturae ex Myrrhae uncia una redundat extracti uncia dimidia, unde patet, gummosas partes bene multas illi immixtas fuisse (*l. c. p.* 226). Conferendo autem extractorum proportionem elucet, plus longe gummi, quam resinae, Myrrhae inesse. Insidet insuper illi oleum aethereum; aqua enim, in qua destillatur, non solum ascendit lactescens, sed oleum secum vehit, partim aquae innatans, partim fundum petens (HOFFMANN.); etenim ex optimae Myrrhae libra una quidam olei drachmas duas (HOFFM. *Obs. phys. sel. p.* 220.), alius (NEUM. *Chymie vol. 2. P. 3. p.* 381.) drachmas tres obtinuit. Alii pauciores eius quantitatem modo elicuerunt, prout SPIELMANNUS (*Mat. med. p.* 221.), qui ex dicta quantitate aliquot modo guttas olei butyracei eruit, et cl. THIELBEIN (CRELL'S *neueste Edtdeck. in der Chemie, P. 11. p.* 118.), qui vix grana quindecim olei aetherei, odoris Foeniculi, post aliquot hebdomades spissi, et rancidi, obtinuit. Oleo hocce separato, odor omnis Myrrhae perit.

Myrrha efficax antisepticum est, nam soluta in aqua ad minimum duodecies magis antisepticum est, quam sal marinum (PRINGLE *Obs. on the Diseases of the army, p.* xii.), quin sub alio experimento trigesies (*l. c. p.* xviii.).

xviii.). Integre ope aquae calcis solvitur, sicque commode variis in casibus aegris offertur.

Apud veteres potentia eius medica in magna existimatione fuit, eique vires adscripserunt, quarum quaedam vel hodie apud multos medicos celebrantur. Attamen et nostro tempore divisos eos tenet iudicium. Nec diffidendum, calidam et acrem eius naturam cautionem iniungere, si ea forma sumitur, qua omnes partes, quibus conflatur, iunctae existant, vel iusto largius ingeritur. Ita ad drachmam dimidiam vel duos scrupulos ingesta, ingratum caloris sensum in ventriculo ciet, pullum celerem reddit, et calorem per totum corpus dispergit (CULLEN *Treatise of the Mat. med. vol. 2. p. 193.*). In plethoricis igitur, cholericis, biliosis, haemorrhagiae opportunis, gravidis, febrientibus, inflammatione praesente, concedi nequit. Locum vero in flacciditate fibrarum, stimulo suo et resolvente vi; tenaces humores attenuat, et obstructions resecat. Quibusdam praeterea casibus antiputredinosa sua virtute iuvat.

Modica eius quantitas cibi appetitum augeat, et digestionem et assimilationem promoveat. Tantum tribuit beneficae eius in primas vias virtuti CARTHEUSERUS (*l. c. p. 43.*), ut nullum agnoscat Myrrha in hac re superius remedium, laudemque exemplo hypochondriaci confirmat.

Pectq.

Pectoris affectionibus chronicis, ut tussi inveteratae, asthma, dicavit eam vetustas. Accessit serioribus temporibus fiducia quorundam in hectica, a causa pulmonali et exulcerationibus pulmonum; item in aliis. In diagnosi horum morborum quum labi facile sit, et gradus eorum varii, naturaque ipsius aegri diversa, non uni tramiti insistere concedat: non mirum, de salubritate huius disputari valdopere. Suasu CARTHEUSERI (*l. c. p. 37. sq.*) usus est Myrrha creberrime manducata vir quidam litteratus, ad phthisin ex hereditate proclivis, et respiratione difficili, cum tussi mox sicca mox salsa et mucosa stipata, dein haemoptysi correptus, et phthisi proximus, eo successu, ut hac sola, in connubio probae diaetae, valetudinem recuperaret; quo in casu et aliis similibus, quibus hic medicus illam exhibuit, ob restauratum tonum partium solidarum, nominatim pulmonum, effectum suum exserere visa est. In Anglia pluribus medicis celebrati nominis accepta in rabificis morbis medela est. Displicet mihi connubium Myrrhae et spermatis ceti, diu in nosocomio Goy usitatum (Vid. SAUNDERS in nota ad SIMMONS'S *Pract. Observ. on the treatment of consumptions*, p. 38.); nec mixturae Myrrhae cum nitro et vitriolo maris, vel similes, Mirham continentem, quibus indulgit cl. GRIFFITH (*Observ. on the cure of hectic and slow Fevers, and the pulmonary consumption*, Lond. 1776.), quibus multi in Anglia subscribunt, censura sua caruerunt (V. SAUNDERS *l. c.* PAULIZKY

medicin. pract. Beobacht. 2. Samml. p. 111.), Placet tamen Myrrha cl. SAUNDERS ex faepissime repetita experientia, in hecticis febribus ex debilitate, in quibus pulsus debilis et celer, et aeger valde irritabilis est; cui tribui adiudicat hecticam puerperarum; item in aliis hecticis, quae virium prostrationem comitem habent, et praeternaturalem calorem cutis absque violenta febris accessione; item in iis, quae ex apparente respiratione puris ulcerum mali moris, amputatorum membrorum etc. exortae sunt, in quibus ex usu interno Myrrhae pus correctum fuit. Facile concipitur, quod ille, haemoptysi incidente, vel sub inflammatoria periodo pulmonalium morborum, concedi non potuerit, attamen suppuratione et periodo debilitatis iam praesente conducere, iste putat; in vera phthisi autem rarissime succedere vidit, et in multis omittere Myrrham coactus fuit, et ad tutiora transgredi. Cl. REID (*Essay on the nature and cure of the Phthisis pulmonalis, ed. 2. p. 211.*), qui aliquando Myrrham probo eventu in affectionibus pulmonum obtulit, negat tamen, in confirmata hectica levamen ullum asferre, indeque potius symptomata augeri, prout in qualibet inflammatoria affectione; conducere aliquando in hoc malo tonica sua virtute, quam in primis viis exerit; et in magna infirmitate et languore infusum Myrrhae cum aqua calcis factum commendat. Multum extracto aquoso ad drachmam unam cum sacchari albi uncia dimidia vel integra trito, in phthisi pulmonali tam propria, quam

quam aliorum, quibus praecipit, tribuit LÖSE-KE (*Abhandl. der auserles. Arzneymittel*, ed. 3. p. 404.), licet peculiariora momenta non determinet. Et cl. FRITZE (*Mediz. Annalen*, vol. 1. p. 212.) eo tantum studio illam exhibet, quo inflammatio pulmonum in suppurationem transit, pulsu non celeri, absente tussi et haemoptysi, plerumque admixtam decocto lichenis Islandici. Negari enim nequit, gummosum extractum minori gradu calefacere, quam Myrrham integram, vel essentiam; ut tamen memineras, nec istud destitui omnibus resinosis et oleosis particulis. Excludere videtur ill. CULLEN (*l. c. p. 194.*) Myrrham omnino ab hæctica et phthisica febre, metuens calidam eius naturam, et proficitur, nunquam beneficium inde percepisse, saepe autem manifestum damnum.

Inter emmenagoga multorum consensu potiore aliquem locum sibi vindicat, ita ut sub horum capite in libris, qui medicamenta secundum vires dispertiunt, plerumque comprehendatur. In flacidityte fibrarum stimulo suo, et pituitosa diathesi vi sua roborante aliquando in menstruis ciendis valet. Vix vero potentiam aliquam peculiarem ad uterinas vias sanguinem determinandi habet (Conf. CULLEN *l. c. p. 193.*). De usu in lochiis idem sentiendum est.

In febre alba SYDENHAMI s. cholerosi conducit saepe connubium eius cum martialibus, et subinde Myrrha cum successu usurpatur doloribus acutis tenerarum foeminarum, vago intervallo redeuntibus; cuius census sunt cephalalgia, affectiones musculorum, rheumatismos simulantes apud hystericas (SAUNDERS apud SIMMONS *l. c.*).

Ulcerum sanationem adiuvat saepe egregie. Constitit id in aliquot empycis post paracentesin pectoris, essentia Myrrhae iniecta; item in suppuratione hepatis ex lapsu, eadem medicina adhibita (SCHLICHTING in *Act. nat. curios. vol. 6. p. 115.*). Ulcus ex bombardae explosione in manu natum immorigerum valdeque foetens, dilutiori essentia applicata coaleuit; virum autem correptum ulcere renis dextro cum lotio pus fundente, Myrrha vel masticata, vel cum melle Rosarum in electuarium redacta, curavit (CARTHEUS *l. c. p. 49.*). Inspergitur etiam pulvis eius ulceribus cariosis, putridis, quin gangraena affectis. Magni in hisce casibus facienda est eius depurandi ulcus et putredinem refrænandi vis; nocet vero aliquando stimulo suo.

Pluribus exemplis iam significavi, qua ratione tam interne quam externe administrari queat. Sed iunctim proponendi diversi eam adhibendi modi, quorum haud pauci intra praeparata locum habent. Simplicissima ratio haec est, quod ore teneatur, nec alia pars de-

deglutiat, quam quae saliva solvatur, reliquum solutioni resistens exspuatur. Sic, praeter indissolubilem terram, et resinae bona pars, quae irritat et calefacit, segregatur. Eundem finem extracti aquosi praeparatio habet, quod Myrrha longe mitius est. Pulveres, solutiones, pilulae, trochisci sub vario connubio, quod scopum promovet, parari possunt. Praeter solutionem Myrrhae in aqua calcis, placet quibusdam solutio in cerevisia saturata (Vid. BERNHARD *chem. Erfahr. p. 284. sq.*).

PRAEPARATA ET COMPOSITA.

Essentia Myrrhae *Pharm. Würt. p. 83.* Ex Myrrha digesta spiritu vini. Valde calida; hinc interno usui non opportuna. Externi varia supra documenta adfuerunt, quae tamen cautionem superfluum non reddunt. Ne spiritus irriter, e re est, eius supra dimidium antea evaporare. Confert roborando in ulceribus nimis suppurantibus, item in vulneribus partium nervosarum et aponeuroticarum.

Essentia Myrrhae alcalifata *L. c. p. 83.* Praeter aquosum et spirituosum menstruum et alcali adhibetur. Ob alcalini stimulum nonnisi in putridis lardosisque ulceribus locum habet.

Extra-

Extractum Myrrhae aquosum *Ph. W. p. 93.* Ibi paratur ope Liquoris nitri fixi; unde et multum resinae contineat, necesse est. Magis placet praeparatio *Ph. Brunsv. p. 255.*, quae alcali omittit, hinc ea extractum a resina magis liberatum exstat.

Elaeosaccharum Myrrhae *Ph. Brunsv. p. 213.* Ex extracto dicto et saccharo.

Oleum seu liquor Myrrhae per deliquium *Ph. W. p. 126.* Solvitur pars Myrrhae, illam ovo ad duritiem cocto et discisso, postquam vitellus exemptus fuerit, immittendo. In putredinem valde proclive est; hinc servari diu non potest. Fissuras labiorum et pupillarum et oedematofarum partium consolidat, et ulcera abstergit sanatque. Cutem quoque splendidum reddit cosmetico usu.

Oleum Myrrhae destillatum. A FR. HOFFMANNO *l. c. p. 20.* magni fit. Saccharo exceptum elaeosaccharum praebet, ex eius iudicio balsamicum et pectorale, in commodo liquido contra chronica pectoris vitia, in tussi inveterata, asthmate humido, eximium. Casus sine dubio et naturae diversae cautionem iniungunt.

Trochisci de Myrrha; elixiria proprietatis; elixir aperitivum CLAUDERI; elixir balsamicum spirituosum HOFFM.; elixir pectorale WEDELI; flores sulphuris compositi; pilulae polychrestae balsamicae; pulvis dentifricius; unguentum digestivum; emplastrum de baccis lauri et sexcenta alia largae saepe compositionis officin. *Germ.* Myrrham recipiunt.

Electuarium pro dentibus EHRENRICHII in ROSENSTEINII *Hus. och Re-seapoteque*, p. 100. \mathfrak{R} . Pulv. Myrrhae unc. ij Coccinell. unc. β Spirit. vin. rectific. lib. j Digestione F. Tinctura saturatissima; coletur. Huius tinct. unc. iij add. Oxym. e Crem. tart. lib. j Ol. destill. Cinnam. gtt. xx Caieput gtt. x. M. D. Incomparabile illud ROSENSTEINIUS vocat pro censervandis gingivis; scil. pauxillum eius mane illis illinatur, et remaneat per tria ad quatuor minuta pr. vel spongia madida exceptum affricetur gingivis et dentibus, dein abluendum aqua, cuius librae uni additum cochleare spiritus vini, et salis ammoniaci drachma dimidia. Hoc etiam halitum oris foetidum nonnihil corrigit, ut tamen vera eius causa negligenda non sit.

Pharm. OLAMPI Gummi.

Mihi ne aspectu quidem cognitum est. *Pharmacopoea Würt. p. 127.* illud catalogo suo inseruit, ex quo, quae de eo narrat VOGELIUS (*Mat. med p. 318.*), exscripta sunt. Mihi non aliud iam suppetit negotium, dum SPIELMANNUM (*Pharm. gener. p. 156.*), qui plenius paullo de eo agit, ducem sequor. » Prostat, inquit, in frustis minoribus extus griseis, intus splendidis, subdiaphanis, fuscis; friabile est, tritu dentium non lentescit, insipidum, inodorum, aqua non solubile, calore non liquendum; flammae admotum ardet, suavemque odorem resinofum spirat. Ex America advehi fama est. Incongrue gummi arabico aequiparatur. „

27.

Pharm. RESINA LUTEA NOVI
BELGII.

Ita significo succum concretum luteum, in novo Belgio maris australis, et nominatim in Nova Walia australi (New South Wales) obvium, qui in expeditione inclyta Gubernatoris ARTHUR PHILLIP ad Botany bay et portum Jackson beneficium sese exhibuit.

Fundit illum arbor humilis, foliis gramineis trunco suffultis, ex quorum centro scapus emergit simplicissimus pedum duodecim vel quatuordecim, spica terminali ovato oblonga. Descripta paucis hisce et depicta, reperitur sub nomine *Yellow Gumplant* in *Voyage of Governor. PHILLIP to Botany bay 1789. p. 60. cum tab. 11.*, quae inscribitur: *View of a Hut in new South Wales* (Conf. etiam JOHN WHITE'S *Journal of a Voyage to New South Wales 1790. Götting. Anzeigen 1791. n. 6. p. 52.*).

Ex scapis parant vulgo inquilini hastas suas. Succus iste sub trunco ex terra effoditur, nec ex arbore ipsa colligitur, et coniectura fert, eundem esse, quem TASMAN vocat *Gum lac of the ground* (V. PHILLIP'S *Voyage*).

Resinosae naturae est, nam plane non aqua solvitur, et Gummi guttae primo aspectu refert, sed non inquinat. In dysenteria efficaciam suam advenis istis Anglis comprobavit, licet debiliori vi, quam alia resina eius regionis, rubra, sanguinem draconis mentiens (*l. c.*). Londini postea a cl. BLANE, medico Nosocomii St. Thomae, crebra cum ea in profluvlis alvinis pertinacibus experimenta capta sunt; nec caruerunt successu maxime conspicuo (*Voyage cit. p. 294.*).

28.

Pharm. RACKASIRA Balsamum.

In cucurbitis ex India afferri traditur (SPIELM. *Pharm. gener.* p. 176.). Equidem modo possideo eius glebas planas. Est subpellucidum luteo brunum, frigore fragile, sed calore modico emollitur; hinc inter digitos in placitas formas compingi potest, et dentibus masticando adhaeret. Sapor debilis amarus. Solidum nullum odorem spirat; ast emollitum, vel accensum, grate balsamicum ad Tolutanum nonnihil accedens. Resina merito habetur. — Sunt, qui coniiciunt, esse balsamum factitium, et forte paratum ad imitationem Balsami Commendatoris (RIEGER *Introductio in notit. rer. natural. rom.* 2. p. 87.).

Ex hodierna praxi medica nihil de eius virtutibus suppetit dicere. Est, qui illud Copaivae balsamo praetulit, et una alterave dosi gonorrhoeam sanare affirmavit (SCHENDO VAN DER BECK in *Act. nat. curios. vol.* 1. *Append.* p. 123.) Quousque locus eiusmodi balsamicis in hocce effluvio sit, alibi (Capp. de Terebinthina, balsamo Copaivae) indicavi. Hoc vero balsamum vel nomine paucissimis medicis notum est.

Paarm. SAGAPENUM s. SAGAPE-
NI Gummi.

De stirpe huius gummi id modo novimus, quod ad umbellatas pertineat. Saltem semina, quae frequenter immixta ceruntur, et licet saepius contracta compareant, tamen hinc inde integra sunt, id suadent. Nimirum ovata reperio, complanata, marginata, striata, magnitudine fere seminis Heraclei Sphondylii. Ex Alexandria et Persia transfertur.

Graecis notum fuit, et a DIOSCORIDE adscriptum plantae ferulaceae.

Spectamina, quae coram habeo, diffformes massas representant, coagmentatas ex glebis multiplicis coloris, albidis, vel rubicundis, vel saturate viridis, et magnitudinis diversae, mox magis mox minus pellucidas, quibus festucae multae lignosae vel fragmenta seminum, seu semina integra impacta sunt. Unde concludi potest, hasce particulas olim distinctas, dum gummi adhuc molle esset, accedente compressione qualicunque, in unum corpus leviori ne-

xu coivisse . Glebas istas mox duriores et fere fragiles , mox molliores instar cerae , invenio . Lego et subinde obtinere frustulis minoribus distinctis , homogeneis , rubris . Et hoc quidem scelestum et purius censendum . Hoc mollescit calore , et durius evadit frigore . Bdellio adiecto Sagapenum aliquando corrumpitur .

Odor Sagapeni fortis , ingratus , alliaceus , illi , quem assa foetida spirat , non valde dissimilis , sapor eius non adeo tamen nauseosus est , ceterum amaricans , calorisque et acrimoniae sensu linguam vellicans . Ructus quoque alliaceos post se trahit . Sub masticatione dentibus adhaeret , emollescit , albescit , deliquescit . Igne facile accenditur , ardetque flamma fuliginosa , remanente carbone nigro . Etiam hoc ex resina gummi-que commixtis constat . Resina praevalet ; nam ex Sagapeni uncia una eliciuntur extracti resinosi primi drachmae quinque cum granis sex ; ex eadem quantitate autem extracti gummosi primi drachmae modo duae cum scrupulis duobus et dimidio (NEUMAN. *Chimie* vol. 2. P. 3. p. 33.). Utrumque extractum et odore et sapore debilius est ipso Sagapeno . Destillatione cum aqua etiam oleum aethereum emittit . Lactescit aqua , qua solvitur .

Propius venit ad naturam Assae foetide , et in virtutibus istius diiudicandis pariter tam ad odoras partes , quibus nervos afficit , quam ad resolvendi potentiam , respiciendum est . Hodie rarius praecipitur , nec , si aliorum ve-

stigiis modo insistas, documenta efficaciae, nisi ex mixtis, depromi possunt. Arabes inter purgantia referunt, id quod de largiori modo copia locum habet. Quidni vero illud reponamus inter antispasmodica efficaciora, et ea, quae pituitam alicubi collectam, et obstructa vasa referant. Inter haec commemoranda seorsim eius menstrua referendi facultas. Extrinsecus quoque emplastri forma tumoribus frigidis applicatur, et in iis, quae suppurationem desiderant, maturationem adiuvat.

PRAEPARATA ET COMPOSITA.

Pilulae de obstructuentibus cum Gummatibus *Ph. Brunsv. p. 298.* Pilulae foetidae *Ph. würt. p. 69.* Unguentum fuscum *l. c.* Emplastrum magneticum *l. c.* etc. illud continent. Sed quis diludicabit vires singulorum in tanta farragine?

V. FRUCTUS et SEMINA.

30.

Pharm. MYROBALANI BELLIRI-
CAE.
CITRINAE.
CHEBULAE.
INDICE.

Numerum Myrobalanorum augment in materia medica *emblicae*, de quibus, utpote fructus stirpis iam cognitae, alibi iusta serie iam dictum est (*V. Appar. med. vol. 4.*). De reliquis specie botanica nihil certi pronunciarı potest, quin adhuc disputatur, utrum ex diversis arboribus petitaе sint, prout inter alios VESLINGIUS (in *Observat. in ALPINI pl. aegypt. p. 61.*) censet, an potius ex eadem, prout JEREM. KERNER (apud HASSELQUIST, *Reisa p. 537.*). ADANSON (*Familles des plantes, vol. 2. p. 442.*) ex arbore Malabarica, Pakel, colligi, sed dispari anni tempore, auctor est. Omnes hi fructus drupaceae naturae sunt,

sunt, qui quidem, prout nosmet eos exsiccatos servamus, magis corrugati et angulati appa-
reant, necesse est, quam recentes. In India
orientali proveniunt.

Myrobalanus Bellirica f. *Bellerica*. JAC.
BREYN. *icon. et descr. rarior. plant.* p. 18. *tab.*
4. quæ ramulum foliiferum cum fructu sistit.
Tani RHEED. *Hort. Malab. vol. 4. p. 13.*
tab. 10. Aliis est *Idon mulli* RHEED. *Hort.*
Mal. vol. 4. tab. 18.

Prostat in officinis forma oblonga f. sub-
rotunda, angulis quinque longitudinalibus,
griseo bruna, magnitudine fere olivæ.

Myrobalanus citrina. PLUKEN. *Mant.* 132.

Maior priori, rugis rarioribus, angulis
quinque prominulis. Coloris in citrinum in-
clinantis; figurae in meis speciminibus pyri-
formis.

Myrobalanus chebula. VESLING. in AL-
PIN. *de pl. aegypt.* p. 61. *tab. 62.* Agihalid
ALPIN. *de plant. aegypt.* p. 39.

Reliquarum maxima, ex tenui cervice
ovato oblonga, angulis longitudinalibus decem,
quorum alterni prominentiores, atro bruna.

Myrobalanus Indica s. *Inda*. Panel. *Hort. Malab.* vol. 2. tab. 9.

Myrobalanarum minima, longitudine circiter dimidii pollicis, atra, oblonga, quinque vel octo angulis notata, rugosa, apice acuta, basi obtusa, substantiae compactae. Deficit in hac nux, cuius in locum cavum longitudinale exiguum mediam partem occupat.

Medici Arabes primum inter medicamina Myrobalanos receperunt. Graecorum primus est ACTUARIUS, qui earum mentionem fecit. Atque hi mitiorum purgantium numero eadem adscripserunt. Hodie exoleverunt fere omnino.

Sapor omnibus et singulis insigniter austerus et amaricans. In extractis praecipue austeritas sentitur. Ita et solutio vitrioli martis earum miscela nigrescit. Adstringendi, vel si mavis, corroborandi vi itaque praeditae sunt. Moveri iis alvum blande, praeterquam testimonia antiquorum, hodiernus usus in Arabia et Aegypto, praecipue huius superiori parte, edocet (HASSELQUIST'S *Resa til heliga Landet*, p. 536.); imo in Vindobonensi nosocomio practico (V. STOLLII *Rat. med.* e. c. P. 3. p. 264. 287. 338.) seriori tempore illae aliquando in hunc finem praescripta sunt. In pulvere dosis drachmae dimidia ad quatuor assignatur, in infuso vel blandiori decocto largior ad duodecim drachmas usque. Ad alvi pro-

profluvia coërcenda et viscera roboranda,
hodie certioribus, et magis exploratis, uti-
mur.

Vix attinet, spretam hodie iure confe-
ctionem anacardinam commemorare,
in quam intrarunt singulae quinque Myrobala-
ni, vel confectionem hamech similis
tenoris, quæ cum multis aliis Myrobalanas
citrinas receperunt.

Pharm. AIAVAE Semina.

Nomen a Lusitanis illis inditum . Ex ora Malabarica transferuntur, unde navarchus quidam Anglus ante aliquot annos ea secum in Angliam sumpsit. De notis eorum per sensus cognoscendis nihil mihi constitit. In India orientali celebrantur instar efficacis medicinae contra colicam. Et in simili morbo iste, ex Goa in Angliam redux, cum amicis vicinisque suis colica detentis, illam communicavit, qui inde insigne solatium experti sunt. Ipse ille navarchus semina ista ingessit in arthritide, quae flatus comites habuit (*windy gout*), in quibus pellendis insigniter valent, eorumque auxilio fomitem a ventriculo et capite removit. Subinde simul unam vel alteram alvi dejectionem cient (V. PERCIVAL'S *Essays medical and experimental*, vol. 2. p. 226.). Sponte patet, non sufficere dicta ad veram horum seminum naturam stabiliendam, sed accedere debere novum artis periti, et ad omnia momenta attenti, scrutinium.

DESIGNATIO STIRPIUM ET PHARMACORUM

IN VOLUMINE SEXTO CONTENTORUM.

A. Stirpes in praecedentibus voluminibus omiffae, sed genere et specie cognitae, ut lege ordinum naturalium inseri possint.

<i>Nomen pharmaceuticum</i>	<i>Nomen systematicum.</i>	
18. b. Gallae turcicae.	<i>Quercus Cerris.</i>	pag. 7
31. b. Cynara.	<i>Cynara Scolymus.</i>	16
43. b. Lactuca sylvestris	<i>Lactuca virosa.</i>	18
84. b. Alypum.	<i>Globularia Alypum.</i>	22
142. b. Paris.	<i>Paris quadrifolia.</i>	25
151. b. Hypocistis.	<i>Cytinus Hypocistis.</i>	27
154. b. Aparine.	<i>Galium Aparine.</i>	29
183. b. Faba St. Ignatii.	<i>Ignatia amara.</i>	31
196. b. Viola canina.	<i>Viola canina.</i>	35
196. c. Viola tricolor.	<i>Viola tricolor.</i>	37
201. b. Cortex Peru- vianus ruber.	— —	47

201. c. Chinchina Ca-	<i>Cinchona Caribaea.</i>	59
ribaea.		
201. d. Chinchina St.	<i>Cinchona floribunda.</i>	62
Luciae.		
201. e. Chinchina de	— — —	68
St. Fè.		
201. f. Chinchina an-	<i>Cinchona angustifolia</i>	71
gustifolia.		
214. b. Rhododendron.	<i>Rhododendron Chrysan-</i>	
	<i>thum.</i>	73
310. b. Astragalus ex-	<i>Astragalus exscapus.</i>	83
scapus.		
313. b. Santali rubri	<i>Pterocarpus santalin.</i>	89
Liguum.		
313. c. Geoffroya Ja-	<i>Geoffroya Jamaicen.</i>	93
maicensis.		
313. d. Geoffroya Su-	<i>Geoffroya Surinamensis</i>	102.
rinamensis.		
315. b. Peruvianum	<i>Myroxylon perviferum.</i>	110
Balsamum.		
316. b. Balsamum To-	<i>Tolvisera balsamum.</i>	116
lutanum.		
347. b. Vitalba.	<i>Clematis Vitalba.</i>	119
374. b. Padus.	<i>Prunus Padus.</i>	123
489. Mesembryanthem-	<i>Mesembryanthemum</i>	
mum crystal-	<i>crystallinum.</i>	127
linum.	<i>Fagara octandra.</i>	130
430. b. Tacamahaca.	<i>Swietenia Mahagoni</i>	132
431. b. Swietenia.	<i>Myristica aromatica</i>	135
483. b. Nux moschata		
f. myristica.		
Macis.		

B. *Partes vegetabiles ignoti generis
vel speciei.*

I. *Radices.*

1. Calagualae, f. Calaguellae Radix.	pag.	147
2. Cassumuniar, f. Casumunar, f. Rifagon, f. Bengale Radix.	_____	150
3. Chynlen Radix	_____	152
4. Columbo, l. Calombae, f. Colombae etc. Radix.	_____	153
5. Ikan Radix.	_____	161
6. Lopez, f. Lopeziana Radix.	_____	162
7. Matalista Radix.	_____	167
8. Timac Radix.	_____	168

II. *Cortices.*

9. Angelinae Cortex.	_____	169
10. Angusturae Cortex.	_____	170
11. Bela Aye Cortex.	_____	175
12. Cortex Chinae v. Chinchinae regius f. Cortex Chinae flavus.	_____	177
13. Cortex Chinae v. Chinchinae Surinamensis.		180
14. Jubabae Cortex.	_____	181
15. Masfoy Cortex.	_____	182
16. Pocgerobae Cortex.	_____	183

III. *Ligna.*

17. Lignum Aloës, f. Agallochi veri;
 — Calambac;
 — Aspalathi. — pag. 185

IV. *Gummi et Resinae.*

18. Gummi Ammoniacum. — — 190
 19. Bdellium, f. Gummi Bdellium. — 196
 20. Caranna, f. Carannae Gummi. — 198
 21. Gummi Gaida. — — 200
 22. Gummi Kino, f. Gummi adstringens Gambiense, f. Gummi Gambiense. — 202
 23. Kakakunemalo Gummi. — 207
 24. Look Gummi. — — 210
 25. Myrrha, f. Gummi Myrrhae. — 212
 26. Olampi Gummi. — — 226
 27. Resina lutea Novi Belgii. — 227
 28. Rackasira Balsamum. — — 229
 29. Sagapenum, f. Sagapeni Gummi. — 230

V. *Fructus et Semina.*

30. Myrobalani Belliricae.
 — Citrinae.
 — Chebulae.
 — Indicae. — — 233
 31. Aiavae Semina. — — 237

INDEX ALPHABETICUS

stirpium et medicaminum, praecedentibus sex voluminibus comprehensorum; nomina cum pharmaceutica, tum systematica exhibens.

Nomina systematica *typis obliquis* distinxi. Quae autem ex his asterisco notata cernuntur, ea in officinis pharmaceuticis quoque usitata sunt.

A.

Abelmoschus, Vol. III. p.

275

Abies, I. 22.

Abrotanum foemina, I.

110

— mas, I. 95

Absynthium maritimum,

I. 105

— — ponticum,

I. 101

— — vulgare, I.

96

Acacia nostras, III. 171

— vera, II. 326

Acanthus, II. 166

Acanthus mollis, ibid.

Acetosa, IV. 247

Acetosella, III. 361

Achillea Ageratum, I. 139

— *foliis pinnatis &c.*

I. 138

— *Millefolium*, I. 135

— *Pharmica*, I. 138

Acmella, I. 110

Aconitum, III. 8

Aconitum Anthora, III.

27

— *Napellus*, III. 8

Acorus Calamus, V. 38

Acorus palustris, V. 100

— *verus*, V. 38

Adiantum aureum, V.

357

Adiantum Capillus veneris, V. 344

Aesculus Hippocastanum,

IV. 48

INDEX ALPHABETICUS :

244

- Aethusa Meum*, I. 228
Agallochi veri Lignum, VI. 185
Agaricus albus, V. 413
 — *Chirurgorum*, V. 405
 **Agaricus muscarius*, V. 400
Agaricus querhus, V. 405
Ageratum, I. 139
Agnus castus, II. 159
Agrimonia, III. 110
Agrimonia Eupatoria, ib.
Aiauae femina, VI. 237
Aiuga pyramidallis, II. 102
Alcea rosea, III. 265
Alchemilla, III. 111
Alchemilla vulgaris, ibid.
Alkanna (Anchusa), II. 84
 — *vera*, II. 72
Alkekengi, I. 582
Alliaria, II. 256
Allium, V. 93
Alium Cepa, V. 104
 — *Porrum*, V. 102
 — *sativum*, V. 93
 — *Victorialis*, V. 103
Alnus, I. 58
Aloe, (*variae species*) V. 175
Aloes Lignum, VI. 185
Althea, III. 261
Althea officinalis, ibid.
Ammi maius, I. 215
Ammi verum, I. 214
 — *vulgare*, I. 215
Ammoniacum Gummi VI. 190
Amomum, III. 230
Amomum Cardamomum, V. 50
 — *Granum paradisi*, V. 54
 — *Zingiber*, V. 44
Amygdalae amarae, III. 187
 — *dulces*, III. 180
Amygdalus communis, III. ibid.
 — *Persica*, III. 176
Amyris Elemifera, IV. 23
Amyris Opobalsamum, IV. 26
 **Anacardium occidentale*, IV. 294
Anacardium orientale, II. 156
Anagallis, II. 5
Anagallis aruensis, ibid.
Ananas, V. 138
Anchusa officinalis, II. 83
 — *tinctoria*, II. 84
Anemone Hepatica, III. 78
 — *nemorosa*, III. 71
 — *pratensis*, III. 72
Anethum, I. 237

INDEX ALPHABETICUS.

249

- Anethum Foeniculum*, I. 238
 — *graeuolens*, I. 237
Angelica Archangelica, I. 206
Angelica fativa, ibid.
Angelica sylvestris, I. 209
Angelinae cortex, VI. 169
Angusturae cortex, VI. 170
Anime, II. 347
Anisi stellati cortex, III. 413
Anisum Sinense, III. ibid.
 — *stellatum*, ibid.
 — *vulgare*, I. 245
Anserina, III. 101
Anthemis Cotula, I. 124
 — *nobilis*, I. 123
 — *Pyrethrum*, I. ibid.
Anthophylli, III. 243
Anthora, III. 27
Anthos, II. 140
Antirrhinum Linaria, II. 149
Aparine, VI. 29
Apium, I. 249
Apium graeuolens, ibid.
 — *Petroselinum*, I. 247
Aquatica nux, IV. 64
Aquifolium, IV. 11
Aquilegia, III. 5
Aquilegia vulgaris, ibid.
- Arabicum Gummi*, II. 326
Arbor vitae, I. 25
Arbutus Vua vrsi, II. 48
Arctium Lappa, I. 67
Areca Cathecu, II. 334
Argentina, III. 103
 * *Aristolochia anguicida*, I. 294
Aristolochia clematidis, I. 292
Aristolochia fabacea, II. 363
 * *Aristolochia longa*, I. 288
 * — *rotunda*, ibid.
 — *serpentaria*, I. 285
Aristolochia tenuis, I. 292
 * *Aristolochia trilobata*, I. 293
Aristolochia vulgaris, I. 292
Armoracia, II. 281
Arnica, I. 129
Arnica montana, ibid.
Arnica suedensis, I. 128
Artemisia, I. 102
Artemisia Abrotanum, I. 95
 — *Absynthium*, I. 96
 — *iudaica*, I. 92
 — *maritima*, I. 105
 — *pontica*, I. 101
Artemisia rupestris, I. 105
 — *vulgaris*, I. 102
Arthantia, II. 25
Arum, V. 38

- Arum maculatum*, ibid.
Afarum, I. 295
Afarum europaeum, I. ibid.
Asclepias Vincetoxicum,
 I. 448
Aspalathi lignum, VI. 185
Asparagus, V. 133
Asparagus officinalis, ibid.
Asperula odorata, I. 307
Asphodelus, V. 106
Asphodelus ramosus, ibid.
Asplenium Ceterach, V.
 347
 — *Ruta muraria*, V.
 348
 — *Scolopendrium*, V.
 346
 — *Trichomanoides*,
 V. 347
Affa dulcis, IV. 383
 — *foetida*, I. 197
 * *Astragalus exscapus*, VI.
 83
 — *Tragacantha*, II.
 306
Athamanta cretensis, I.
 193
 — *Oreoselinum*, I. 194
Atriplex hortensis, IV. 234
Atriplex olida, IV. 198
 — *fativa*, IV. 234
Atropa Belladonna, I. 355
 — *Mandragora*, I. 364
Avena, V. 278
Avena sativa, V. 278
Avicennia tormentosa, II.
 156
Aurantium, III. 208
Auricula muris, I. 91
 — *Iudae*, V. 421.

 B
Baccae norlandicae, III.
 114
Badian, III. 413
Balaustium, III. 191
Balsamita mas, I. 108
Balsamum Brasiliense, IV.
 37
 — *Copaivae*, ibid.
 — *Gileadense*, IV. 26
 — *Mecanum*, ibid.
 — *Peruvianum*, VI.
 110
 — *Rackasira*, VI. 229
 — *Tolutanum*, VI.
 116
 — *verum*, IV. 26
Balsamus Carpathicus, I.
 12
Barba hirci, I. 85
Barbaraea, II. 257
Bardana, I. 67
Basilicum, II. 127
Bdellium, VI. 196
Beccabunga, II. 169
Bedeguar, III. 127
Been nux, II. 321

- Behen album, I. 76
 — rubrum, I. 145
 Bella Aye cortex, VI. 175
 Belladonna, I. 355
 Bellis maior, I. 122
 Bellis minor, I. 125
 Bellis perennis, I. ibid.
 Bengale radix, VI. 150
 Benzoë, IV. 383 466
 Berberis, IV. 60
 Berberis vulgaris, ibid.
 Beta rubra, IV. 199
 Beta vulgaris, ibid.
 Betonica, II. 129
 Betonica officinalis, ibid.
 Betula, I. 55
 Betula alba, ibid.
 — Alnus, I. 58
 Bezetta coerulea, IV. 102
 Bistorta, IV. 289
 Bixa Orellana, III. 287
 Boletus igniarius, V. 405
 — laricis, V. 413
 — suaueolens, V. 410
 Bombax, III. 268
 Bonus Henricus, IV. 191
 Borago, II. 80
 Borago officinalis, ibid.
 Borstorphiana poma, III. 131
 Botrys mexicana, IV. 195
 — vulgaris, IV. 193
 Bovista, V. 422
 Branca ursina, (perperam) I. 210
 — ursina, (vulgo) II. 166
 Brassica capitata alba et rubra, II. 266
 Brassica Eruca, II. 273
 — Napus, II. 271
 Brassica oleracea, II. 266
 — rapa, II. 270
 Britanica herba, IV. 244
 Bromelia Ananas, V. 138
 Brucea antidysenterica, VI. 170
 — ferruginea, ibid.
 Bruscus, I. 280
 Bryonia, I. 345
 Bryonia alba, ibid.
 Bubon Galbanum, I. 216
 — macedonicum, ibid.
 Buglossum, II. 83
 Bupleurum rotundifolium, I. 251
 Bursa pastoris, II. 286
 Buxus, IV. 187
 Buxus sempervirens, ibid.
- C.
- Cacao, III. 276
 Cactus Opuntia, III. 250
 Caieput (oleum), III. 233
 Calagualae f. Calaguellae radix, VI. 147

- Calamintha*, ll. 108
Calamus Rotang, V. 219
Calamus vulgaris, V. 38
Calcatrippa, ll. 29
Calcitrapa, I. 80
Calendula, I. 143
Calendula officinalis, ibid.
Calombae f. *Calumbae*
Radix, VI. 153
Cambogia Gutta, IV. 78
Campachense lignum, ll. 345
Camphora, IV. 317
Camphorata, IV. 237
Camphorosma Monspeliensis, ibid.
**Canella alba*, IV. 401
Canella malabarica, IV. 314
Cannabis, IV. 430
Cannabis sativa, ibid.
Caoutschuc, IV. 122
Capillus veneris, V. 344
Capparis, ll. 247
Capparis spinosa, ibid.
Capsicum annuum, I. 392
Caranae Gummi, VI. 198
Cardamine, ll. 258
Cardamine pratensis, ibid.
Cardamomum, V. 50
Cardiaca, ll. 147
Cardopatia, I. 72
Carduus Mariae, I. 69
Carduus marianus, ibid.
Carduus benedictus, I. 78
— — *tomentosus*, I. 70
Carex arenaria, v. 226
Caricae, IV. 409
Carlina, I. 72
Carlina acaulis, ibid.
Carpathicus Balfamus, I. 12
Carpobalsamum, IV. 26
Carthamus, I. 73
Carthamus tinctorius, ibid.
Carum, I. 240
Carum Carui, I. ibid.
Caryophyllata, ll. 92
Caryophylli aromatici
— 243
Caryophylli rubri, ll. 369
Caryophyllus aromaticus, ll. 243
Cascarillae cortex, IV. 94
Cassia, ll. 319
— — *caryophyllata*, ll. 229
Cassia Fistula, ll. 319
Cassia fistularis, ibid.
— — *lignea*, IV. 314
Cassia Senna, ll. 313
Cassiae Flores, IV. 297
Cassumunar f. *Casumunar*, VI. 150
Castanea, I. 41
Cataputia maior, IV. 77

- minor, IV. 74
 Catechu, II. 334
Centaurea benedicta, I. 78
 — *Behen*, I. 76
 — *Calcitrapa*, I. 80
 — *Cyanus*, I. 75
Centaurium minus, II. 18
Centumnodia, IV. 193
Cepa, V. 104
Cerasa nigra, III. 154
 — *rubra*, III. 15
Ceratonis siliqua, II. 349
Cerefolium, I. 230
Ceterach, V. 347
Chacarillae cortex, IV. 94
Chaerophyllum, I. 230
Chaerophyllum silvestre,
 I. 233
Chamaedrys, II. 99
Chamaeleon album, I. 72
Chamaemelum nobile, I.
 123
 — — *vulgare*, I. 117
Chamaemorus, III. 116
Chamaepitys, II. 101
Chamomilla nostras, I.
 117
 — *romana*, I. 123
Cheiranthus Cheiri, II. 274
Cheiri, *ibid.*
 * *Chelidonium maius*, II.
 242
Chelidonium minus, III.
 70
Chenopodium ambrosioides, IV. 195
 * — *anthelminticum*,
 IV. 197
 — *Bonus Henricus*,
 IV. 191
 — *Botrys*, IV. 193
 — *Vulvaria*, IV. 198
China (Radix), I. 278
China f. Chinchina (Cortex), I. 450
Chinchina angustifolia,
 VI. 71
 — *Caribaea*, VI. 59
 — *Jamaicensis*, VI.
 59
 — *de Santa Fé*, VI.
 68
 — *St. Luciae*, VI.
 62
 — *rubra*, VI. 47
Chrysanthemum Leucanthemum, I. 122
Cbynlen Radix, VI. 152
Cicer, II. 300
Cicer arietinum, *ibid.*
Cichoreum, I. 81
Cichoreum Endivia, I. 83
 — *Intybus*, I. 81
Cicinum oleum, IV. 121
Cicuta, I. 176
 — *aquatica*, I. 223
Cicuta virosa, *ibid.*
Cicutaria, I. 233

- Cinae semen, I. 92
 Cinamomum f. Cinnamomum, IV. 297
 Cinchona angustifolia, VI. 71
 — Caribaea, VI. 59
 — floribunda, VI. 62
 — officinalis, I. 450
 Cissampelos Pareira, I. 282
 Cistus creticus, III. 377
 Citrullus, I. 331
 Citrus, III. 194
 Citrus Aurantium, III. 208
 — medica, III. 194
 Clematis recta, III. 79
 — Vitalba, VI. 119
 Coccognidium, IV. 445
 Cocculus Indus, I. 281
 Cochlearia, II. 275
 Cochlearia Armoracia, II. 281
 — officinalis, II. 275
 Cocos butyracea, V. 9
 Coffea, I. 317
 Coffea arabica, ibid.
 Colchicum, V. 143
 Colchicum autumnale, ibid.
 — illyricum? V. 159
 Colocynthis, I. 335
 Colubinum lignum, I. 400
 Colombo f. Colombae f. Columbæ Radix, VI. 153
 Conessi (cortex), I. 446
 Conserva rivularis, V. 397
 Conium maculatum, I. 176
 Consolida maior, II. 78
 — media, II. 102
 — regalis, III. 29
 Contrayerva, IV. 405
 Contra Semen, I. 92
 Conuallaria maialis, V. 190
 — Polygonatum, V. 192
 Conuoluulus Ialappa, I. 414
 Conuoluulus maior albus, I. 420
 Conuoluulus Mechoacan, I. 418
 — Scammonia, I. 408
 — sepium, I. 420
 — Soldanella, I. 422
 — Turpethum, I. 421
 Conyza coerulea, I. 142
 — media, I. 128
 Copaisera officinalis, IV. 37
 Copaivæ balsamum, ibid.
 Corallina Cersicana, V. 392
 Corallina rubra, V. ibid.
 — Melitocotton, ibid.
 Cordia Myxa, II. 88
 Coriandrum, I. 229
 Coriandrum sativum, ibid.
 Cortex Angelinae, VI. 169

- Angusturae, VI. 170
 — Bela Aye, VI. 175
 — Chinae flavus f. regius, VI. 177
 — Chinae Surinamen-
 sis, VI. 180
 — Chinchinae, vid.
 Chinchina.
 — Iubabae, VI. 181
 — Lauola, III. 426
 — Magellanicus, IV.
 395
 — Massoy, VI. 182
 — Peruvianus, I. 450
 — Peruv. ruber, VI.
 47
 — Poegerebae, VI.
 183
 — Winteranus, IV.
 401
 Corylus, I. 53
 Corylus Avellana, ibid.
 Costus amarus, V. 64
 *Costus arabicus, ibid.
 Costus dulcis, V. 64
 Cotula foetida, I. 124
 Crepitus lupi, V. 422
 Crocus sativus, ibid.
 Croton Cascarilla, IV.
 94
 — lacciferum, IV. 111
 Croton Tiglium, IV. 109
 — tinctorum, IV. 102
 Cubebae, V. 35
 Cucumis, I. 334
 — asininus, I. 341
 Cucumis Colocynthis, I.
 335
 — Melo, I. 332
 — sativus, I. 334
 Cucurbita, I. 330
 Cucurbita Citrullus, I. 331
 — lagenaria, I. 329
 — Pepo, I. 330
 Culilawan, IV. 372
 Cuminum Cyminum, I.
 219
 Cupressus, I. 26
 Cupressus sempervirens,
 ibid.
 *Curcuma longa, V. 59
 Curcuma rotunda, ibid.
 Cuscuta, I. 160
 Cuscuta Epithymum, I.
 161
 — europaea, I. 160
 Cyanus, I. 75
 Cyclamen, II. 24
 Cyclamen europaeum, ibid.
 Cydonia, III. 144
 Cyminum, I. 219
 Cynara, VI. 16
 Cynara Scolymus, ibid.
 Cynoglossa, II. 85
 Cynoglossum officinale,
 ibid.
 Cynomorium coccineum,
 I. 65

Cynosbatos, III. 127

**Cyperus longus*, V. 230

**Cyperus rotundus*, V. *ibid.*

Cytinus Hypocistis, VI.

27

D.

Dactyli, V. 12

Daphne Gnidium, IV.

453

— *Laureola*, IV. 445

— *Mexereum*, IV. 445

Datura Stramonium, I.

376

Daucus Carota, I. 172

Daucus creticus, I. 193

— *fativus*, I. 172

— *sylvestris*; *ibid.*

Delphinium Consolida, III.

29

— *Staphisagria*, III.

30

Dentaria, I. 423

**Dictamnus albus*, III. 83

Dictamnus creticus, II.

115

Dianthus Caryophyllus,

III. 369

Dieruilla, I. 317

Digitalis, I. 404

Digitalis purpurea, *ibid.*

Dolichos pruriens, II. 289

Doronicum, I. 133

Doronicum Pardalianches

ibid.

Dorsternia Drakena, IV.

405

— *Houstoni*, *ibid.*

Dracocephalum Moldavi-

ca, II. 129

Draconis Sanguis, V. 219

Drosera rotundifolia, III.

367

Dulcamara, I. 349

E.

Ebulus, IV. 19

Elaterium, I. 341

Elemi IV. 23

Eleuteriac Cortex, IV.

94

Endivia, I. 83

Enula, I. 126

Epidendrum Vanilla, V.

216

Epithymum, I. 161

Equisetum, V. 349

Equisetum aruense, *ibid.*

Erigeron acre, I. 142

Eruca, II. 273

Ervum, II. 299

Eruum Erailia, *ibid.*

— *Lens*, II. 298

Eryngium, I. 170

Eryngium campestre, *ibid.*

Erysimum, II. 255

Erysimum Alliaria, II.

256

— *Barbarea*, II. 257

— *officinale*, II. 255

- Esula maior*, IV. 77
 ——— *minor*, IV. 76
Eupatorium, l. 108
Eupatorium cannabinum,
 ibid.
Euphorbia antiquorum,
 IV. 66
 ——— *canariensis*, ibid.
 ——— *Cyparissias*, IV. 76
 ——— *Lathyris*, IV. 74
 ——— *officinarum*, IV. 66
 ——— *palustris*, IV. 77
Euphorbii Gummi, IV.
 66
Euphrasia, ll. 151
Euphrasia officinalis, ibid.

 F.
Faba, ll. 297
Faba crassa, ll. 254
 ——— *Pechurim* f. *Pecuris*
 f. *Pichurim*, IV. 390
 ——— *St. Ignatii*, VI. 31
Fabaria, ll. 254
Fagara octandra, VI. 130
Fagus, l. 42
Fagus Castanea, l. 41
 ——— *sylvatica*, l. 42
Farfara, l. 114
Ferula Assa foetida, l.
 197
Ficus Carica, IV. 409
Filipendula, ll. 90
Filix foemina, V. 342
Filix mas, V. 328
Flammula, ll. 67
 ——— *Jouis*, ll. 79
Foeniculum aquaticum,
 l. 220
 ——— *vulgare*, l. 238
Foenugraecum, ll. 311
Fragaria, ll. 106
Fragaria vesca, ibid.
Frangula, IV. 8
Fraxinus, ll. 392
Fraxinus excelsior, ibid.
 ——— *Ornus*, ll. 397
Fraxinus rotundifolia, ll.
 397
Fucus Helminthochorton,
 V. 392
 ——— *vesiculosus*, V. 387
Fumaria, ll. 359
Fumaria bulbosa, ll. 363
 ——— *officinalis*, ll. 359
Fungus melitenensis, l. 65
 ——— *roseus*, ll. 127
 ——— *salicis*, V. 410
 ——— *sambucinus*, V. 421

 G.
Galagga maior, V. 356
 ——— *minor*, ibid.
Galbanum, l. 216
Galda gummi, VI. 200
Galega, ll. 309
Galega officinalis, ibid.
Galium album, l. 307

- Galium Aparine*, VI. 29
Galium luteum, l. 305
Galium Mollugo, l. 307
 — *verum*, l. 305
Gallae turcicae, VI. 7
Gambienſe Gummi, VI. 202
Gambogium, IV. 78 463
Garcinia Mangostana, III. 385
Genipl album, l. 105
 — *verum*, l. 138
Geniſta, II. 291
Geniſta canarienſis, II. 293
Gentiana alba, l. 203
Gentiana Centaurium, II. 18
 — *lutea*, II. 13
Gentiana rubra, *ibid.*
 **Geoffroya Jamaicenſis*, VI. 93
 * — *Surinamenſis*, VI. 102
 **Geranium moſchatum*, III. 290
 * — *robertianum*, *ibid.*
 **Geum rivale*, III. 99
 * — *urbanum*, III. 92
Ginſeng, l. 271
Glecoma hederacea, II. 142
Globularia Alypum, VI. 22
Glycyrrhiza, II. 302 306
Glycyrrhiza echinata, II. 306
 — *glabra*, II. 302
Gnaphalium, l. 92
Gnaphalium arenarium, *ibid.*
 — *dioicum*, *ibid.*
Goffypium, III. 268
Goffypium herbaceum, *ibid.*
Gramen (Radix), V. 262
Grana Paradifi, V. 54
Granatum, III. 191
Gratiola, II. 160
Gratiola officinalis, *ibid.*
Guaiacum, III. 292
Guilandina Moringa, II. 322
Gummi adſtringens, VI. 202
 — *Ammoniacum*, VI. 190
 — *Anime*, II. 347
Gummi arabicum, II. 326
 — *Bdellium*, VI. 196
 — *Carannae*, VI. 198
 — *cerasorum*, III. 151
 — *Euphorbii*, IV. 66
 — *Galda*, VI. 200
 — *Gambienſe*, VI. 202
 — *Guttae*, IV. 78 463
 — *Kikakunemalo*, VI. 207

— Kino, VI. 202
 — Laccae, IV. 111
 — Look, VI. 210
 — Myrrhae, VI. 212
 — Olampi, VI. 226
 — Sagapeni, VI. 230
 — Senegal, II. 333
Guttaefera vera, IV.

463

H.

Haematoxylum campechianum II. 345
Hedera arborea, I. 253
Hedera Helix, *ibid.*
Hedera terrestris, II. 142
Heliotropii succus, IV.

102

Helleborus albus, V. 107
 **Helleborus foetidus*, III.

56

* — *niger*, III. 37
 * — *viridis*, III. 55

Helminthochorton, V. 392
Hepatica nobilis, III. 78
Heracleum Sphondylium,
 I. 210

Herba britannica, IV. 244
Hermodactylus, V. 159
Herniaria, IV. 235
Herniaria glabra, *ibid.*
Hibiscus Abelmoschus, III.

275

Hieracium Pilosella, I.

91

Hippocastanum, IV. 48
Hirundinaria, I. 448
Hispidula, I. 92
Hordeum, V. 262
Hordeum distichon, V. 262
Hordeum vulgare, *ibid.*
Humulus Lupulus, IV. 440
Hydrolapathum, IV. 244
Hydropiper, IV. 291
Hymenaea Courbaril, II. 347

Hyoscyamus, I. 367.

**Hyoscyamus albus*, I. 375

— — *niger*, I. 367

Hypericum III. 380

Hypericum perforatum,
ibid.

Hypocistidis fuceus, VI.

27

Hyssopus, II. 110

Hyssopus officinalis, *ibid.*

I.

Ialappa, I. 414
Iaponica terra, II. 334
Iasminum, II. 29
Iasminum officinale, II. *ibid.*
Iatropa Curcas, IV. 119
 — — *elastica*? IV. 122
Ignatia amara, VI. 31
Ignatii Faba, *ibid.*
Ikan Radix, VI. 161
Ilex Aquifolium, IV. 11
Illicium anisatum, III. 413
Imperatoria, I. 209

- Imperatoria Ostruthium*, Ladanum, III. 377
 l. ibid. * *Lamium album*, II. 146
Inula dysenterica, I. 128 *Lapathum acutum*, IV. 243
 — *Helenium*, I. 126 *Laserpitium latifolium*, I.
 — 203
Ipecacuanha, I. 430 — *Siler*, I. 204
 * *Iris Florentina*, V. 193 *Lavendula*, II. 112
 — *Germanica*, V. 196 *Lavendula Spica*, ibid.
Iris nostras, ibid. — *Stoechas*, II. 114
 — *palustris*, V. 200 *Laurocesarus*, III. 156
Iris Pseudacorus, ibid. *Laurus*, IV. 374
Islandicus Muscus, V. *Laurus Benzoin*, IV. 379
 360 — *Camphora*, IV. 317
Iubae cortex, VI. 181 — *Cinnamomum*, IV.
Juglans, I. 45 297
Juglans regia, ibid. — *Culiwan*, IV. 372
Iuiubae, IV. 9 — *nobilis*, IV. 374
Juniperus, I. 27 — (*Pechurim* ?),
Juniperus communis, ibid. IV. 390
 — *Lycia*, I. 31 — *Sassafras*, IV. 379
 — *Sabina*, I. 33
- K
- Kaieput oleum*, III. 233
Kikekunemalo Gummi,
 VI. 207
Kino Gummi, VI. 202
- L.
- Lacca*, IV. 111
Lactuca, I. 88
Lactuca sativa, ibid.
Lactuca sylvestris, VI.
 18
Lactuca virosa, ibid.
- Leonurus Cardiaca*, II. 147
Lepidium sativum, II. 281
Livisticum, I. 204
Lichen aphthosus, V. 378
 * — *caninus*, V. 379
Lichen cinereus terrestris,
 ibid.

Lichen cocciferus, V. 282

* — *islandicus*, V. 360

— *plicatus*, V. 387

Lichen pulmonarius, V. 375

* — *pyxidatus*, V. 282

— *Rocella*, V. 385

— *saxatilis*, V. 358

Lignum Agallochi, VI.

185

— *Aloës*, *ibid.*

— *Aspalathi*, *ibid.*

— *Calambac*, *ibid.*

— *Campechense*, II.

345

— *Moluccense*, II. 109

— *nephriticum*, II.

322

— *Pavanae*, IV. 109

— *Rhodium*, II. 293

— *sanctum*, III. 292

— *Santali rubri*, VI. 80

— *Sappan*, II. 345

— *Serpentum*, I. 285

Ligusticum Levisticum, I.

204

Lilium album, V. 69

Lilium candidum, *ibid.*

Lilium Conualium, V.

190

Linaria, II. 149

Lingua avis, III. 392

— *ceruina*, V. 346

Linnaea, I. 327

Linnaca borealis, *ibid.*

Vol. VI.

Linum, III. 348

* *Linum catharticum*, III.

460

— *usitatissimum*, III. 348

Liquidambar, I. 54

Liquidambar styraciflua,

ibid.

Lithospermum, II. 82

Lithospermum officinale,

II. *ibid.*

Lobelia, I. 424

Lobelia syphilitica, *ibid.*

Lonicera Dieruilla, I. 317

— *Periclimenum*, I.

316

Look Gummi, VI. 210

Lopez Radix, VI. 162

Luiula, III. 361

Lupinus, II. 288

Lupinus albus, *ibid.*

Lupulus, IV. 440

Lycoperdon Bovista, V.

422

Lycopodium, V. 351

Lycopodium clavatum,

ibid.

— *Selago*, V. 356

Lusimachia Nummularia,

II. 11

Lysimachia purpurea, III.

374

Lythrum Salicaria, *ibid.*

M.

Macis, VI. 135

R

- Mgellanicus Cortex, IV. 395
 Mahagoni, VI. 132
 Maiorana, II. 117
 Malabathrum, IV. 314
 Malva arborea, III. 265
 Malva sylvestris, III. 266
 Malva vulgaris, ibid.
 Mandragora, I. 364
 Mangostana, III. 385
 Manna, III. 397
 Maranta Galanga, V. 56
 Marrubium album, II. 132
 Marrubium vulgare, II. ibid.
 Marum verum, II. 90
 Massoy Cortex, VI. 182
 Mastix, I. 62
 Matalista Radix, VI. 167
 Matricaria, I. 121
 Matricaria Chamomilla, I. 117
 — Parthenium, I. 121
 Matrifylva, I. 307
 Mecca Balsamum, IV. 26
 Mechoacanna, I. 418
 Melaleuca Leucadendron, III. 233
 Melilotus, II. 310
 Melissa Calamintha, II. 108
 Melissa canariensis, II. 129
 — citrina, II. 106
 Melissa officinalis, ibid.
 Melissa turcica, II. 129
 Melissophyllum, II. 109
 Melitis Melissophyllum, ibid.
 Melo, I. 332
 Menispermum Cocculus, I. 281
 *Mentha crispa, II. 120
 * — piperita, II. 124
 — Pulegium, II. 126
 * — sylvestris, II. 125
 Menyanthes trifoliata, II. 26
 Mercurialis, IV. 160
 Mercurialis annua, ibid.
 *Mesembryanthemum crystallinum, VI. 127
 Mespili, III. 147
 Mespilus germanica, III. ibid.
 Meu s. Meum athamanticum, I. 228
 Mezereum, IV. 445
 Miliun, V. 311
 — solis, II. 82
 Millefolium, I. 135
 Mimosa Cate, II. 334
 — nilotica, II. 326
 — Senegal, II. 333
 Moluccense Lignum, IV. 109
 Momordica Elaterium, I. 341
 Morfus

INDEX ALPHABETICUS.

259

- Morsus diaboli*, l. 147
Morus, IV. 422
Morus nigra, ibid.
Moschata nux, VI. 135
Moxa Japonica, l. 103
Mungos, l. 308
Muscus arboreus, V. 387
 — *caninus*, V. 379
 — *clavatus*, V. 351
 — *cranii humani*, V. 358
 — *cumatilis*, V. 378
 — *erectus*, V. 356
 — *issandicus*, V. 360
 — *pyxidatus*, V. 382
Myrica Gale, l. 59
Myristica aromatica, VI. 135
Myristica nux, ibid.
Myrobalanus bellirica, VI. 233
 — *chebula*, ibid.
Myrobalanus citrina, VI. 233
 — *emblica*, IV. 93
 — *indica*, VI. 233
Myroxylon peruiferum, VI. 110
Myrrha, VI. 212
Myrtillus, II. 63
Myrtus, III. 228
 — *brabantica*, l. 59
Myrtus caryophyllata, III. 329
- *communis*, III. 228
 — *Pimenta*, III. 230
- N.
- Napellus*, III. 8
Naphae flores, III. 208
Napus, II. 271
Nardus, V. 322
Nasturtium aquaticum, II. 250
 — *hortense*, II. 284
 — *indicum*, IV. 58
Nepeta, II. 128
Nepeta Cataria, ibid.
Nephriticum lignum, II. 322
Nerium antidyfentericum, l. 446
Nicotiana, l. 383
Nicotiana Tabacum, ibid.
Nigella, III. 31
Nigella sativa, ibid.
Ninfi, l. 212
Norlandicae baccae, III. 114
Nummularia, II. 11
Nux aquatica, IV. 64
 — *barbadensis*, IV. 119
 — *Been*, II. 322
 — *catartica americana*, IV. 119
 — *moschata f. myristica*, VI. 135
 — *vomica*, l. 399

* *Nymphaea alba*, III.

390

O.

Ocimum Basilicum, II.

127

Olea europaea, II. 31

Olampi Gummi, VI.

226

Olibanum, I. 31

Olivae, II. 31

Ononis, II. 295

Ononis aruensis, *ibid.*

Onopordon Acanthium, I.

70

Ophiorrhiza Mungos, I.

308

Ophioxylum serpentinum,

I. 315

Opium, II. 175

Opobalsamum; IV. 26

Opopanax, I. 235

Opuntia, III. 250

Orchis bifolia rel., V.

213

Orchis mascula rel., V.

203

— *Morio**, *ibid.*

Oreoselinum, I. 194

* *Origanum creticum*, II.

116

— *Dictamnus*, II. 115

— *Maiorana*, II. 117

* — *vulgare*, II. 116

Orleana terra, III. 287

Oryza, V. 314

Oryza sativa, *ibid.*

Oxalis Acetosella, III. 361

Oxycoccos, II. 62

Oxylapathum, IV. 243

P.

Padus, VI. 123

Paeonia, III. 33

Paeonia officinalis, III. *ibid.*

Palma Christi, IV. 14:

Palmae Oleum, V. 9

Panax quinquefolium, I.

271

Panicum Italicum, V.

311

— *miliaceum*, V. *ibid.*

Papaver album, II. 175

— *erraticum*, II.

173

— *nigrum*, II. 175

* *Papaver Rhoeas*, — II.

173

— *somniferum*, II.

175

Paralysis, II. 21

Pareira brava, I. 282

Parietaria, IV. 404

Parietaria officinalis, *ibid.*

Paris, VI. 25

Paris quadrifolia, *ibid.*

Parthenium, I. 121

Passulae maiores, I. 257

— *minores*, *ibid.*

INDEX ALPHABETICUS.

26r

Pastinaca, l. 234

Pastinaca Opopanax, l. 235

Pastinaca sativa, l. 234

Pavanae Lignum, IV. 109

Pechurim Cortex, IV. 390

— *Faba*, IV. *ibid.*

Pecuris, *vid.* *Pechurim*.

Penaea mucronata, l. 163

Perfoliata, l. 251

Perfica, III. 176

Perficaria urens, IV. 291

Peruvianus Cortex, l.

450

— — — *ruber*, VI.

47

Pes-Cati, l. 92

Petasites, l. 113

Petroselinum macedoni-

cum, l. 215

— *vulgare*, l. *ibid.*

Peucedanum, l. 196

Peucedanum officinale,

ibid.

Peziza Auricula, V. 421

Phellandrium aquaticum,

l. 220

Phoenix dactylifera, V. 12

Phu, l. 153

Phyllanthus Emblica, IV.

93

Physalis Alkekengi, l. 382

Phytolacca, IV. 238

Phytolacca decandra, *ibid.*

Pichurim, *vid.* *Pechurim*.

Pilosella, l. 91

Pimenta, III. 230

Pimpinella alba, l. 242

Pimpinella Anisum, l. 245

Pimpinella italica (*Herba*)

l. 155

— — — (*Radix*),

l. 156

Pimpinella magna, l. 244

Pimpinella nigra, *ibid.*

Pimpinella saxifraga, l.

242

Pinea, l. 11

Pinus, l. 1

Pinus Abies, l. 22

— *Cembra*, l. 12

— *Larix*, l. 13

— *Picea*, l. 22

— *Pinea*, l. 11

— *sylvestris*, l. 1

Piper album, V. 22

Piper Cubeba, V. 35

Piper iamaicense, III. 230

— *indicum*, l. 230

**Piper longum*, V. 33

* — *nigrum*, V. 23

Pistacia, l. 60

Pistacia Lentiscus, l. 62

— *Terebinthus*, l. 60

— *vera*, l. *ibid.*

Plantago latifolia, l. 157

Plantago maior, l. *ibid.*

— *Psyllium*, l. 159

- Plumbago europaea*, l. 423
Polium creticum, ll. 94
 — *montanum*, ibid.
 **Polygala amara*, ll. 358
 — *Senega*, ll. 350
 **Polygala vulgaris*, ll. 357
Polygonum aviculare, IV.
 293
 — *Bistorta*, IV. 289
 — *Hydropiper*, IV.
 291
Polypodium, V. 325
Polypodium Filix mas,
 V. 328
 — *vulgare*, V. 325
Polytrichum commune, V.
 357
Poma, III. 131
Populus, l. 38
Populus balsamifera, l. 40
 — *nigra*, l. 38
Porrum, V. 102
Portulaca, 259 111
Portulaca oleracea, ibid.
Portentilla Anserina, III.
 101
 — *reptans*, III. 103
Poterium Sanguisorba, l.
 155
 **Primula veris*, ll. 21
Profluvii Cortex, l. 446
Pruna, III. 166
Prunella, ll. 147
Prunella vulgaris, ibid.
Prunus avium, III. 154
 — *Cerasus*, III. 151
 — *domejica*, III. 166
 — *Laurocerasus*, III. 156
 — *Padus*, VI. 123
 — *spinosa*, III. 171
Psyllium, l. 159
Psarmica, l. 138
Pteris aquilina, V. 342
Pterocarpus santalinus,
 VI. 89
Pulegium, ll. 126
Pulmonaria arborea, V.
 375
 — *maculata*, ll. 81
Pulmonaria officinalis, ibid.
Pulsatilla nigricans, III.
 72
Punica Granatum, III. 191
Pyrethrum, l. 124
Pyrola, ll. 67
Pyrola rotundifolia, ibid.
Pyrus Cydonia, III. 144
 — *Malus*, III. 131

Q.

- Quassia*, III. 317
Quassia amara, ibid.
 — *Simaruba*, III. 336
Quercus, l. 49
Quercus Cerris, VI. 7
Quercus marina, V. 387
Quercus Robur, l. 49
 — *Suber*, l. 51

R.

Rheum, vid. Rhabarbarum.

Rackasira Balsamum, VI.

229

Radicula, II. 260

Ranunculus albus, III. 71

Ranunculus acris, III. 60

* — — *bulbosus*, III. 69

— — *Ficaria*, III. 70

— — *Flammula*, III.

67

Ranunculus palustris, III.

65

Ranunculus pratensis, III.

60

Ranunculus sceleratus, III.

65

Rapa, II. 270

Raphanus hortensis, II.

284

— — *niger*, *ibid.*

— — *ruticanus*, II. 281

Raphanus sativus, II. 350

Resina elastica, IV. 122

Resina lutea novi Belgii,

VI. 217

Rhabarbarum monacho-

rum, IV. 246

— — *sibiricum*, IV. 253

— — *verum*, IV. 257

* *Rhamnus catarticus*, IV. 5

— — *Frangula*, IV. 8

— — *Zizyphus*, IV. 9

Rhaponticum, IV. 251

Rheum palmatum, IV. 257

— *Rhaponticum*, IV.

251

— *undulatum*, IV. 253

Rhodia, III. 258

Rhodiola rosea, *ibid.*

Rhodium lignum, II. 293

Rhododendron, VI. 73

Rhododendron Chrysanthum, *ibid.*

Rhocas, II. 173

Rhus coriaria, IV. 21

* *Ribes nigrum*, III. 224

* — — *rubrum*, III. 222

Ricinus communis, IV. 141

Ricinus maior, IV. 119

Ricinus vulgaris, IV. 141

Risagon, VI. 150

Roccella, V. 385

Rosa alba, III. 130

— — *canina*, III. 127

— — *centifolia*, III. 117

Rosae damascenae, *ibid.*

— — *rubrae*, III. 123

Rosa gallica, *ibid.*

Rosa sylvestris, III. 127

Rosmarinus hortensis, II.

140

Rosmarinus officinalis, *ibid.*

Rosmarinus sylvestris, II.

64

- Ros solis*, III. 367
 * *Rubia tinctorum*, I. 298
Rubus arcticus, III. 114
 = *Chamaemorus*, III.
 116
 * — *idaeus*, III. 112
Rumex Acetosa, IV. 247
 — *acutus*, IV. 243
 — *alpinus*, IV. 246
 — *aquaticus*, IV. 244
 — *crispus*, IV. 243
Ruscus, I. 280
Ruscus aculeatus, *ibid.*
 — *Hypoglossum*, I. 281
Ruta, III. 85
Ruta graveolens, *ibid.*
Ruta muraria, V. 348
- S.
- Sabadillae*, f. *Sabadilli semen*, V. 124
Sabina, I. 33
Saccharum, V. 283
Saccharum officinarum, V.
 ibid.
Sagapenum, VI. 230
Sago, V. 17
Sagus RUMPHII, *ibid.*
Salab, f. *Salap*, f. *Salep*, V.
 203
Salix, I. 35
Salix alba, *ibid.*
Salsola sativa rel., IV.
 202
- Salvia*, II. 134
Salvia officinalis, *ibid.*
 — *Sclarea*, II. 139
Sambucus, IV. 13
Sambucus Ebulus, IV. 19
 — *nigra*, IV. 13
Sandaracha, I. 27
Sanguis Draconis, V. 219
Sanguisorba officinalis, I.
 155
Sanicula, I. 171
Sanicula europaea, *ibid.*
Santalum album, II. 73
 — *citrioum*, *ibid.*
 — *rubrum*, VI. 89
Santolina, I. 110
Santolina Chamae Cyparissus, *ibid.*
Santonium, I. 92
Saponaria, III. 371
Saponaria officinalis, *ibid.*
Sappan lignum, II. 345
Sarcocolla, I. 163
Sarsaparilla, I. 274
Sarsaparilla germanica,
 226
Sassafras, IV. 379
Satureia, II. 120
Satureia hortensis, *ibid.*
Satyrion, V. 213
Saxifraga alba, III. 260
Saxifraga granulata, *ibid.*
Saxifraga rubra, III. 90
Scabiosa, I. 146

Scabiosa aruensis, ibid.
 — *succisa*, l. 147
Scammonium, l. 408
Scandix Cerefolium, l. 230
Scilla, V. 72
Scilla maritima, ibid.
Schoenanthus, V. 320
Sclarea, ll. 139
Scolopendrium, V. 346
Scordium, ll. 95
Scorzonera, l. 84
Scorzonera humilis, ibid.
**Scrophularia aquatica*, ll. 155
 — — *nodosa*, ll. 153
Scrophularia vulgaris, ibid.
Scutellaria galericulata, ll. 148
Sebesten, ll. 88
Secale, V. 249
Secale cereale, ibid.
Sedum acre, ill. 251
Sedum maius, ill. 256
Sedum minus, ill. 251
Sedum Telephium, ill. 254
Sempervivum maius, ill. 256
Sempervivum tectorum, l. ibid.
Senecio, l. 141
Senecio vulgaris, ibid.
Senega, f. *Sentka*, ll. 350

Senna, ll. 313
Serpentaria virginiana, l. 285
Serpentum Lignum, l. 315
 — *radix*, l. 308
Serpyllum, ll. 105
Sesamum, l. 406
Sesamum orientale, ibid.
Seseli, l. 204
Seseli creticum, l. 175
 — *massiliense*, l. 233
Seseli tortuosum, ibid.
Sigillum Salomonis, V. 192
Siler montanum, l. 204
Siliqua dulcis, ll. 349
 — *hirsuta*, ll. 289
Simaruba, ill. 336
Sinapi nigrum, ll. 261
Sinapis nigra, ibid.
Sison Ammi, l. 214
Sisymbrium Nasturtium, ll. 250
 — *Sophia*, ll. 254
Sium Ninsi, l. 212
Smilax China, l. 278
 — *Sarsaparilla*, l. 274
Soda, IV. 202
Solanum, l. 352
Solanum Dulcamara, l. 349
 — *nigrum*, l. 352
Soldanella, 422
Solidago Virgaurea, l. 140

- Sonchus, l. 90
Sonchus oleraceus, ibid.
 Sophia chirurgorum, ll. 254
 **Sorbus aucuparia*, ll. 149
Spartium scoparium, ll. 291
Spica celtica, l. 153
 — *indica*, V. 322
Spigelia, l. 310
Spigelia Anthelmia, ibid.
 **Spigelia marilandica*, l. 312
Spilanthus Acmella, l. 110
Spina ceruina, IV. 5
Spinacia, IV. 232
Spinacia oleracea, ibid.
Spiraea Filipendula, ll. 90
 — *Ulmaria*, ll. 91
Squilla, V. 72
Squinanthus, V. 320
Staphisagria, ll. 30
Statice Limonium, l. 145
Stoechas arabica, ll. 114
 — *citrina*, l. 91
Storax, ll. 68
 — *liquida*, l. 54
Strammonium, l. 376
Styrax, vid. *Storax*.
Styrax Benzoin, IV. 466
Styrax officinale, ll. 68
Suber, l. 51
Succus Acaciae verae, ll. 326
Sumach, IV. 21
Swietenia, VI. 132
Swietenia Mahagoni, ibid.
Symphitum, ll. 78
Symphitum officinale, ibid.
 T.
Tabacum, l. 383
Tacamahaca, l. 40 VI. 132
Tamarindi, ll. 342
Tamarindus Indica, ibid.
Tamarisci Cortex etc., ll. 76
Tamarix gallica, ibid.
Tanacetum, l. 106
Tanacetum Balsamita, l. 108
 — *vulgare*, l. 106
Taraxacum, l. 86
Telephium, ll. 254
Terebinthina communis, l. 21
 — *cypria*, l. 66
 — *veneta*, l. 13
Terra Gatechu, ll. 334
 — *aponica*, ibid.
Tertianaria, ll. 148
Teucrium capitatum, ll. 94
 — *ereticum*, ll. ibid.
 — *Chamaedrys*, ll. 99
 — *Chamaepitys*, ll. 101
 — *Marum*, ll. 90
Teucrium montanum, ll. 94

INDEX ALPHABETICUS.

267

—— *Polium*, ll. 94
 —— *Scordium*, ll. 95
Thalictrum, ll. 82
Thalictrum flavum, ibid.
Thea Bohea, IV. 162
Thea Bohea, ibid.
 **Thea viridis*, IV. 163
Theobroma Cacao, ll. 276
Thlaspi, ll. 285
Thlaspi aruense, ibid.
 —— *Bursa pastoris*, ll. 286
Thus, l. 31
Thuya occidentalis, l. 25
Thymelaea, IV. 453
Thymus, ll. 103
Thymus Serpyllum, ll. 105
 —— *vulguris*, ll. 103
Tigli, f. *Tiglia grana*, IV. 109
Tilia, ll. 387
Tilia europaea, ibid.
Tilli grana, IV. 109
Toluisera balsamum VI. 116
Tolutanum balsammum, ibid.
Tordylium officinale, l. 175
Tormentilla, ll. 104
Tormentilla erecta, ibid.
Tragacanthae gummi, ll. 306
Tragopogon, l. 85
Tragopogon pratense, ibid.
Trapa natans, IV. 64
Tribulus aquaticus, ibid.

Trichomanes, V. 347
Trifolium fibrinum, ll. 26
Trifolium Melilotus officinalis, ll. 310
Trifolium paludosum, ll. 26
Trigonella Foenum graecum, ll. 311
Triticum, V. 258
Triticum aestivum, ibid.
 —— *hybernum*, ibid.
 —— *repens*, V. ibid.
Tropaeolum maius, IV. 58
Tunica, ll. 369
Turpethum, l. 421
Tussilago, l. 114
Tussilago Farfara, ibid.
Petasites, l. 113

V.

Vaccinium Myrtillus, ll. 63
 —— *Oxycoccus*, ll. 62
 —— *Vitis idaea*; ll. 60
Valeriana celtico, l. 153
Valeriana maior, l. ibid.
 —— *minor*, l. 148
Valeriana officinalis, ibid.
 —— *Phu*, l. 153
Vanilla, V. 216
Veratrum album, V. 107
 —— *nigrum*, ibid.

Veratrum? (*Sabadilla*),
V. 124

Verbascum (*Folia*), l. 401

— (*Radix*), l. 403

Verbascum nigrum, ibid.

— *Thapsus*, l. 401

Verbena, ll. 170

Verbena officinalis, ibid.

Veronica, ll. 167

Veronica Beccabunga ll. 169

— *officinalis*, ll. 167

Vicia Faba, ll. 297

Victorialis longa, V. 103

Vinca minor, l. 445

Vinca Peruviana, ibid.

Vincetoxicum, l. 448

Vinum, l. 255

Viola, l. 426

**Viola canina*, Vl. 35

— *Ipæacuanha*, l. 430

— *odorata*, l. 426

Violaria, ibid.

**Viola tricolor*, Vl. 37

Virga aurea, l. 140

Viscum, l. 164

Viscum album, ibid.

Vitæ arbor, l. 25

Vitex Agnus castus, ll. 159

Vitis idaea, ll. 60

Vitis vinifera, l. 255

Vlmaria. Ill. 91

Vlmus, IV. 425

Vlmus campestris, ibid.

Urtica, IV. 416

Urtica dioica, ibid.

— *pilulifera*, IV. 421

Urtica romana, IV. ibid.

Urtica urens, IV. ibid.

Vsnea, V. 358

Vuae, l. 255

Vua urfi, ll. 48

Vuluaria, IV. 198

Vuularia, l. 281

W.

Wintera aromatica, IV.

395

Winteranus Cortex, ibid.

— *spurius*, IV. 401

X.

Xanthium, l. 116

Xylobalsamum, IV. 26

Z.

Zedoaria longa, V. 66

— *rotunda*, ibid.

Zingiber album, V. 44

— *commune*, ibid.

— *nigrum*, ibid.

FINIS.



